

נוקסידיל 5%

תמיסה לטיפול מקומי בקרקפת

הרכב:

החומר הפעיל: מינוקסידיל 5% Minoxidil.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התכשיר מיועד לגברים בגילאי 18-65 שנים במקרים של התקרחות מהסוג התורשתי בלבד. עליך להשתמש בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

מריחה של התכשיר על עור הקרקפת גורמת לעצירת הנשירה ולצמיחת שיער במקרים של התקרחות אצל חלק מן המשתמשים בתכשיר. ממחקרים שנעשו עד כה, עולה כי 3 מתוך 5 גברים שהשתמשו במינוקסידיל במשך 48 שבועות דיווחו על צמיחת שיער.

משתמשים עצירים ו/או שתהליך התקרחות החל לפני זמן לא רב ו/או שאזור ההתקרחות אצלם אינו נרחב עשויים ליהנות מתוצאות טובות יותר.

אם תהליך ההתקרחות החל לפני שנים רבות ו/או שטח ההתקרחות נרחב, סיכויי הצלחת הטיפול נמוכים.

תהליך צמיחת השיער, כמו תהליך ההתקרחות ונשירת השיער, הינו ממושך, ולפיכך יש להשתמש בתכשיר לפחות חודשיים על מנת להעריך את צמיחת השיער מחדש. אם אינך רואה שיפור לאחר מספר חודשים, יש לפנות לרופא המטפל. הערכה מלאה של השפעת התכשיר תוכל להיעשות רק כעבור שנה של טיפול, ולכן אם אינך רואה שיפור בצמיחת השיער לאחר שנה של שימוש, יש להפסיק את הטיפול.

המינון היומי המקסימלי הינו 2 מ"ל: 1 מ"ל בבוקר ו- 1 מ"ל בערב (1 מ"ל = 7 התזות). שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את צמיחת השיער ואף עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות יותר ואף עשוי לגרום לתופעות לוואי הקשורות בירידה בלחץ הדם, כגון: כאב בחזה, סחרחורת, עילפון, קצב לב מהיר, התנפחות הגפיים. במקרה ואחת מתופעות אלו מופיעה יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא מיד.

יש להתמיד בטיפול על פי ההוראות. אין להשתמש על אזורים אחרים מהקרקפת.

השימוש בתכשיר הינו לטווח ארוך. הפסקת הטיפול עלולה לגרום לחידוש תהליך הנשירה תוך 3-4 חודשים.

1. למה מיועדת התרופה?

התכשיר מיועד להצמחת שיער הקרקפת אצל גברים בריאים בגילאי 18-65 שנים במקרים של התקרחות מהסוג התורשתי בלבד. יש להיוועץ ברופא המטפל על מנת לוודא שסוג הנשירה שלך מתאים לטיפול בתכשיר זה.

קבוצה תרפויטית: מרחיבי כלי דם, במתן מקומי, לטיפול בנשירת שיער.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך אישה.
- גילך קטן מ- 18 שנים או גדול מ- 65 שנים.
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל מינוקסידיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- הנשירה ממנה אתה סובל אינה על רקע תורשתי (לדוגמא: נשירה פתאומית ולא צפויה, נשירה הנובעת מטיפול תרופתי).
- אתה קירח לחלוטין או שכל שיער הגוף שלך נשר.
- אתה סובל מיתר לחץ דם, גם אם אינו מטופל.
- אתה סובל מבעיה כלשהי המשפיעה על עור הקרקפת (כגון: כוויות שמש, פסוריאזיס וכו').
- אתה מגלח את הקרקפת שלך.
- אתה משתמש בקרמים, משחות או מרככים למיניהם שנועדו לטפל בבעיות קרקפת, כגון: דיטרנוול - לטיפול בפסוריאזיס, טרטינואין הנועד לטיפול באקנה, קורטיקוסטרואידים - חומרים אנטי-דלקתיים, כגון: הידרוקורטיזון, בטאמטאזין, פרפיין - מרכיב נפוץ בקרמים לשיער.
- יש לך חבישה מכל סוג שהוא על הקרקפת.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם הנך סובל או סבלת מליקוי בתפקוד הלב (לרבות הפרעות קצב, תעוקת חזה או כאבים בחזה) ו/או בעיות בזרימת הדם ו/או יתר לחץ דם, הכליה, מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- יש לוודא טרם שימוש בתרופה שעור הקרקפת בריא ולא פגום.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- **זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש. אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.**

אנינטראקציות / תגובות בין תרופתיות

- **אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, סופר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
- לטיפול ביתר לחץ דם (כגון: הידראלאזין) - מחשש להגברת פעילותן.
- לטיפול מקומי בקרקפת.

שהריון והנקה

התרופה מיועדת לגברים בלבד. התכשיר דליק, לכן אין לעשן בקרבתו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

המרכיב פרופילן גליקול המצוי בתמיסה עשוי לגרום מיעדת לגברים בלבד. התכשיר מכיל גם אלכוהול, שבמגע בעיניים עשוי לגרום לצריבה. במידה והתכשיר נכנס לעיניים, לפה או בא במגע עם עור פגום, יש לשטוף את האזור תחת מי ברז זורמים. לשטוף את האזור תחת מי ברז זורמים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המקובל בדרך כלל הוא: הכמות המקסימלית לטיפול הינה 2 מ"ל ביום: 1 מ"ל בבוקר ו- 1 מ"ל בערב (1 מ"ל = 7 התזות). יש לרווח לפחות 12 שעות בין שימוש אחד לשני.

שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את צמיחת השיער אך עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות יותר, לכן יש להקפיד על מדידת המנה באמצעות מספר הליחות המומלץ. אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתכשיר על שיער וקרקפת יבשים, בכמות כוללת של 1 מ"ל על כל אזורי ההתקרחות. אם ניתן, יש להתחיל במרכז החומר. לאחר ההימנע מטיפול התכשיר את הידיים. יש להימנע מטיפול התכשיר על הפנים או על אזורי עור שמחוץ לאזור ההתקרחות. במידה ונשפך בטעות על אזור שאינו הקרקפת יש לשטוף היטב.

לאחר השימוש בתכשיר: יש להימנע מחפירת הראש במשך כשעתיים. אין להשתמש במיבש שיער לזירוז ייבוש השיער המתמיסה. אין להניח את הראש על הכר לפחות שעה אחרי מריחת הקרקפת. יש להימנע מחפירת השיער לשמש.

יש להשתמש באמצעות מתז (מצורף לאריזה) לטיפול בקרחות ובקרחות המכוסות חלקית בשיער:

- א. יש להסיר את מכסה הפלסטיק ולהרכיב במקומו את המתז.
- ב. יש להחזיק את הבקבוק בצורה אנכית ולהתיז את התמיסה על האזור המטופל. כמות התמיסה הממלית שיעשה בה שימוש (על כל אזורי ההתקרחות יחד) היא 7 התזות לכל היותר.

ייתכן שהצמיחה הראשונית תראה רכה ופלומתית אך בסופו של דבר השיער יצמח כשיער רגיל.

אם שכת למרוח את התרופה בזמן הדרוש, יש למרוח מנה מיד כשמזכרת, אך לא אם מזכרת קרוב לזמן הטיפול הבא. אין ליטול מנה כפולה.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

יש למרוח את התכשיר רק כאשר הקרקפת והשיער יבשים לגמרי. יש להתמיד בטיפול על פי ההוראות. הפסקת הטיפול תגרום קרוב לוודאי לנשירה של השיער שצמח ולחידוש תהליך הנשירה תוך 3-4 חודשים.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן, תפקוד הכליות, הלב ומערכת הנשימה. יש להיות רגישים לגבי שינויים בהרגשה הכללית ובמצב הבריאות. אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה. יש להישקל פעמיים בשבוע, במקרה של עליית משקל פתאומית יש לפנות מיד לרופא. חולים במחלות לב ו/או יתר לחץ דם, המטופלים בתרופה זו, חייבים להיות בפקוח רפואי במשך כל תקופת הטיפול. אין להשתמש על קרקפת מודלקת, מגורה ו/או אדומה או בזמן טיפול בתכשיר אחר.

שים לב: לא לבלוע, לתרופה זו מיועדת לשימוש יחסיני בלבד על הקרקפת. יש להימנע משיאית תרסיס.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים עם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתכשיר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם מתפתחות אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- גירוי/אודם, דלקת או פריחה מקומיים מתמשכים ו/או חריפים, אקנה, בצקת באזורים שונים של הגוף, נפוחות בפנים, חוסר תחושה ברגליים, בידיים או בפנים, התנפחות הגפיים, כאב בחזה, קוצר או קשיי נשימה, סחרחורת, עילפון, פעימות לב מואצות, לחץ דם נמוך, כאב ראש, עלייה פתאומית ולא מוסברת במשקל, מיעוט תאי דם לבנים (Leukopenia).
- נשירת שיער שעשעיה להופיע בתחילת הטיפול (2-6 שבועות ראשונים לטיפול) ונמשכת מעל שבועיים.
- אם תופעות מסוימות אינן חולפות כגון: אודם מקומי באזור הטיפול, גרד, יובש בקרקפת, קשקשים (לרוב מדובר בתופעות חולפות).
- שינוי בצבע או במרקם השיער.

תופעות לוואי נוספות המופיעות לעיתים קרובות:

- צמיחת שיער באיברי גוף אחרים, כולל על הפנים.
- גרד, כולל פריחה מגרדת באזור המריחה ו/או גירוד בחלקי גוף שונים (כולל בעיניים).
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרתי בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il> בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה: www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- המוצר דליק. יש להרחיק ממקור אש ו/או חום.
- לאחר הפתיחה הראשונה יש להשתמש בתוך חודש, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Propylene glycol, alcohol, purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? כל בקבוק מכיל 60 מ"ל תמיסה. האריזה מכילה גם מתז.
- עלון זה נבדק ומושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אפריל 2014.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 144-70-33300.
- בעל הרישום והיצרן כתובתו: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ, ת.ד. 16, ירוחם.
- משווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516.