



- كنت تعاني من فشل كلوي خطير أو من فشل كبدى وفي نفس الوقت تتداوى بدواء تؤثر على طرح الدواء من الجسم (مثل: كيتوكونازول).

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
مستحضرات - ١٩٨٦
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

سوليفيناسين - تريما ٥ ملغ، ١٠ ملغ أقراص

- تحديرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء قبل إستعمال الدواء طبيب سيفحص المسببات المحتملة لتكرار التبول (مثل مشكلة في القلب أو في الكلى، إتهاب في المسالك البولية)، مثلاً في حال كان بسبب ثلوث جرثومي يدرس الطبيب العلاج بمضاد حيوى ملائم.
- يجب تجنب حالات ازديادة مفرطة في حرارة الجسم مثلاً أثناء نشاط بدني أو في مطمس حار، إن إستعمال الدواء في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى ضربة حرارية/ إنهاء حراري الذي يتغير بانفاسه التعرق، ارتفاع درجة حرارة الجسم، دوار، إرهاق، غثيان.
- لدى بعض المرضى الذين يستعملوا Solifenacin succinate يبلغ عن عرض angioedema (رد فعل تحسسي للجلد الذي يتجلّى بزومات/ انفاس في الطبقات العميقة للجلد) الذي يترافق بصعوبة في التنفس. في حال حدوث هذا العرض يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً.
- لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج:
إذا كانت لديك مشكلة في التبول (انسداد جزئي)، إذا كنت تعاني من إمساك، إذا كنت معروضاً لخدرة حدوث تباطؤ في نشاط الجهاز الهضمي (حركة المعدة والأمعاء)، إذا كنت تعاني من مرض حاد في الكلى، إذا كنت تعاني من مرض متواتر في الكبد، إذا كنت تعاني من فتق في الحاجب الحاجز أو حرقان، إذا كنت تعاني من إضطراب في الجهاز العصبي (اعتلال عصبي ذاتي).
- إذا كنت تتناولين أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخضر إذا كنت تتناول الأدوية التالية:
- ميتوكولوبراميد أو سيساپريدي - من الجائز أن تقل نجاعة هذه الأدوية.

- أدوية تشارك الإنزيم CYP3A4 (مثل: كيتوكونازول، ريتونافير، نلفيناقيير، إيتراكونازول، فيرآپاميل، ديلتيازام) - من الجائز أن تمنع/تعيق تفكك سوليفيناسين.
- ريفاميكسيين، فنتوتين، كاربامازيبين - من الجائز أن تزيد تفكك سوليفيناسين.
- مستحضرات أخرى مضادة لإفراز الكولين - من الجائز أن يزيد تأثير الدوائين.
- مستحضرات كولينية التاثير (مثل: بيلوكاربدين لعلاج الجلوکوما) - من الجائز أن تقل نجاعة سوليفيناسين.
- بيسوفوسفونات - من الجائز أن يتقدّم إتهاب المريء.
- إستعمال الدواء والطعام
بالإمكان تناول الدواء مع/بدون طعام.
- الحمل والإرضاع
يجب إستشارة الطبيب.

- لا يجوز إستعمال سوليفيناسين - تريما في فترة الحمل إلا إذا اتخذ الطبيب قرار آخر. لا يجوز الإرضاخ أثناء إستعمال سوليفيناسين - تريما ذلك لأن الدواء قد ينتقل إلى حليب الأم.
- السيادة واستعمال الماكولات
من شأن الدواء أن يؤدي إلى ضعف في البقظة و/أو إلى تشوش الرؤية لهذا لا يجوز السيادة أو تشغيل الماكولات الخطيرة أثناء إستعمال الدواء.

- معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوى الدواء على لكتوز. لا يجوز الإستعمال إذا علمت بوجود حساسية.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.
إذا لم تكن واثقاً بخصوص كيفية الإستعمال عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

سوليفيناسين - تريما ٥ ملغ كل قرص يحتوى على:
Solifenacin succinate 5 mg

سوليفيناسين - تريما ١٠ ملغ كل قرص يحتوى على:
Solifenacin succinate 10 mg

المواد غير المعلنة: انظر الفقرة ٦ / معلومات إضافية.
إنفراشة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
ووصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين.
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص لأطفال ولمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

الدواء مخصص لعلاج فقدان السيطرة على التبول و/أو حالات ازديادة في تكرار والإلحاح على التبول لدى مرضى يعانون من فرط نشاط المثانة البولية. قبل إستعمال الدواء يجب الاستفهام ما هي أسباب تكرار التبول (مثل مشكلة في القلب أو في الكلى، إتهاب المسالك البولية). لا يجوز الإستعمال إذا كنت تعاني من فشل كلوي و/أو كبدى و/أو جلوكوما.

لا يجوز الإستعمال إذا علمت بوجود حساسية للكتون.

الدواء يحتوى على الكتون.
الدواء غير مخصص لأطفال ولمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.
Solifenacin succinate لدى بعض المرضى الذين يستعملوا يبلغ عن عرض angioedema (رد فعل تحسسي للجلد الذي يتجلّى بزومات/ انفاس في الطبقات العميقة للجلد) الذي يترافق بصعوبة في التنفس. في حال حدوث هذا العرض يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً.

من شأن الدواء أن يؤدي إلى ضعف في البقظة و/أو إلى تشوش الرؤية لذا لا يجوز السيادة أو تشغيل الماكولات الخطيرة أثناء إستعمال الدواء.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟
لعلاج فقدان السيطرة على التبول و/أو في حالات زيادة تكرار والإلحاح على التبول لدى مرضى يعانون من فرط نشاط المثانة البولية.
الفصيلة العلاجية: من مضادات الموسكاريين

(٢) قبل إستعمال الدواء

- لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
• كانت لديك حساسية (اليرجيا) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مثل: لكتوز).
- كانت تعاني من احتباس البول، إضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي (تضخم القولون السعدي، قرحة في المعدة، ضعف عضلات شديد (myasthenia gravis)، جلوكوما (ضيق الزاوية) أو معرض لخدرة حدوث هذه الحالات.
- كانت تعاني من فشل كلوي شديد يتطلب الديلزنة.
- كانت تعاني من فشل كبدى خطير.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد في اليوم.

من المفضل تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب بلع الدواء بشكل الكامل مع الماء. منع السحق / الشطر /

المضغ، ذلك لأن القرص مطلي.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع الطفل بالخطأ من

الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى

وأخضر عليه الدواء معك. الأعراض المحمولة في حال تناول

جرعة دوائية مفرطة هي: صداع، جفاف في الفم، دوار، تشوش

الرؤية، الميل إلى النوم، هذيان، إختلالات، صعوبة في التنفس،

تسارع دقات القلب، إحتباس البول، توسيع الحدقات.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول الجرعة

الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب. لا يجوز

تناول جرعة دوائية مضاعفة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

كيف تستطيع المساعدة في نجاح العلاج؟

حتى ولو طرأ تحسن على حالة الصحية، لا يجوز التوقف عن

العلاج بالدواء بدون استشارة الصيدلي.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد

من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات

الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، واستشر

الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سوليفيناسين قد يسبب أعراضًا

جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهي من قائمة الأعراض

الجانبية. من الجائز لا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهرت

الأعراض الجانبية التالية:

كما بكل دواء، إن إستعمال سوليفيناسين قد يتجلّى بوذمات

في البقيات العميقة للجلد حيث يتراافق بصعوبات في الطرق

التنفسية).

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا ظهرت الأعراض التالية:

رد فعل تحسسي يتجلّى بطفح جلدي، حكة، حويصلات في

الجلد، إنفاس في الوجه، في اللسان، في العنق و/أو في الأطراف،

ضيق تنفس.

يجب مراجعة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

إمساك يستمر أكثر من ٣ أيام، آلم شديد في البطن.

أعراض جانبية إضافية

٥) تناول في أوقات متقاربة جداً

جفاف الفم

تناول في أوقات متقاربة

إمساك، غثيان، أعراض في الجهاز الهضمي (مثل: الشعور بالإمتلاء،

آلام في البطن، تجوّرات، حرقان، عدم الراحة في المعدة)

تشوش الرؤية

٦) تناول في أوقات متباينة

التهاب في المسالك البولية و/أو في المثانة

نعاس وإرهاق

تغيرات في حالة المذاق

جفاف في العينين، في الجلد و/أو في الأنف

صعوبة في التبول

ارتجاد (عودة محتوى الأمعاء إلى المريء)، جفاف في

الحنجرة

عبروت ٤٢٠٠٠٤

منتجات طبية إسرائيلية

عبروت، م.خ.

