

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו – 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## סוליפנאסין-תרימה

### 5 מ"ג, 10 מ"ג טבליות

**סוליפנאסין-תרימה 5 מ"ג** כל טבליה מכילה: Solifenacin succinate 5 mg

**סוליפנאסין-תרימה 10 מ"ג** כל טבליה מכילה: Solifenacin succinate 10 mg

חומרים לא פעילים: ראה טעף 9 מידע נוסף.  
**חוקרים בעניין את העלון של סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי טובה.

**התרופה אינה מיועדת לילדים ולנוער מתחת לגיל 18 שנים.**

התרופה מיועדת לטיפול בחוסר שליטה במתן שתן ו/או במצבים של עליה בתכיפות ודחיפות במתן שתן בחולים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן. לפי השימוש בתרופה יש לבדוק מהן הסיבות לתכיפות במתן שתן (כגון גינה ללבבית או כליתית, דלקת בדרכי שתן). אין להשתמש אם אתה סובל מאי ספיקת לבבית ו/או כבד ו/או גלאוקומה. אין להשתמש באם ידועה אלרגיה ללקטוז מכיוון שהתרופה מכילה ללקטוז.

התרופה אינה מיועדת לילדים ולנוער מתחת לגיל 18 שנים.

בחלק מהחולים שהשתמשו ב Solifenacin succinate דווחה תופעה של אנגיודמה (תגובה אלרגית של העור המתבטאת בבצקות/נפיחות בשכבות העמוקות של העור) המלווה בקושי נשימתי. במקרה ותופעה זו מתרחשת יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד. התרופה עשויה לגרום לפגיעה בערנות ו/או לטשטוש בזמן ולכן אין לנהוג או להפעיל מכוונת מסוכנות בזמן השימוש בתרופה.

**1. למה מיועדת התרופה?**  
לטיפול בחוסר שליטה במתן שתן ו/או במצבים של עליה בתכיפות ודחיפות במתן שתן בחולים עם פעילות יתר של שלפוחית השתן.

**קבוצה תרפויטית** אנטי מסרקוטי

**2. לפני שימוש בתרופה**

- ⚠ אין להשתמש בתרופה אם:**
- ישנה רגישות (אלרגיה) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כגון: ללקטוז).
  - אתה סובל ממצירת שתן, הפרעות חמורות במערכת העיכול (מגהקולון רעיל, כוב קיבה), חולשת שרירים חמורה (myasthenia gravis), גלאוקומה (צרת זווית) או נמצא בסכנת מצבים אלו.
  - הנך סובל מאי ספיקת כבד חמורה.
  - אתה סובל מאי ספיקת כליות חמורה הדורשת דיאליזה.

• **כבד ובטון** מאי ספיקת כליות חמורה או מאי ספיקת כבד ו/או **זמן** מטופל בתרופות המשפיעות על פינוי התרופה מהגוף (כגון: קטוקוזולול).

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
לפני השימוש בתרופה הרופא שלך יבחן גורמים אפשריים להכיפות במתן שתן (כגון גינה ללבבית או כליתית, דלקת בדרכי השתן), לדוגמא: במידה ומדובר בגיהום חיידקי הרופא ישקול טיפול אנטיביוטי מתאים.

- יש להימנע ממצבים של עליות יתר בחום הגוף כגון במהלך פעילות גופנית או במגז אירוס. שימוש בתרופה במצבים שמאלו עלול לגרום למכת/תשישות חום המאופיינת בירידה בהזעה, עליה בטמפרטורת הגוף, שחרורות, עייפות, בחילה.
- בחלק מהחולים שהשתמשו ב- Solifenacin succinate דווחה תופעה של אנגיודמה (תגובה אלרגית של העור המתבטאת בבצקות/נפיחות בשכבות העמוקות של העור) המלווה בקושי נשימתי. במקרה ותופעה זו מתרחשת יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד.

**⚠ אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.**

אם יש לך גינה במתן שתן (חסימה חלקית), אם אתה סובל מעצירות, אם אתה בסכנת להאטה בפעילות מערכת העיכול (תנועות קיבה ומעיים), אם אתה סובל ממחלת כליות חריפה, אם אתה סובל ממהלכת כבד בגיונית, אם אתה סובל מבקיעטני או צרבת, אם אתה סובל מהפרעה במערכת העצבים (ניורופתיה אוטונומית),

**⚠ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש לייחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות:

- טטוקולפראמיד או ציספריד - יתכן ויעילותם תופחת.
- תרופות המעורבות אמים CYP3A4 (כגון: קטוקוזולול, ריטונאביר, נלפינאביר, איטרקונזול, ורפמיניל-דלתיאם) - יתכן וימנע/יעכב פירוק של סוליפנאסין.
- ריפאמפיצין, פניטואסין, קרבמפיין - יתכן ויגבירו פירוק של סוליפנאסין.
- תכשירים אנטי כולריגיים אחרים - יתכן ותוגבר השפעת שתי התרופות.
- תכשירים כולריגיים (כגון: פילוקרפין לטיפול בגלאוקומה) - יתכן ויעלות סוליפנאסין תופחת.
- ביסופוסופטים - יתכן ותחומר דלקת בושט.

**שימוש בתרופה ומזון**  
יתן ליטול את התרופה עם/ללא מזון.

**⚠ הריון ונקבה**  
יש להתייעץ עם הרופא.

אין להשתמש בסוליפנאסין-תרימה בהריון אלא אם כן הרופא החליט אחרת. אין להימנע בזמן השימוש בסוליפנאסין-תרימה מכיוון שהתרופה עלולה לעבור לחלב האם.

**⚠ בהיגיה שימוש במכונות**  
התרופה עשויה לגרום לפגיעה בערנות ו/או לטשטוש הראיה ולכן אין לנהוג או להפעיל מכוונת מסוכנות בזמן השימוש בתרופה.

**⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

התרופה מכילה ללקטוז, אין להשתמש באם ידועה אלרגיה.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**  
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת ליום. רצוי ליטול את התרופה באותה שעה בכל יום. אין לעבור על המנה המומלצת.

בלבוע את התרופה בשלמותה עם מים. אסור לכתוש/לחצות/ללעוס, מכיוון שהטבליה מצופה.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחור מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך. במקרה של מינון יתר התופעות האפשריות הן: כאב ראש, יובש בפה, שחרורות, שטטוש ראיה, ישנוניות, חיוזות, פרקוסים, קושי נשימתי, דפיקות לב מואצות, אצירת שתן, הרחבת אישונים.

**אם שכתה ליטול תרופה זו בזמן הדרוש,** קח את המנה הבאה בזמן הרגיל היוועץ ברופא. אין ליטול מנה כפולה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**כיצד תוכל לסייע בהצלחת הטיפול?**

גם אם את שפיר במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח. אין ליטול תרופות בחושך/ בודק תהויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

**4. תופעות לוואי**  
כמו בכל תרופה, השימוש בסוליפנאסין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא אצירת שתן תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות:**

אנגיודמה (תגובה אלרגית של העור המתבטאת בבצקות בשכבות העמוקות של העור המלווה בקשיים בדרכי הנשימה).

**יש לפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות:**

תגובה אלרגית המתבטאת בפריחה עורית, גרד, שלפוחיות בעור, נפיחות בפינים, בלשון, בצוואר ו/או בגפיים, קוצר נשימה.

**יש לפנות לרופא אם מופיעות התופעות הבאות:**

עצירות שנמשכת מעל 3 ימים, כאב בטן חזק.

**תופעות לוואי נוספות**

- **מופיעות לעיתים קרובות**  
עצירות, בחילה, תופעות במערכת העיכול (כגון: תחושת מלאות, כאבי בטן, גיהוקים, צרבת, אי נוחות בקיבה), טשטוש ראיה
- **מופיעות לעיתים רחוקות**  
דלקת בדרכי השתן ו/או בשלפוחית נמנע ועייפות

שניים בתחושת הטעם יובש בעיניים בעור ו/או באף קושי במתן שתן ריפולקס (החוזר תנון המעי לושט), יובש בגרון בצקת בגפיים התחתונות

• **מופיעות לעיתים נדירות**  
כאב בטן חזק, חסימת מעיים, עצירות קשה אצירת שתן

כאב ראש וסחרחורת הקאה גרד, פריחה

• **מופיעות לעיתים נדירות מאוד**  
הזיות, בלבול פריחה אלרגית

• **תופעות לוואי בשיחות לא ידועה**  
שנויים באקדי, קצב לב לא סדיר, דפיקות לב מואצות

תיאובן ירוד, רמה גבוהה של אשלגן בדם שעלולה לגרום לקצב לב לא תקין עליה בלחץ תוך עיני שנויים בתפקודי כבד ו/או כליות חולשת שרירים הפרעה במיתרי הקול

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

**5. אין לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשיגש ידם של ילדים ו/או לניקיות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **להקאה** לא חרמה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.

**6. מידע נוסף**

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Lactose anhydrous, maize starch, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, titanium dioxide, polyethylene glycol, D&C yellow No. 10 aluminium lake, erythrosine aluminium lake, FD&C blue #2 indigo carmine aluminium lake.

כל טבליה של **סוליפנאסין-תרימה 5 מ"ג** מכילה כ- 61 מ"ג ללקטוז.

כל טבליה של **סוליפנאסין-תרימה 10 מ"ג** מכילה כ- 122 מ"ג ללקטוז.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?** כל אריזה מכילה 30 טבליות ועלויות בצבע זהוב בהיר.

**בעל הרישום:** תרמיה, תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ. מעברות 4023000 ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ביולי 2014.

מספר רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 5 mg : 152.32.33873.00

152.33.33869.00 : 10 mg  
לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסק בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**תרמיה**

103678010



298

05198061  
4023000  
תוצרי רפואה ישראלים  
מעברות בע"מ