

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦ يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إسم الدواء وشكله:

إينتينلسTM ١٠٠ ملغ،
إينتينلسTM ٢٠٠ ملغ،

أقراص

المادة الفعّالة وكميتها بكل قرص:
Etravirine 100 mg, 200 mg
إتراقفيرين ١٠٠ ملغ، ٢٠٠ ملغ

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.
إينتينلسي مخصص للعلاج لدى الكبار. إينتينلس غير مُخصص للعلاج لدى مرضى ما دون عمر ١٨ سنة.
هذا المستحضر غير مُخصص عادة للمرضى ما فوق عمر ٦٥ سنة إلا بتعليمات الطبيب.

١) لأي غرض مُخصص الدواء؟ يحتوي إينتينلس على المادة الفعّالة إتراقفيرين.

إينتينلس هو دواء يُستعمل لمعالجة التلوث بفيروس HIV (فيروس العوز المناعي البشري). يعمل إينتينلس بواسطة تخفيض نسبة الفيروس في الجسم، الأمر الذي يحسن من أداء جهاز المناعة ويقلل من خطورة تطور الأمراض المتعلقة بتلوث فيروس HIV.
إينتينلس، بالمشاركة مع الأدوية الأخرى المضادة لفيروس HIV، يُستعمل لمعالجة حاملي فيروس HIV لدى الكبار، والذين عولجوا في السابق بأدوية أخرى المضادة لفيروس HIV. يجب إستشارة الطبيب بالنسبة لمزيج الأدوية الأكثر ملائمًا بالنسبة لك.

الفصيلة العلاجية: ينتمي الدواء إلى فصيلة الأدوية المضادة لفيروس HIV المُسمّاة مثبطات ترانسسكريبتاز العكوسة اللا نوكليوزيدية (NNRTIs).

٢) قبل إستعمال الدواء

⚠ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساسًا (ألرجي) للمادة الفعّالة إتراقفيرين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المذكورة في الفقرة ٦ «معلومات إضافية».
كنت تتناول إيليسافير / جازوربوفير (دواء لعلاج تلوث التهاب الكبد C).

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

⚠ قبل العلاج ب إينتينلس، إحك لطبيبك إذا:

(X) إينتينلس لا يشفي من تلوث فيروس HIV، لكنه بشكل جزئاً من علاج المُخصص لتخفيض نسبة الفيروس في الدم. أيضاً خلال فترة العلاج بالدواء، لا تزال هناك إمكانية عدوى الآخرين ب HIV على الرغم من تناقص الخطورة بفضل العلاج الناجح المضاد للفيروس.
إستشر الطبيب بالنسبة لوسائل الحذر المطلوبة لمنع عدوى الآخرين بالفيروس.
(X) هذا المستحضر غير مُرضع في إسرائيل لمعالجين دون عمر ١٨ سنة.
(X) **المسنين:** لقد إستعمل إينتينلس لدى عدد قليل من المرضى بعمر ٦٥ سنة وما فوق. إذا كنت تنتمي لهذه الفئة من العمر، فيجب إستشارة الطبيب بالنسبة لإستعمال الدواء.

(X) **الوزن وإرتفاع الشحوم والجلكوز في الدم:** خلال فترة العلاج ضد فيروس HIV، من الجائز أن يحصل إرتفاع في الوزن، ونسبة الشحوم والجلكوز في الدم. يتعلق هذا الأمر جزئياً بإستعادة الصحة والعودة لنمط الحياة ويتعلق في حالات معينة بشحوم الدم، بالأدوية المضادة للفيروس HIV ذاتها. يقوم الطبيب بفحص هذه التغيرات.

(X) مشاكل في العظام: لدى بعض المرضى الذين يتناولون مزيج من الأدوية المضادة للفيروسات الربعية، قد يتطور مرض في العظام المسمى نخر العظام (موت النسيج العظمي الناجم عن فقدان تزييد العظم بالدم).

إن فترة العلاج بمزيج الأدوية المضادة للفيروسات الربعية، إستعمال الكورتيكوستيروئيدات، إستهلاك الكحول، تنبيب مناعي شديد، مقياس كتلة جسم أكبر، هي من جملة الأمور التي قد تكون جزءاً من عوامل الخطورة لتطور هذا المرض. إن أعراض مرض نخر العظام هي تصلب المفاصل، ألم خاصة في الفخذ، الركبة وفي الكتف) وصعوبة الحركة. إذا كنت تلاحظ حدوث واحد من تلك الأعراض، عليك إعلام الطبيب.

بلغ الطبيب عن الحالات التالية:

يتوجب عليك إستيضاح النقاط التالية وإبلاغ الطبيب إذا كانت تخضع:

(X) يجب إبلاغ الطبيب إذا تطور **طفح**. في حال تطور طفح فهو يظهر عادة قريباً لبداية العلاج المضاد لفيروس HIV ب إينتينلس ويوزل عادة خلال أسبوع - أسبوعين. عند نمو أو موصلة إستعمال الدواء، في بعض الأحيان، من الجائز خلال فترة العلاج ب إينتينلس أن يحدث رد فعل من فرط الحساسية (رد فعل تحسسي يشمل طفح وسخونة لا بل إنتفاخ في الوجه، اللسان أو الحنجرة وصعوبات في التنفس أو البلع) الذي قد يشكل خطراً على الحياة. يجب إبلاغ الطبيب حالا فيما إذا كنت تعاني من رد فعل لفرط الحساسية. يشير لك الطبيب حول كيفية التعامل مع الأعراض أو فيما إذا توجب التوقف عن تناول الدواء. إذا توقفت عن العلاج بسبب حدوث رد فعل لفرط الحساسية، فلا يجوز معاودة بدء العلاج ب إينتينلس.

(X) يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت من مشاكل في الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد B و/أو C. يقوم طبيبك بتقييم درجة خطورة مرض الكبد لديك قبل أن يقرر فيما إذا كان بإمكانك تناول الدواء.
(X) يجب إبلاغ الطبيب حالا إذا كنت تلاحظ حدوث أعراض **تلوث** أيًا كانت. لدى بعض حاملي فيروس HIV في المرحلة المتقدمة وذوي سابقة لتلوثات

إنتهازية (opportunistic infections)، إن علامات وأعراض تلوثات سابقة يمكن أن تتجلى حالا بعد بدء العلاج بالدواء. من الجائز أن الأعراض تظهر في أعقاب التحسن في الإستجابة المناعية للجسم وقدرته على محاربة التلوثات التي من الجائز أنها كانت موجودة في الجسم من دون أعراض ظاهرة.

(X) بالإضافة للتلوثات الإنتهازية (opportunistic infections)، قد تحدث أيضاً مشاكل مناعية ذاتية (حالة تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم السليمة) وذلك بعد بدء تناول أدوية لمعالجة تلوث HIV. يمكن أن تظهر المشاكل المناعية الذاتية أيضاً بعد عدة أشهر من بدء العلاج. فإذا كنت تلاحظ حدوث أية أعراض لتلوث أو أعراض مثل ضعف العضلات، ضعف يبدأ باليدين وراحتي القدمين ويرتفع للأعلى باتجاه مركز الجسم، ضربات قلب سريعة (خفقان)، رجفة أو فرط نشاط، بلغ الطبيب بشكل فوري لكي يكون بإمكانك تلقي العلاج المطلوب.

⚠ الأطفال والمراهقون:

إينتينلس غير مُخصص للعلاج لدى المرضى دون عمر ١٨ سنة.

⚠ التداخلات الدوائية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

في أغلب الحالات بالإمكان مشاركة تناول إينتينلس مع أدوية أخرى ضد فيروس HIV التي تنتمي لمجموعة أخرى.

من ذلك، بعض المشاركات غير موصى بها وفي حالات معينة يحتاج الأمر زيادة المراقبة و/أو تغيير جرعة الدواء. لذلك، يجب دائما إبلاغ الطبيب ما هي الأدوية الأخرى المضادة للفيروس HIV التي تتناولها، والتقيد بتعليماته بحذر بالنسبة للأدوية التي يمكن مشاركتها. من المهم قراءة نشرة المستهلك المرفقة بهذه الأدوية بتمعن.

(X) لا يوصى بتناول إينتينلس سوية مع الأدوية التالية:

(X) تيرانافير / ريتونافير، إفاقرينز، ثفراين، ريليفيرين، إيندينافير، ليفينايفر، أزانايفر / كوبيسينات، دارونافير / كوبيسينات (أدوية لمعالجة تلوث HIV)

(X) إيفامازابين، فينوباربيتال وفينبوتين (لعلاج الإختلاجات)

(X) ريفامبيسين بسبب تضاد الإستطباب مع مثبطات البروتياز (boosted protease inhibitors)، وريفاندين (لمعالجة التلوثات مثل السل)

(X) المستحضرات الحامية على St. John's Wort (هيبيريكوم فيرفوراتوم) (مستحضر نباتي لمعالجة الإكتئاب)

(X) داكلتاسفير، سيسيفيريفر (أدوية لمعالجة تلوث التهاب الكبد C)

بجب إستشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي واحد من تلك الأدوية.

(X) إذا كنت تتناول واحد من الأدوية التالية سوية مع إينتينلس، فمن الجائز أن يحدث تأثير على عملها أو على عمل إينتينلس. من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير المقدار الدوائي لبعض الأدوية وذلك لأن تأثيرها الطبي على الأعراض الجانبي قد تتأثر من المشاركة مع إينتينلس. يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول أي واحد من الأدوية التالية:

(X) دولونجرافير، مارافايروك، أميرينافير / ريتونافير، وفوسامبرينافير / ريتونافير (أدوية ضد فيروس HIV).

(X) إيميدارون، بيريديل، ديجوكسين، ديزوبيراميد، فليكانثيد، ليدوكائين، ميكسليتين، بروفانيفون و كينيدين (لمعالجة المشاكل القلبية مثل عدم سلامة نظم القلب).

(X) وارفارين (لتقليل تخثر الدم)، يوصيك طبيبك بإجراء فحوص الدم.
(X) فلوكونازول، إيتراكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (لمعالجة التلوثات الفطرية)

(X) كالبرتروميسين، ريفابوتين (مضادات حيوية)

(X) أرتيميتز / إيميفانترين (دواء لعلاج الملاريا)

(X) ديازيبام (لمعالجة إضطرابات النوم و/أو القلق)

(X) ديكساميثازون (كورتيكوستيروئيد لمعالجة حالات مختلفة مثل الإنتهاب ووردود الغلن التحسسية)

(X) بوسيفيريفر (دواء لمعالجة تلوث التهاب الكبد C)

(X) أتورفاستاتين، فلوفاستاتين، لوفاستاتين، روزوفاستاتين أو سيمفاستاتين (لتخفيض نسبة الكولسترول بالدم)

(X) سيكلوسبورين، سيرلييموس أو تاكروليموس (أدوية تثبط جهاز المناعة)

(X) سيلدينافيل، فاردنافيل أو تادالافيل (لمعالجة مشاكل إنتصاب القضيب و/أو إرتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني)

(X) كلويدجويرل (دواء لمنع تشكل الحشرات الدمية)

⚠ إستعمال الدواء والطعام:

من المهم جدا تناول الدواء بعد وجبة الطعام. إن تناول الدواء على معدة خاوية يعرقل من امتصاصه ويقلص الكمية المنتمصة للتصيف. لمعلومات إضافية أنظر الفقرة ٣ «كيفية إستعمال الدواء».

⚠ الحمل، الإرضاع والخصوبة:

بلغي طبيبك بشكل فوري إذا كنت في فترة الحمل.

لا يجوز تناول هذا الدواء إذا كنت في فترة الحمل، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك بشكل صريح.

يمنع على حاملات الفيروس HIV الإرضاع وذلك لأن هناك احتمال لعدوى الرضيع بالفيروس.

⚠ السيقاة وإستعمال الماكينات:

لا يجوز السيقاة أو تشغيل الماكينات إذا كنت تشعر بنعاس أو دوار بعد تناول الدواء.

⚠ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

أقراص إينتينلس ١٠٠ ملغ تحتوي على اللكتوز. بكل قرص ١٦٠ ملغ لكتوز متوطن هيدرات.

إذا قبل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل لبعض السكريات مثل اللكتوز، فيجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال الدواء.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال الدواء دائما بحسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقا فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو: ٢٠٠ ملغ مرتين في اليوم.

إذا كنت تتناول أقراص ذات ١٠٠ ملغ:

يجب تناول قرصين من إينتينليس ١٠٠ ملغ في الصباح بعد وجبة الطعام
ويجب تناول قرصين من إينتينليس ١٠٠ ملغ في المساء بعد وجبة الطعام.

إذا كنت تتناول أقراص ذات ٢٠٠ ملغ:

يجب تناول قرص واحد من إينتينليس ٢٠٠ ملغ في الصباح بعد وجبة الطعام
ويجب تناول قرص واحد من إينتينليس ٢٠٠ ملغ في المساء بعد وجبة الطعام.
من المهم جدا تناول الدواء بعد وجبة الطعام. إن تناول الدواء على معدة خاوية
يعرضك من إمتصاصه ويقلص الكمية الممتصة للنفص. يجب إستشارة الطبيب
بالنسبة لنوع الطعام المناسب.

يجب بلع القرص بأكمله مع كأس مليئة من الماء، لا يجوز مضغ القرص.
بالإمكان شطر القرص.


إذا كنت غير قادر على بلع القرص بأكمله، الرجاء تصرف بموجب التعليمات التالية:
- ضع القرص به ٥ ملل (ملعقة صغيرة) من الماء، أو بكمية سائل تكفي لتغطية
القرص على الأقل.

- قم بالخلط الجيد حتى يبدو الماء كالحليب.
- بالإمكان إضافة المزيد من الماء أو بدلا عن ذلك عصير البرتقال أو الحليب
(لا يجوز وضع القرص مباشرة في عصير البرتقال أو الحليب).

- قم بشربها حالا.
- اغسل الكأس عدة مرات بالماء، عصير البرتقال أو الحليب وقم بشربها بالكامل
في كل مرة للتأكد من تناول كامل الجرعة الدوائية.

- لا يجوز إستعمال الماء الساخن (٤٠ درجة مئوية وما فوق) أو المشروبات
الغازية عند تناول إينتينليس.

(X) تعليمات لفتح القنينة: يوجد للقنينة غطاء أمان يمنع فتحه بالصدفة من
قبل الأطفال.



يجب فتح القنينة بالضغظ على الغطاء بإتجاه الأسفل
من خلال تدويره بعكس عقارب الساعة ونزع الغطاء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

(X) إذا تناولت بالخطأ مقدارا دوائيا أكبر، توجه حالاً إلى الطبيب أو الصيدلي.
الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لـ إينتينليس هي: طفح، إسهال، غثيان وصداع
(أنظر الفقرة ٤ "الأعراض الجانبية").

(X) إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد وتذكرت بذلك حتى ٦
ساعات من الموعد الذي توجب عليك تناول الدواء فيه، فيجب تناول جرعة حال
تذكرتك وادما بعد وجبة الطعام، ومواصلة تناول الجرعة القادمة كالمعتاد.

إذا مرت أكثر من ٦ ساعات من الموعد الذي توجب عليك تناول الدواء فيه، فيجب
تقوية الجرعة المسسية ومواصلة تناول الجرعة القادمة كالمعتاد.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدارين دوائيين سوية للتعويض عن
المقدار الدوائي المنتسى!

إذا تقيأت بعد أقل من ٤ ساعات من تناول إينتينليس، تناول قرص إضافي بعد
وجبة الطعام. إذا تقيأت بعد أكثر من ٤ ساعات من تناول إينتينليس، فلا حاجة
بتناول قرص إضافي حتى الموعد التالي الذي يتوجب عليك فيه تناول الدواء.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

(X) يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن
إستعمال إينتينليس قبل مواظقة الطبيب.

(X) من الجائز أن يسبب لك العلاج الشعور بشكل أفضل. لا يجوز التوقف عن
العلاج بالدواء أو بالأدوية الأخرى المضادة لـ HIV بدون إستشارة الطبيب،
حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إن التوقف عن العلاج بدون موافقة
الطبيب قد يزيد من خطورة أن تطور الفيروس مقاومة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد
من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية
إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب
أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إينتينليس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.
لا تتدهور من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيأ منها.

أعراض جانبية شائعة جدا (very common) (أعراض تظهر لدى أكثر من
مستعمل واحد من بين عشرة):

(X) طفح جلدي عادة طفيف أو متوسط الشدة. بلغ في حالات نادرة عن حدوث
طفح شديد الذي يمكن أن يشكل خطراً على الحياة ولذلك إذا تطور طفح من
المهم إبلاغ الطبيب حالا لكي يوصيك بكمية معالجته وفيما إذا توجب التوقف
عن العلاج بالدواء.

(X) صداع

(X) إسهال، غثيان

أعراض جانبية شائعة (common) (أعراض تظهر لدى ١ - ١٠ مستعملين
من بين ١٠٠):

(X) رد فعل تحسسي (فرط حساسية)

(X) السكري، تناقص الشهية للطعام

(X) قلق، نعاس، قلة النوم، مشاكل في النوم.

(X) خنز أو ألم في اليدين أو الرجلين، خدر، فقدان الحس في الجلد، فقدان
الذاكرة، إرهاق.

(X) ضبابية الرؤية

(X) فشل كلوي، ارتفاع ضغط الدم، نوبة قلبية، ضيق تنفس أثناء الجهد.

(X) تقيؤات، حرقان، ألم في البطن، نفخة في منطقة البطن، إلتهاب المعدة،
غازات، إمساك، إلتهاب الفم، جفاف الفم.

(X) تعرق ليلي، حكة، جفاف الجلد.

(X) تغير في قيم فحوص الدم أو البول. يشرح لك الطبيب ذلك. مثلاً: إنخفاض
كريات الدم الحمراء.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) (أعراض تظهر لدى ١ - ١٠
مستعملين من بين ١٠٠٠):

(X) إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء

(X) أعراض تلوث (مثل تضخم الغدة اللعابية وسخونة)

(X) آلام غير عادية، إرتباك، توهان، عصبية، كوابيس.

(X) نعاس، رجفة، إغماء، نوبات، إضطرابات في الإصغاء.

(X) دوار، ثقل

(X) ألم في الصدر/ ضغط في الصدر، عدم إنتظام نظم القلب

(X) صعوبات في التنفس

(X) محاولات فاشلة للتقيؤ، إلتهاب البنكرياس، تقيؤ دم.

(X) مشاكل في الكبد مثل إلتهاب الكبد، تضخم الكبد.

(X) تعرق زائد، إنتفاخ الوجه و/أو الحنجرة.

(X) تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض تظهر لدى ١ - ١٠ مستعملين من
بين ١٠٠٠٠):

(X) سكتة

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

(X) ردود فعل لفرط حساسية شديدة التي تتميز بطفح يتراقد بسخونة وإلتهاب
أي عضو مثل إلتهاب الكبد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما
تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط
"تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية
لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.eg) الذي يوجهك إلى النماذج المبشر
للتبليغ عن أعراض جانبية.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسسم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن
متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تبين أنت الذي يتوجب عليك تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر
على ظهر العبوة الخارجية/ ملصقة القنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم
الأخير من نفس الشهر.

(X) لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. يجب تخزين
الأدوية في القنينة الأصلية. يجب حفظ القنينة محكمة الإغلاق للحماية من
الرطوبة.

تحتوي القنينة على ٣ أكياس صغيرة التي تحتوي على مادة ماصة للرطوبة
وبذلك تسمح بالمحافظة على جفاف الأقراص. يجب إبقاء الأكياس ضمن القنينة
في كل وقت. الأكياس غير مخصصة للأكل.

بعد فتح القنينة لأول مرة، لا يجوز إستعمال هذا الدواء بما يتجاوز
شهرين إثنتين.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Intelence 100 mg: hypromellose; microcrystalline cellulose;
croscarmellose sodium; magnesium stearate; colloidal anhydrous silica

وبالإضافة لذلك:

lactose monohydrate 160.0 mg

Intelence 200 mg: hypromellose; silicified microcrystalline
cellulose; microcrystalline cellulose; croscarmellose sodium;
magnesium stearate; colloidal anhydrous silica

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

إينتينليس ١٠٠ ملغ هو عبارة عن قرص بيضوي ذو لون أبيض - بيج عليه الكتابة
T125 من جانب واحد والكتابة 100 من الجانب الثاني.

بكل عبوة هناك قنينة واحدة من البلاستيك تحتوي على ١٢٠ قرصاً من إينتينليس
١٠٠ ملغ. بالإضافة لذلك يوجد بكل قنينة ٣ أكياس صغيرة تحتوي على مادة
ماصة للرطوبة وذلك تسمح بالمحافظة على جفاف الأقراص. يجب إبقاء
الأكياس ضمن القنينة في كل وقت.

إينتينليس ٢٠٠ ملغ هو عبارة عن قرص مطاول، محدب الجانبين، ذو لون
أبيض - بيج، عليه الكتابة T200 من جانب واحد.

تحتوي عبوة البلاستيك على ٦٠ قرصاً من إينتينليس ٢٠٠ ملغ. بالإضافة لذلك
يوجد بكل قنينة ٣ أكياس صغيرة تحتوي على مادة ماصة للرطوبة وبذلك تسمح
بالمحافظة على جفاف الأقراص. يجب إبقاء الأكياس ضمن القنينة في كل وقت.

صاحب الإمتياز: جيني - سي هيث كير م.ض، كيبوش شفاييم ٦٠٩٩٠٠،
إسرائيل.

المنتج: يانسن سيلاج، فيا، سي. يانسن ٠٠٤١٠٠، بورجو سان ميشيل، لاتينا، إيطاليا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص وُرخص في تاريخ
٢٠١٦/٠٣/٠٣ وتم تحديثها بحسب تعليمات وزارة الصحة في تاريخ
٢٠١٩/٠١/٠٧

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إينتينليس ١٠٠ ملغ: ١٤١٢٩٢١٧٨٩٠٠

إينتينليس ٢٠٠ ملغ: ١٤٩٦١٣٣٦٦٠٠

من أجل سهولة وتوحيين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.