

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أبسترال 400 مكغ

أبسترال 600 مكغ

أبسترال 800 مكغ

أبسترال 100 مكغ

أبسترال 200 مكغ

أبسترال 300 مكغ

أقراص للأخذ تحت اللسان

### التركيب:

كل قرص يحتوي على:

المادة الفعالة وكميتها:

أبسترال 100 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 100 mcg

أبسترال 200 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 200 mcg

أبسترال 300 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 300 mcg

أبسترال 400 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 400 mcg

أبسترال 600 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 600 mcg

أبسترال 800 مكغ: فنتانيل (كتسيترات) Fentanyl (as citrate) 800 mcg

مواد غير فعالة ومؤرجات: أنظر بند 6 في النشرة : "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل البدء باستخدام الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف لك. لا تعطه إلى آخرين, فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن مرضهم مماثل. الدواء مخصص للبالغين فوق جيل 18.

- تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات, أدوية أخرى مثبطة لجهاز الاعصاب المركزي (بما في ذلك سموم) أو كحول قد تسبب شعور بالنعاس العميق, صعوبات في التنفس (خمود تنفسي), غيبوبة وموت.
- قد تؤدي الأدوية من عائلة الأفيونيات لإدمان, بالأساس عند استعمال مستمر, وهي ذات امكانية لاستعمال سيء وجرعة مفرطة. قد يتجلى رد فعل لجرعة مفرطة بتنفس بطيء وحتى التسبب بموت. تأكد بأنك تعرف اسم الدواء, الجرعة التي تأخذها, وتيرة الإعطاء, مدة العلاج, الأعراض الجانبية والاختطارات الممكنة. معلومات إضافية بخصوص الاختطار لتعلّق وإدمان يمكن إيجادها في الرابط:

[https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids\\_he.pdf](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf)

## 1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

أبسترال مُخصص لعلاج الألم الاخرقائي لدى مرضى السرطان الذين يُعالجون بأدوية قوية لتسكين الأوجاع (أفيونيات) بشكل ثابت.

الألم الاخرقائي هو ألم يظهر بشكل مفاجئ, بالرغم من أنك تستعمل مسكنات آلام أفيونية بشكل ثابت.

**الفصيلة العلاجية:** المادة الفعالة بأقراص أبسترال للأخذ تحت اللسان هي فنتانيل. فنتانيل ينتمي لمجموعة أدوية مخدرة قوية تستعمل لتسكين الآلام والتي تسمى أفيونيات.

## 2. قبل استعمال الدواء

### X لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساسًا (لديك حساسية) للمادة الفعالة فنتانيل أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في بند 6).
- إذا كنت تعاني من مشاكل وخيمة في التنفس.
- إذا كنت لا تستعمل بشكل ثابت أدوية تستلزم وصفة طبيب من نوع أفيون يوميًا وفي أوقات ثابتة لمدة أسبوع على الأقل للسيطرة على ألمك المتواصل (على سبيل المثال أدوية أفيونية مثل: كودائين, فنتانيل, هيدرومورفون, مورفين

أوكسيكودون, فيتدين). إذا لم تكن تستعمل دواء من هذا النوع, لا يجوز لك استعمال أبلسترال لأن الدواء قد يرفع الاختطار لتنفس بطيء و/أو سطحي بشكل خطير, أو لانقطاع النفس.

• إذا كنت تعاني من ألم قصير الأمد المختلف عن الألم الاختراقي.

### ! تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

أخبر طبيبك أو الصيدلي قبل العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الحالات التالية, لأن طبيبك سيحتاج للأخذ بالاعتبار هذه المعلومات لملائمة الجرعة من أجلك:

- إصابة في الرأس, لأن أبلسترال يمكن أن يحجب مدى خطورة الإصابة.
- مشاكل في التنفس أو إذا كنت تعاني من مرض ضعف العضلات (مياستينيا غرافيس).
- إذا كنت تعاني من مشاكل قلب وخاصة إذا كنت تعاني من نظم قلب بطيء.
- ضغط دم منخفض.
- مرض في الكبد أو الكلى, قد يتوجب على طبيبك أن يلائم الجرعة بمزيد من الحذر.
- ورم في المخ و/أو ارتفاع بالضغط داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط في الدماغ الذي يسبب آلام شديدة في الرأس, غثيان/ تقيؤ وضبابية في الرؤية).
- تقرحات في الفم أو التهاب في العشاء المخاطي للفم (انتفاخ واحمرار بتجويف الفم).
- إذا كنت تتناول أدوية ضد الاكتئاب أو الذهان, إقرأ بإمعان البند التالي "أدوية أخرى وأبلسترال".
- إذا تطور لديك في إحدى المرات قصور كلوي أو نقص في الهرمونات الجنسية (نقص في الإندروجين) مع استعمال الأفيونات.

في فترة العلاج بأبلسترال, عليك إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول هذا الدواء, إذا:

- كنت تنوي الخضوع لعملية جراحية أيًا كانت.
- إذا كنت تعاني من ألم أو حساسية متزايدة للألم (hyperalgesia) واللذان لا يستجيبان لمقدار دوائي أكبر من الدواء كما حدد لك من قبل الطبيب.
- كنت تعاني من دمج الأعراض التالية: غثيان, تقيؤ, فقدان الشهية للطعام (anorexia), إرهاق, ضعف, دوار وانخفاض ضغط الدم. دمج الأعراض التالية قد يشكل مؤشر لحالة خطر ممكن على الحياة, والتي تسمى قصور الغدة الكظرية, وهي حالة التي لا تنتج فيها الغدة الكظرية قدر كافي من الهرمونات.

### أدوية أخرى وأبلسترال

إذا كنت تتناول, أو تناولت مؤخرًا, أدوية أخرى يشمل الأدوية التي تباع بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية, أبلغ بذلك الطبيب أو الصيدلي.

أدوية معينة قد تزيد أو تنقص من تأثيرات أبلسترال. لذلك أخبر الطبيب إذا كنت على وشك البدء بالعلاج, تغيير الجرعة أو توقف العلاج بالأدوية التالية لأنه قد يتوجب على الطبيب ملائمة جرعة أبلسترال :

- أدوية مضادة للفطريات المستعملة لعلاج العدوى الفطرية- مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول.
- مضادات حيوية من مجموعة الماكروليدات المستعملة لعلاج العدوى, مثل إيريثروميسين.
- أدوية مضادة للفيروسات التابعة لعائلة مثبطات الأنزيم بروتياز المستعملة لعلاج تلوّثات الناجمة عن الفيروسات - مثل ريتونافير.
- ريفامبين أو ريفابوتين (أدوية المستعملة لعلاج تلوّثات بكتيرية) .
- كاربامازيبين, فينيتوين أو فينوباربيتال (أدوية المستعملة لعلاج الاختلاجات/الصرع).
- أدوية من مصدر نباتي التي تحتوي هيبيريكوم [St John's wort (*Hypericum perforatum*)].
- أدوية تحتوي على كحول.
- أدوية من عائلة مثبطات الأنزيم مونوأمين أوكسيداز (MAOI), المستعملة لعلاج الاكتئاب الوخيم وبمرض باركنسون. أبلغ طبيبك إذا تناولت دواء من هذا النوع خلال الأسبوعين الأخيرين.
- أنواع معينة من مسكنات الألم القوية, المسمى محاكيات أو مثبطات جزئية مثل ثوبريئورفين, نيلفوفين وفينتروستين. من الممكن أن تشعر بأعراض متلازمة الفطام (مثل غثيان, تقيؤ, إسهال, قلق, قشعريرة, رجفة وتعرق) خلال استعمال هذه الأدوية.

أبلسترال ممكن أن يزيد من التأثير المُنوم للأدوية التالية وأيضًا زيادة الإختطار (احتمال الخطر) لخمود تنفسي وانخفاض ضغط الدم:

- أدوية أخرى لتسكين الألم القوية (أدوية من عائلة الأفيونيّات لتسكين الألم أو السعال)
- أدوية للتخدير العام (المعدة للتخدير بوقت العمليات الجراحية)
- أدوية مرخية للعضلات
- أدوية منومة

- أدوية لعلاج:
  - ◀ الاكتئاب
  - ◀ الحساسية (مضادات هيستامين منومه مُعيقَات H1)
  - ◀ قلق وذهان (أدوية من عائلة الباريتورات, بنزوديازيبينات, أدوية منومه أو مضادة للقلق)
- أدوية تحتوي على كلونيدين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم)

الاختطار لأعراض جانبية يرتفع إذا كنت تتناول أدوية مثل مضادات اكتئاب أو مضادة للذهان, لأنه يُحتمل تفاعل بين الأدوية المتمثل بتغيرات في الوضع النفسي [على سبيل المثال تهيج (عدم هدوء), هلوسة, غيبوبة], وأعراض أخرى مثل سخونة مرتفعة فوق 38 درجة مئوية, ارتفاع بنظم القلب, ضغط دم غير مستقر ومُنْعَكسات معرزة, تصلب عضلات, قلة تنسيق و/أو أعراض في الجهاز الهضمي (مثلًا غثيان, تقيؤات, إسهال). في هذه الحالة, سينصحك الطبيب إذا كان أبتسترال ملائمًا لك.

### استعمال الدواء بالتزامن مع الغذاء والشراب

عصير الجريب فروت ممكن أن يزيد من خطر الأعراض الجانبية لأبتسترال لذلك يمنع شرب عصير الجريب فروت في فترة العلاج بأبتسترال.

### استعمال الدواء وتناول الكحول

أبتسترال ممكن أن يسبب النعاس لدى مرضى معينين. لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن يسبب نعاس مفرط.

### الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال أبتسترال إذا كنت حاملاً, إلا إذا قيل غير ذلك من قبل الطبيب بشكل صريح لأن فنتانيل ممكن أن يسبب أعراض الفطام عند المولود ويشكل خطرًا على حياته.  
لا يجوز الإرضاع في فترة العلاج بأبتسترال, ولا يجوز بدء الإرضاع قبل مرور على الأقل 5 أيام على الجرعة الأخيرة من أبتسترال فنتانيل قد ينتقل لحليب الأم ومن الممكن أن يسبب نعاس وخمود تنفسي لدى الطفل الرضيع.  
إذا كنت حاملاً أو مُرضعة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.

### السياقة واستعمال الآلات

أبتسترال يمكن أن يضر بقدرتك النفسية و/ أو الجسدية على تنفيذ مهام ذات اختطار محتمل مثل السياقة أو تشغيل آلات. إذا كنت تشعر بالدوار, ضبابية بالرؤية أثناء استعمال أبتسترال, لا يجوز قيادة المركبة أو تشغيل آلات.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

قبل بدء العلاج بأبتسترال سيشرح لك طبيبك كيف عليك أن تتناول أبتسترال للحصول على تخفيف ناجع للألم الإخترافي. يجب استعمال الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا. المستحضر مُعد لاستعمالك فقط بحسب تعليمات طبيبك. المستحضر ممنوع للاستعمال من قبل شخص آخر غيرك, لأنه من الممكن أن يشكل خطرًا وخيمًا على الصحة, خاصةً لدى الأطفال.  
أبتسترال هو دواء مختلف عن أدوية أخرى قد تكون تناولتها بالماضي لعلاج ألم إخترافي. دائماً يجب تناول أبتسترال بالجرعة التي حدت لك من قبل طبيبك - هذه الجرعة ممكن أن تكون مختلفة عن الجرعة لأدوية أخرى كنت قد تناولتها بالماضي لعلاج الألم الإخترافي.

الجرعة وطريقة الاستعمال يُحددان من قبل طبيبك فقط. الجرعة الاعتيادية عادة هي:

### بداية العلاج - إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة

لكي يعمل أبتسترال بنجاعة, على الطبيب أن يحدد الجرعة الأكثر ملائمة لعلاج ألمك الإخترافي. أبتسترال يُسوق بعدة جرعات. ممكن أن يُطلب منك أن تُجرب جرعات مختلفة من أبتسترال لفترة عدة نوبات من الألم الإخترافي لإيجاد الجرعة الأكثر ملاءمة لك. طبيبك سيساعدك على ذلك وسيوجهك كيف تجد قوة القرص الأكثر ملاءمة لك. إذا لم تشعر بتحسّن الألم بشكل كافي بعد جرعة واحدة, من الممكن أن يرشدك طبيبك لتناول جرعة إضافية لعلاج نوبة الألم الإخترافي.

لا يجوز تناول جرعة إضافية, إلا إذا أمرك طبيبك بذلك, لأن هذا الشيء من الممكن أن يؤدي إلى استهلاك جرعة زائدة. من الممكن أن يأمرك الطبيب أن تتناول جرعة تحتوي على أكثر من قرص واحد على التوالي. يمكن القيام بذلك فقط إذا أمرك الطبيب بذلك بشكل صريح.

يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول الجرعة الأخيرة من أبتسترال وحتى تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من ألم إخترافي.

**جرعة المُداوِمة (استكمال العلاج) - بعد أن تم إيجاد الجرعة الأكثر ملائمة لك**  
في اللحظة التي وجدت أنت وطبيبك جرعة الأيسترال التي تتحكم بألمك الاختراقي, لا يجوز تناول هذه الجرعة أكثر من أربع مرات في اليوم. **جرعة أيسترال ممكن أن تكون أكثر من قرص واحد.**  
يجب الانتظار ساعتين على الأقل من تناول جرعة الأيسترال الأخيرة وقبل تناول الجرعة القادمة لعلاج نوبة إضافية من الألم الاختراقي.  
إذا بحسب رأيك جرعة الأيسترال التي تتناولها لا تتحكم بألمك الاختراقي بشكل كافٍ, أخبر طبيبك, من الممكن أن هناك حاجة لملاءمة الجرعة من جديد.  
لا يجوز تغيير جرعة أيسترال, إلا إذا قيل ذلك بشكل صريح من قبل الطبيب.  
**لا يجوز تخطي الجرعة الموصى بها.**

#### **كيفية الاستعمال:**

أيسترال مُعد للاستعمال تحت اللسان. يجب وضع القرص تحت اللسان, هناك سوف يذوب بسرعة, وهكذا المادة الفعالة, فنتانيل, يُمتص بالغشاء المخاطي للفم. وعندما يُمتص, فنتانيل يبدأ بتسكين الأوجاع.  
عندما تعاني من ألم اختراقي, خذ الجرعة التي خُددت من قبل طبيبك بالشكل التالي:

- إذا كان فمك جافاً, تناول الماء لترطبيه. ممكن بصق أو بلع الماء.
- أخرج القرص من لويحة الأقراص (البليستر) فوراً قبل الاستعمال على النحو التالي:
  - ◀ إفصل واحد من مربعات لويحة الأقراص (البليستر) عن طريق التمزيق على طول الخطوط الفاصلة (أترك باقي مربعات لويحة الأقراص (البليستر) مع بعض).
  - ◀ قم بتقسير طرف رقائق الألومنيوم باتجاه السهم المُعلم, وأخرج القرص بحذر. لا تحاول دفع القرص عن طريق غطاء الرقاقة, لأن هذا الشيء ممكن أن يضر به.
- ضع القرص تحت اللسان إلى الوراء قدر المستطاع حتى ذوبانه التام.
- أيسترال سيذوب بسرعة تحت اللسان وسيُمتص لكي يخفف من الألم.

**لا يجوز مص, شطر, سحق, مضغ أو بلع القرص.**

**يجب وضع القرص بكامله تحت اللسان.**

**لا يجوز الشرب أو الأكل حتى الذوبان التام للقرص تحت اللسان.**

#### **إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة:**

- يجب إخراج بقايا الدواء فوراً من الفم.
- أخبر مُعالجك بذلك أو شخص آخر.
- توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. على مُرافق المريض أن يحافظ على يقظة المريض بواسطة التحدث معه أو هزه من حين إلى آخر.

#### **أعراض الجرعة المفرطة تشمل:**

- نعاس متطرف
- تنفس سطحي وبطيء
- غيبوبة

في حالة ظهور هذه الأعراض يجب استدعاء مساعدة طبية طارئة فوراً.

إذا تناول بالخطأ بالغ أو طفل من الدواء, يجب نقله فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ بالمستشفى وإحضار عبوة الدواء.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

#### **إذا توقفت عن تناول الدواء**

إذا أصبحت لا تعاني من الألم الاختراقي, باستطاعتك إيقاف استعمال أيسترال لكن عليك الاستمرار باستعمال دوائك الأفيوني الثابت لمعالجة الألم المتواصل وفقاً لتعليمات طبيبك.  
إذا توقفت عن تناول أيسترال, قد تعاني من أعراض فُطام التي تشبه الأعراض الجانبية الخاصة بأيسترال.

إذا كنت تعاني من أعراض فُطام أو كنت قلقاً من تسكين ألمك, عليك استشارة الطبيب. سينظر الطبيب فيما إذا كنت بحاجة لدواء لمعالجة أعراض الفُطام.

لا يجوز تناول أدوية بالظلام! تحقق من الملمصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بما يخص استعمال الدواء, قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. أعراض جانبية

ككل أيّ دواء، قد يسبب استعمال أبيتريال أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

إذا كنت تشعر بالنعاس بشكل متطرف أو غير عادي، أو تنفسك يصبح بطيء أو سطحي، يجب التوجه فوراً للطبيب أو للمستشفى القريب لتلقي علاج طارئ (أنظر أيضاً فصل 3 "إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة").  
أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):  
• الغثيان

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- دوار، آلام رأس، نعاس زائد
- ضيق في التنفس
- التهاب بتجويف الفم، تقيؤ، إمساك، جفاف في الفم
- تعرق، انهك/ تعب/ قلة الطاقة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- تفاعلات أرجية (حساسية)، رجفة، اضطرابات بالرؤية أو ضبابية الرؤية، إبطاء أو تسارع نظم القلب، ضغط دم منخفض، فقدان الذاكرة
- اكتئاب، أفكار شوكية أو الشعور بالخوف بدون سبب، شعور بالارتباك، شعور بعدم الإدراك، شعور بقلق/ قلة هدوء/ حزن، شعور بالفرحة غير عادي (شمتق)، تغيرات بالمزاج
- شعور متواصل بالامتلاء، ألم بالبطن، عسر الهضم (اضطراب بالمعدة)
- قرحات بالفم، مشاكل باللسان، ألم بالفم أو بالحلق، ضغط بالحلق، قرحات بالشفاه أو باللثة
- فقدان الشهية، فقدان أو تغير بحاسة الذوق/ الشم
- صعوبة بالخلود إلى النوم أو اضطرابات بالنوم، قلة الانتباه/سهولة الشرود، قلة الطاقة/ضعف
- اضطرابات بالجلد، طفح جلدي، حكة، تعرق ليلي، انخفاض بحساسية للمس، الميل للإصابة بسهولة
- ألم أو تصلب بالمفصل، تصلب عضلات
- أعراض الطعام من السموم (مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، قلق، قشعريرة، رجفة، تعرق)، تناول جرعة مفرطة بالخطأ، لدى الرجال: عدم القدرة على الوصول/ أو المحافظة على الانتصاب، شعور عام غير جيد.

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (الشيوخ لا يمكن تقديره بالاعتماد على المعطيات الموجودة):

- لسان منتفخ، مشاكل تنفس وخيمة، سقوط، إحمرار الوجه، شعور بالدفء المفرط، إسهال، إختلاجات (تشنجات)، انتفاخ اليبدين أو الرجلين، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة)، سخونة، تعلق بالسموم (إدمان)، استعمال مفرط للسموم، انخفاض في مستوى الوعي أو فقدان الوعي وطفح مثير للحكة.

إن الاستعمال المتواصل لـ فينتانيل خلال الحمل قد يسبب أعراض فطام لدى المولود والتي قد تشكل خطراً على الحياة (أنظر البند 2).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت بموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الموجه للاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe>  
[ctMedic@moh.gov.il](mailto:ctMedic@moh.gov.il)

كذلك، يمكن التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني لوحدة سلامة المُعالجين لصاحب التسجيل:  
[drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

#### 5. كيف تخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! أبيتريال هو دواء قوي جداً لتسكين الآلام الذي قد يُشكل خطراً على الحياة إذا ما أخذ بالخطأ من قبل طفل. لذلك، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق ومقفّل بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يُوصى بحفظ هذا الدواء بمكان مقفل.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة الخارجية واللوحة (البلستر). تاريخ انتهاء الصلاحية يشير لليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية يجب التخزين في عبوة اللوحة (بلستر) الأصلية للحماية من الرطوبة.
- كيف يتم التخلص من أقراص ليس لها استعمال؟ إذا بقي لديك أقراص أبسترال ليس لها حاجة أكثر، يجب إعطائها للصيدلية القريبة لكي يتم إتلافها بطريقه آمنة وبذلك المحافظة على البيئة. لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو القمامة البيئية.

## 6. معلومات إضافية

- بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:  
Mannitol, Silicified microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

### • كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- أبسترال هو قرص أبيض صغير للأخذ تحت اللسان. القرص يأتي بقوة وأشكال مختلفة. طبيبك يصف لك القوة وعدد الأقراص الملائم لك.
- قرص أبسترال 100 مكغ هو قرص أبيض مستدير
- قرص أبسترال 200 مكغ هو قرص أبيض بيضوي الشكل
- قرص أبسترال 300 مكغ هو قرص أبيض بشكل مثلث
- قرص أبسترال 400 مكغ هو قرص أبيض بشكل جوهرة
- قرص أبسترال 600 مكغ هو قرص أبيض بشكل الحرف "D"
- قرص أبسترال 800 مكغ هو قرص أبيض بشكل كبسولة
- يسوق أبسترال بعبوات تحتوي 10 أو 30 قرص. الأقراص معبئة بلويحات (بلستر).

قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.

- اسم صاحب التسجيل وعنوانه: نينوفارم م.ض، هشيلاواح 6، ص.ب. 7063، بيتح تكفا 4917001.

### • اسم المنتج وعنوانه:

إسيكا كوينبورو م.ض، كوينبورو، كينت، بريطانيا لصالح كياوا كيرين م.ض، چلشيلس، بريطانيا.

- فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ 10.2015 وتم تحديثها وفق تعليمات وزارة الصحة في تاريخ 07.2019.

### • أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أبسترال 100 مكغ	148 73 33262
أبسترال 200 مكغ	148 74 33263
أبسترال 300 مكغ	148 75 33264
أبسترال 400 مكغ	148 76 33265
أبسترال 600 مكغ	148 77 33266
أبسترال 800 مكغ	148 78 33267

\* للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

