

Important!

Read this Quick Start Guide and Patient Leaflet Carefully

Work with your doctor when taking Venclexta.

- Your doctor may schedule blood tests before and during treatment with Venclexta to check for side effects.
- Follow your doctor's instructions exactly about:
 - When to start Prep Day 1
 - When you should take your first dose
- Ask your doctor if you have any additional questions.

How do I take Venclexta?

Take your dose:

- 1 time a day with a meal and water
- at about the same time each day

Swallow each tablet whole. Do not chew, crush or break the tablets.

Write the day of the week and the date you took your dose in each calendar box to keep track of your dose and water.

What if I miss my dose?

If it has been **less than 8 hours**, take your dose as soon as possible. If it has been **more than 8 hours**, skip the missed dose. Take the next dose at your usual time.

Before your first dose



1.5-2 L (6-8 glasses)

It is important to stay hydrated. Drink water every day when taking Venclexta.

Pay special attention:

- on Prep Day 1
- on Prep Day 2
- on the days marked "Drink Water"

Drink at least 1.5-2 L (6-8 glasses) of water throughout the day.

Before 1st Dose

Prep Day 1 and Prep Day 2 are the 2 days before the first dose of Venclexta, as directed by your doctor.

Prep Day 1

Prep Day 2



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)

Week 1

Day 1



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 10 mg tablets

Day 2



Take two 10 mg tablets

Day 3



Take two 10 mg tablets

Day 4



Take two 10 mg tablets

Day 5



Take two 10 mg tablets

Day 6



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 10 mg tablets

Day 7



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 10 mg tablets

Week 2

Day 1



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 50 mg tablet

Day 2



Take one 50 mg tablet

Day 3



Take one 50 mg tablet

Day 4



Take one 50 mg tablet

Day 5



Take one 50 mg tablet

Day 6



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 50 mg tablet

Day 7



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 50 mg tablet

Week 3

Day 1



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 100 mg tablet

Day 2



Take one 100 mg tablet

Day 3



Take one 100 mg tablet

Day 4



Take one 100 mg tablet

Day 5



Take one 100 mg tablet

Day 6



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 100 mg tablet

Day 7



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take one 100 mg tablet

Week 4

Day 1



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 100 mg tablets

Day 2



Take two 100 mg tablets

Day 3



Take two 100 mg tablets

Day 4



Take two 100 mg tablets

Day 5



Take two 100 mg tablets

Day 6



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 100 mg tablets

Day 7



Drink Water 1.5-2 L (6-8 glasses)
Take two 100 mg tablets

The content was checked and approved by the Ministry of Health in March 2019

VENCLEXTA
(10, 50, 100 mg venetoclax) Tablets

CLL/SLL Starting Pack Quick Start Guide

Read this Quick Start Guide before you start taking your medication.

Use this Quick Start Guide to:

- Prepare for your medication.
- Understand your medication schedule.
- Correctly take your medication.

SH VEN APP GUIDE MAR 19 V2

יצרן: אבביב, צפון שיקגו, ארה"ב
Manufacturer: AbbVie Inc., North Chicago, USA

abbvie

התוכן נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במרץ 2019

ונקלקסטה
(10, 50, 100 מ"ג) טבליות (venetoclax)

מדרג מתחיל להחלפת הטיפול CLL/SLL

יש לקרוא את המדרג המוקדם להחלפת הטיפול לפני שתתחיל לקחת את התרופה.

יש להשתמש במדרג המוקדם להחלפת הטיפול כדי:

- להתכונן לקראת נטילת התרופה.
- להבין את לוח הזמנים של נטילת התרופה.
- לקחת את התרופה בצורה נכונה.

התוכן נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במרץ 2019

פנקלקסטה
(10, 50, 100 מ"ג) טבליות (venetoclax)

עבודה ראשונה לטיפול CLL/SLL

יש לקרוא את המדרג המוקדם להחלפת הטיפול לפני שתתחיל לקחת את התרופה.

יש להשתמש במדרג המוקדם להחלפת הטיפול כדי:

- להתכונן לקראת נטילת התרופה.
- להבין את לוח הזמנים של נטילת התרופה.
- לקחת את התרופה בצורה נכונה.

חשוב!

קרא בעיון את המדריך המקוצר להתחלת הטיפול ואת העלון לצרכן

יש לשתף פעולה עם הרופא במהלך הטיפול עם ונקלקסטה.

- ייתכן שהרופא יקבע עבורך בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול עם ונקלקסטה, על מנת לבדוק הופעת תופעות לוואי.
- יש לנהוג בדיוק על-פי הנחיות הרופא לגבי:
 - מתי להתחיל את 'יום ההכנה הראשון'
 - מתי עליך לקחת את המנה הראשונה
- אם יש לך שאלות נוספות כלשהן, פנה אל הרופא.

כיצד עליי לקחת ונקלקסטה?

קח את המנה שלך:

- פעם אחת ביום עם ארוחה ומים
- בערך באותה השעה בכל יום
- יש לבלוע כל טבליה בשלמותה. אין ללעוס, לכתוש או לשבור את הטבליה.
- יש לרשום את היום בשבוע ואת התאריך שבו לקחת את המנה שלך בכל תיבה המיועדת לתאריך כדי לעקוב אחר המנה שלך והמים.

אם שכחתי לקחת את המנה שלי

אם עברו פחות מ- 8 שעות, קח את המנה שלך בהקדם האפשרי.

אם עברו יותר מ- 8 שעות, דלג על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

מهم!

اقرأ الدليل المختصر لبدء العلاج والنشرة للمستهلك بتمعن

يجب التعاون مع الطبيب خلال فترة العلاج بفينكليكستا.

- من الجائز أن يطلب منك الطبيب أن تجتاز فحوص الدم قبل وخلال العلاج بفينكليكستا، وذلك من أجل تقصي ظهور أعراض جانبية.
- يجب التصرف بالضبط حسب تعليمات الطبيب بخصوص:
 - متى تبدأ "اليوم الأول للتحضير"
 - متى يتوجب عليك تناول الجرعة الدوائية الأولى
- إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية، راجع الطبيب.

كيف يتوجب علي تناول فينكليكستا؟

تناول جرعتك الدوائية:

- مرة واحدة في اليوم مع وجبة طعام وماء
- تقريبا في نفس الساعة كل يوم

يجب بلع كل قرص بشكله الكامل. لا يجوز مضغ، سحق أو كسر الأقراص.

يجب تدوين اليوم من الأسبوع والتاريخ الذي تناولت فيه جرعتك الدوائية في كل خانة مخصصة للتاريخ وذلك لمتابعة جرعتك الدوائية وشرك للماء.

إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية خاصتي

إذا انقضت أقل من - 8 ساعات، تناول جرعتك الدوائية بأسرع ما يمكن.

إذا انقضت أكثر من - 8 ساعات، فوّت الجرعة الدوائية المتسبة. تناول الجرعة التالية في الوقت الإعتيادي.

לפני המנה הראשונה שלך



יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות)

חשוב שתהיה רווי בנוזלים. יש לשתות מים כל יום במהלך הטיפול עם ונקלקסטה. יש לשים לב במיוחד:

- ל-'יום ההכנה הראשון'
- ל-'יום ההכנה השני'
- לימים המסומנים ב-'יש לשתות מים'

יש לשתות לפחות 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) של מים במשך היום.

قبل جرعتك الدوائية الأولى



يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس)

من المهم أن تكون مشبع بالسوائل. يجب شرب الماء كل يوم خلال فترة العلاج بفينكليكستا. يجب الإنتباه خاصة:

- لـ "اليوم الأول للتحضير"
- لـ "اليوم الثاني للتحضير"
- للأيام المعلمة بـ "يجب شرب الماء"

يجب أن تشرب على الأقل 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) من الماء خلال اليوم.

יום ההכנה הראשון
اليوم الأول للتحضير

יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות)
يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس)

יום ההכנה השני
اليوم الثاني للتحضير

יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות)
يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس)

'יום ההכנה הראשון' ו'יום ההכנה השני' הם 2 הימים שלפני המנה הראשונה של ונקלקסטה, בהתאם להנחיות הרופא.

"اليوم الأول للتحضير" و "اليوم الثاني للتحضير" هما اليومان ما قبل الجرعة الدوائية الأولى من فينكليكستا، وفقاً لتعليمات الطبيب.

לפני המנה הראשונה
قبل الجرعة الأولى

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ	יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליה של 10 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار 10 ملغ

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ	יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار 50 ملغ

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من עيار 100 ملغ	יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار 100 ملغ

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ	יש לשתות מים 2-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליה של 100 מ"ג يجب شرب الماء 2-1.5 لتر (8-6 كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار 100 ملغ