

## ריפאליד 0.5 מ"ג

## ריפאליד 1 מ"ג

## ריפאליד 2 מ"ג

### טבליות

כל טבילה של ריפאליד 0.5 מ"ג מכילה 0.5 מ"ג רפאגלייניד (Repaglinide).

כל טבילה של ריפאליד 1 מ"ג מכילה 1 מ"ג רפאגלייניד (Repaglinide).

כל טבילה של ריפאליד 2 מ"ג מכילה 2 מ"ג רפאגלייניד (Repaglinide).

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 לעיל.

### קרא בעיון את העלון עד סוף בטומת תשטמש

בתרטופה. עלון זה מכל מידע תמצית או תרופה. אם

שמור עלון זה, יתכן שתטרטה לעין בו שוב.

תרופה זו גורשה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה

לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראתה לך כי

מצבם הרפואי דומה. אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה

או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי של האזהרה בעילן,

עליך להתיעץ עם הרופא או עם הרוקח.

הטורפה מיועדת לטיפול במוגרים מעל גיל 18 ומתחת

גיל 75.

### 1. למה מיועדת הטורפה?

ריפאליד מיועד לטיפול בסוכרת מסוג 2 במוגרים,

כתופת לדיאטה ופעולות גופניות: מתחילה בטיפול

בדרך כל כאשר הסוכר משלך מושך או פעילים

גופנית בפניהם עצם אינם מażנים או מורדים את רמת

הסוכר בدمך.

ניתן לשלב טיפול בריפאליד עם מטפורמין - תרופה

ונססת לטיפול בסוכרת.

ריפאליד היא תרופה לטיפול בסוכרת מסוג 2 במתן

סמי, ומכליה ריפאליד רשע מסיע לבלב לייצר יותר

איןסולין וכן מוריד את רמת הסוכר (גלוקוז) בדם.

**סוכרת מסוג 2** הינה מחלת אשר בה הבלבול אינו

מפרש מופיע אינסולין כדי לווסת את רמת הסוכר

בדם או כאשר הגוף אינו מגיב באופן תקין לאינסולין

שהוא מייצר.

ריפאליד ההתקאהיעילות מוגנה סיבוכים מהטוכרת של.

אשר מסיעת למונע סיבוכים מהטוכרת של.

**קבוצה מרופיטית:** תרופה לטיפול בסוכרת משפחת

המגליטניידים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### א) אין להשתמש בריפאליד אם:

• אתה **רואה** (ולג') מוגעויות בפצעים או כל

אחד מהMORECOMIBIM הנוטפים אשר מכילה הטורפה

(ראה סעיף 6 לעילן זה).

• **הטוכרת שלך הינה סוכרת מסוג 1** (טוכרת התלויה

באינסולין).

• אתה סובל מעלה ברמות חומצה בדם (חמצת

טוכרתית - קטואצידות).

• אתה סובל **מחלת CBD** (חומרה).

• אתה מטפל **בגמfibozil** (חומרה להורדת רמת

השומונים בדם).

**azimuth מינוחות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

• אם אתה תובל מוגעויות בפצעים או כל

במחלות בחולים עם מחלת CBD מתונה. אין להשתמש

בריפאליד מכירה של מחלת CBD חריפה.

• אם אתה סובל **מבעיות בתפקוד הכליליות**. יש ליטול

ריפאליד בהיותך.

• אם אתה עומד לעבר **ניתוח רציני** או אם סבלת

לאחרונה **ממחלה קשה או מזיהום**. במקרים אלו

עלול האיזון הטוכרטי להיות מופר.

**3. אם אתה חווה 'היפו' (רמת סוכר נמוכה בדם):**

יתכן שתחוויה 'היפו' (קיצוץ של היפוגליקמיה: רמת סוכר

נמוכה בדם) שועל להתרחש במרקם הבאים:

• אם אתה יותר מידי רופא או רופאליד.

• אם אתה סובל **זבצע פיעולות גופית יתר** מהרגל.

• אם אתה **תובל מוגעויות פיעולות גופית יתר** מהרגל.

• אם אתה **תובל מוגעויות מוגעויות כבד** בטליל.

• אם אתה **תובל מוגעויות מוגעויות כבד** בטליל.