

החומר הפעיל וכמותו ביחידות מינון: 1% Fusidic Acid (as Hemihydrate)

1 גרם של תרחיף מכיל:

חומר פעיל: 10 mg Fusidic Acid (as Hemihydrate)

חומרים לא פעילים:

Benzalkonium chloride, carbomer, mannitol, disodium edetate, sodium hydroxide, water for injection, תכולה: 3 גרם

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה בקטריוסטטית.

פעילות רפואית: לטיפול במקרים של דלקת לחמית העין (conjunctivitis) הנגרמת על ידי חיידקי סטפילוקוקוס אורוס, סטפילוקוקוס אינרמידיוס בכלבים וחתולים.

התוויות נגד: אין להשתמש באם ידוע על רגישות יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה. אין להשתמש בדלקת עיניים הקשורה לחיידקי פסאודומנס.

תופעות לוואי: לאחר השימוש עלולה להופיע רגישות או תגובה אלרגית לתכשיר. באם מתפתחת רגישות לתכשיר יש להפסיק את השימוש. יש ליידע את הווטרינר המטפל באם נצפו תופעות לוואי נוספות שאינן מצוינות בעלון זה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

הוראות שימוש: השימוש בטיפות פעם או פעמיים ביום בהתאם להוראות הווטרינר המטפל.

1. כדי להקל על מתן התכשיר כדאי להיעזר באדם נוסף שיוכל להחזיק את החיה בזמן הטפטוף לעין. על החיה לשבת בתנוחה יציבה וקבועה. כלבים קטנים או חתולים יש להושיב על כסא או שולחן מתאימים.
2. יש לנקות את הפרשות מסביב העין ומהפינות בעזרת מטלית או צמר גפן טבולים במים חמימים.
3. יש להסיר את המכסה
4. יש להניח יד אחת מתחת לסנטר של החיה, להרים בעדינות את הראש שלה כלפי מעלה, ולאחוז בצורה יציבה. בכלבים ניתן להשתמש בחסם לפה כדי להמנע מנשיכה. בחתולים אם קשה לרסן את החתול ניתן לעטוף במגבת או שמיכה ולהשאיר רק את הראש חשוף, (בקשו מהוטרינר להראות לכם כיצד לבצע זאת נכון)
5. אם לפי הוראות הוטרינר הטיפול הוא בשתי העיניים, יש לטפטף תחילה לעין הבלתי מודלקת.
6. לאחר הסרת הפקק, יש לאחוז את השפופרת בין האצבע המורה לאגודל, להניח את היד על ראש החיה מעל העין ולהעזר בה כדי למשוך את העפעף העליון קלות כלפי מעלה, עד לחשיפה של החלק הלבן של העין (ראה תמונה).



יש לטפטף בזירות 1 טיפה לתוך החלל שנוצר. יש להיזהר ממגע של השפופרת עם העין או סביבת העין. כעת ניתן לשחרר את העפעף.

7. יש לחזור על הפעולה עם העין המודלקת.
8. יש לסגור את השפופרת בפקק לאחר השימוש ולהימנע ממגע של אצבעות בפיית השפופרת.

9. יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש בתכשיר.

10. יש להמשיך ולהשתמש עד לסיום התקופה המומלצת על ידי הוטרנר המטפל. הטיפול המקובל נמשך לפחות 24 שעות לאחר הבראת העין.

אחסון: שמור במקום קריר, מתחת ל 25°C. לאחר פתיחה ראשונה, יש להשתמש בשפופרת למשך חודש אחד

כל תכשיר ווטרנרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרנרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

אזהרות:

יש לנקוט זהירות על מנת להמנע מזיהום התכשיר במהלך השימוש ולמנוע מפיית השפופרת לבוא במגע ישיר עם העין

אם שכחת לטפל בזמן הנכון, יש לטפל בהקדם האפשרי, ולאחר מכן להמשיך בזמני הטיפול הרגילים.

אם לא חל שיפור לאחר 5 ימים מתחילת הטיפול, יש לפנות לוטרנר.

אין להשתמש באותה שפופרת לטיפול בכלבים שונים או חתולים שונים.

יש לשטוף היטב את הידיים לאחר הטיפול בתכשיר

יש לסגור היטב לאחר כל שימוש, שמור מהישג ידם של ילדים.

לאחר סיום הטיפול, אין להשתמש שוב באיסתל אלא אם הוטרנר נתן הנחיה כזו.

לא לבלוע!
ليس للإبتلاع!
NOT TO BE SWALLOWED!
Не глотать!



חייב מרשם רופא וטרנרי לשימוש בעיניים

מספר רישום תרופה: 082.40.92174.00

מיוצר עבור: דכרה מוצרים וטרנריים, אולדום, דנמרק ע"י מעבדות ליאו, דבלין, אירלנד.
בעל הרישום ויבואן: וטמרקט בע"מ דרך החורש 23 פארק תעשייה חמ"ן ת.ד. 960 שוהם