

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

Norvir 100 mg Tablets**נורויר 100 מ"ג טבליות****ritonavir 100mg**

חברת AbbVie Biopharmaceuticals Ltd. מבקשת להודיע כי הعلונים לרופא ולצורך של התכשיר עודכו. שינוי הוסיף מסומן בקוו תחתון, מחיקה מסומנת בקוו אמצעי.

התויה המאושרת לתכשיר:

NORVIR is indicated alone or in combination with other antiretroviral agents for the treatment of patients with HIV-infection when therapy is warranted based on clinical and/or immunological evidence of disease progression.

העלון לצריך עודכן בסעיפים הבאים:**2. לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:**

-
- אתהלקח כימ אחט מבין התרופות הבאות:
....
גרטיניב (תרופה לטיפול בסרטן שד).
....

אם אתה לוקח, או אם לך חת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
....

ישן תרופה שאין ליטול יחד עם נורויר מאחר והן עשוית להגביר או להפחית את השפעתו כאשר הן נלקחות יחדיו. במקרים מסוימים יתכן והרופא יבקש לבצע בדיקות מסוימות, ישנה את המינון או יערוך מעקב קבוע אחר הטיפול בר.

לך עלי' לספר לרופא אם אתה גוטל תרופה כלשהן, כולל כללו שקנית באופן עצמאי או תרופה צמחית, אף חשוב במיוחד לידע לגבי התרופות הבאות:
....

- תרופה לטיפול בסרטן (כגון: אמציציליב...);
....
- תרופה אנטיויראלית לטיפול בווירוס וירוס דלקת CBD כבד כרונית מסוג C (HCV) במבוגרים (כגון: גלקפריביר/פיברנטסיבר וסימפריביר);
....

6. מידע נוסף

-
- שם היצרן וכותבונו: AbbVie Ltd., מידלנד, אונטריו, קנדה.
 - עלה זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2017 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך אוגוסט 2019.

4.3 Contraindications

....

Medicinal Product Class	Medicinal Products within Class	Rationale
Concomitant medicinal product levels increased or decreased		
....		
Anticancer	Neratinib	Increased plasma concentrations of neratinib which may increase the potential for serious and/or life-threatening reactions including hepatotoxicity (see section 4.5).
	Venetoclax	Increased plasma concentrations of venetoclax. Increased risk of tumor lysis syndrome at the dose initiation and during the dose-titration phase (see section 4.5).
....		

....

4.4 Special warnings and precautions for use

....

Renal failure, renal impairment, elevated creatinine, hypophosphataemia and proximal tubulopathy (including Fanconi syndrome) have been reported with the use of tenofovir disoproxil fumarate (DF) in clinical practice (see section 4.8).

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

....

Ritonavir effects on Non-antiretroviral Co-administered Medicinal Products				
Co-administered Medicinal Products	Dose of Co-administered Medicinal Products (mg)	Dose of NORVIR (mg)	Effect on Co-administered Medicinal Products AUC	Effect on Co-administered Medicinal Products C _{max}
....				
Anticancer agents				
....				

<u>Abemaciclib</u>	Serum concentrations may be increased due to CYP3A4 inhibition by ritonavir. Co-administration of abemaciclib and Norvir should be avoided. If this co-administration is judged unavoidable, refer to the abemaciclib prescribing information for dosage adjustment recommendations. Monitor for ADRs related to abemaciclib.
....	
<u>Neratinib</u>	Serum concentrations may be increased due to CYP3A4 inhibition by ritonavir. Concomitant use of neratinib with Norvir is contraindicated due to serious and/or life-threatening potential reactions including hepatotoxicity (see section 4.3).
....	
<u>HCV Direct Acting Antiviral</u>	
<u>Glecaprevir/pibrentasvir</u>	Serum concentrations may be increased due to P-glycoprotein, BCRP and OATP1B inhibition by ritonavir. Concomitant administration of glecaprevir/pibrentasvir and Norvir is not recommended due to an increased risk of ALT elevations associated with increased glecaprevir exposure.

7. MANUFACTURER

AbbVie Ltd., Maidenhead, UK

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG., Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany

העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן נשלחו למאגר התרופות שבמשרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום, AbbVie Biopharmaceuticals Ltd, 4, רחוב החרש, 7909600 – 09.

מג'ר. אלינור אטיאס
רוקחת ממונה
מ.ר. 6712

ברכה,
מג'ר. אלינור אטיאס
רוקחת ממונה