

## סופט-מן ויסקוראב

### תמייסה לעור

חומרים פעילים:

אתאנול 45 גרם/100 מ"ל ופרופאנול 18 גרם/100 מ"ל.

Ethanol 45 g/100 ml and Propanol 18 g/100 ml.

רשימת חומרים בלתי פעילים וארגנינים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעין את העalon עד סוף בטרם השתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות נספוח, פנו אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המיכון בעлон זה. הייעוץ ברוקח אם הנר זקוק לomidן נסיך.

#### 1. מה מיועדת התרופה?

סופט-מן ויסקוראב הינה תמייסה אלכוהולית לחיטוי הידיים לשימוש יומיומי ולפי פעולות יתניות.

קבוגה תרפיטיבית: חומר חיטוי לעור.

בשימוש על עור שאינו פגוע, הסוגה דרך העור מזערית ואי לה השפעה על הגוף.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:  
 • אהה רגש (allergy) לחומרים הפעילים המופיעים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 בעלון).

اذנות:

- ההקשר מיועד לשימוש חיצוני בלבד. המגע מכל מגע עם העיניים ורקמות ריריות.
- של להשתמש רק על עור שאינו פגוע.

דליך. גזות החצתה (flash-poitint) של התמייסה היא 21°C. יש

אפשרות מהבהה או כל מקרה אחר לחצתה.

אפשר לעשן, אסור לבלוע.

אין להידק סגירה או להיחשף לאש כדייבש מוחלט של התכשיר.

אם תחounter בהואר, רוקח, או אחות לפיה המשמש.

תרופות לא-מרשם וטוספי תזונה, ספר על קר לרופא או לרוקח.  
אין לעורב את התכשיר עם תרופות אחרות.

הרין וזבקה

הרין

לא ידוע על השלכות מזיקות לשימוש בסופט-מן ויסקוראב במהלך ההריון.

הנקה

לא ידוע על השלכות מזיקות לשימוש בסופט-מן ויסקוראב במהלך ההריון.

ההנקה.

אם את בהריון או מניקה, אם את חושבת שתאי שוויה להוות בהריון או מתכנתת הריון, הייעוץ ברוקח או ברופא לפיה השימוש בתרופה.

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

לשימוש מקומי:

- פזר 3-5 מ"ל סופט-מן ויסקוראב לא מהול על כפות ידיים יבשות.
- שפשף את הידיים.
- לפחות 30 שניות לפחות לחיטוי ידיים ייגני.
- על העור להישאר לח לפחות 30 או 90 שניות בהתאם בהתקאם לייעוד חיטוי.
- הנח עלור להתייבש.
- אין צורך לשטוף.

ניתן להשתמש בסופט-מן ויסקוראב ללא ניקוי מקדים של הידיים. אם הידיים מוגכלות למראה, יש לניקות אותן עם מים ובון תחילת.

אין לעור על המנה המומלצת.

אם השתמשת בטעות בוחרת סופט-מן ויסקוראב מהמומלץ או אם בלוות היה, צור קשור מיידי עם הרופא או הרוקח.

אין לבלווע. לשימוש חיצוני בלבד.

אם בטעות בעלי מיבור או ילך מן התרופה, הוא עלול לסבול מהרעלת ללוכחול חירוף. כיווית דולדות של התכשיר עלולות להוביל לעיצרת נשימה. איבוד הכרה הכרוך בסיכון לחנק כתוצאה מההתקאה.

• פנה מיד לחדר רפואי של בית חולים לשם טיפול רפואי והבא את אריזות התהודה איתה.

• אין לעודד הקאה בלבד המלצה רפואי.  
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התהווות והמנגה בכל פעם שהן נטול תרופה. הרוכב משקפיים אם הגר זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות נספוח בעונג לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסופט-מן ויסקוראב עלול לגרום לתופעות לוואי. אל תبالغ למקרא רישימת תופעות הלואיה.

יתכן ולא תסביל מכך אחת מהן.