

Pfizer مدرول™ 4 ملخ  
أعراض

يحتوي كل قرص على: ميتيلا بريدينزولون 4 ملخ  
methylprednisolone 4 mg

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. حتى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أستئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

مدرول™ هو عبارة عن دواء جلوكورتيكوسيد-ستيرويد ذو تأثير مضاد للحساسية ومضاد للالتهاب لمعالجة الحالات التحسسية مثل: الروبو، أنواع من الأمراض الجلدية، حالات الإثباتية والتهاب المفاصل.

الفصيلة العلاجية: من الجلوكو-كورتيكوسيدات.

2. قبل إستعمال الدواء إذا:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- ✗ كنت حساساً (الرجبي) أو عانيت من رد فعل آخر في أعقاب تناول المادة الفعالة أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- ✗ رد الفعل التحسسي قد يسبب طفح جلدي أو إحصار، إنفاس الوجه أو الشفتين أو ضيق تنفس.
- ✗ كنت تعاني من تلوث فطري شديد مثل تلوث فطري شديد في رئتيك أو في المرى (الأنوف الذي يصل بين القم والمعدة) أو أدوية مضادة للفيروسات.
- ✗ تلقيت لاحقاً في الآونة الأخيرة أو كنت مقدماً على التلقي بي نوع للقاح.

إذا كنت تعاني من طفح أو من أعراض أخرى للتلوث، يجب إعلام الطبيب في الحال.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل العلاج بـ مدرول™ إحلل للطبيب إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من الحالات التالية. من الجائز أن يقوم الطبيب بмарقة علاجك عن طريق بشكّل أكثـر، يلائم لك المقدار الدوائي أو يصف لك دواء آخر.

- جدري الماء، الحصبة أو عقبولة المنطقة، إذا كنت تعتقد بذلك كنت على اتصال مع شخص يعاني من جدري الماء، الحصبة أو عقبولة المنطقة ولم تمرض في السابق بهذه الأمراض أو إذا كنت غير واثق فيما إذا مرضت بها في السابق.

- ديدان - الدودة الخيطية.

- إكتئاب شديد أو هوس إكتابي (اضطراب ثانائي للقطب)، بما في ذلك، إذا عانيت في الماضي من إكتئاب أثناء تناول أدوية ستيفورينيـدة مثل مدرول™ أو في حال وجود ساقية عائلية الجلوكونوما أو إذا كنت تعاني من كاتاراكت.

- توجيه للطبيب إذا قاسيت من تشوش في الرؤية أو من إضطرابات أخرى في الرؤية.

- تلوث فiroپوسي (مثل: العقيبة) أو تلوث فطري في العين.

- إجتاز مؤخراً إحتشاء في عضلة القلب (نوبة قلبية).

- مشاكل في الأداء الوظيفي للقلب، بما في ذلك فشل قلبي.

- ارتفاع ضغط الدم (ضغط مد مرتفع).

- قصور الغدة الدرقية (thyroid).  
- التهاب البنكرياس (pancreatitis) الذي يسبب المعدة الشديدة، داء الصدفية الشديد أو بعد زعزعة المعاشر للأسنان والمعدة - [الصدفاف].

- مرض في الكبد أو الكلية.

- تصلب الجلد (تصلب النسيج الضام/تصلب متعدد الأجهزة، اضطراب متعذر ذاتي)، لأن التطور لحدوث احتضان خلري يسمى آزمة تصلب الجلد الكلوي قد تزداد.

إن علامات آزمة تصلب الجلد الكلوي تشمل ارتفاع ضغط الدم وإنخفاض في نتاج البول.

- ساركوما على إسم كابوسي (نوع من سرطان الجلد).

- مشاكل في العضلات (آلام أو ضغط) التي حدثت أثناء تناول أدوية ستيفورينيـدة مثل مدرول™ في السابق.

- الوهن العضلي الوبيـل (حالة طيبة تؤدي إلى ضعف وإرهاق العضلات).

- مرض هشاشة العظام (عظام قابلة للنكسر).

- ورم خابيـا الكرومـاتين القاتـة (ورم نادر في نسيج الغدة الكظرية، تؤدي الغدد الكظرية من فوق الكلى).

- خراج في الجلد.

- قرحة معوية أو مشاكل خطيرة أخرى في الجهاز الهضمي أو الأمعاء.

- التهاب الوريد الخثاري - مشاكل في الأوردة ناجمة عن جلطة وریدية (خثرات دموية في الأوردة) التي تؤدي إلى التهاب الوريد phlebitis، حساسية أو انتفاخ في الأوردة.

- السلس إذا كنت تعاني من انتفاخ في الماء.

- مرض كوشينـغ (حالة طيبة تحدث نتيجة فرط هرمون الكورتيزول في الجسم).

- إصابة دماغية في أعقاب صدمة (اصابة).

- ضغط (stress) شأنـ.

3. التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرـاً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة أو إضافات غذائية، إحلل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخـص إذا كنت تستعمل:

• أمفيوجلوكورتيـيد أو سيكـلوفوسـامـيد - لعلاج مرض السرطـان.

• أستيـتـارـاـلامـيد - يستعمل لعلاج الجلوـكونـومـا والصرـع.

• مضادات انتـرـاـكتـاـنـاتـ مثلـ أـسيـنـوـكـوـرـولـ، فـيـنـيـنـدـيـنـوـنـ وـأـرـفـاـنـينـ.

• مـيـنـيـاتـ إـسـتـيلـ كـوـلـينـ إـسـتـارـاـنـ لـعـالـجـ مـرـضـ الـوـهـنـ.

• العـضـلـيـ الـوـبـيـلـ (مـرـضـ ضـلـيـ) مـثـلـ دـيـسـتـيـجـمـيـنـ وـنـيـوـسـتـيـجـمـيـنـ.

• مضـادـاتـ حـيـوـيـةـ مـثـلـ إـيزـوـنـيـازـيدـ، كـلـاـرـيـتـوـرـوسـينـ وـنـرـولـنـدـوـمـيـسـينـ.

• أـدوـيـةـ لـعـالـجـ السـكـرـيـ.

• نـوـبـاتـ (تـشـنجـاتـ) أـوـ إـخـلـاجـاتـ.

• جـلـوكـومـاـ (إـرـفـاقـ ضـغـطـ الدـمـ) أـوـ إـرـفـاقـاتـ.

• مـشـاكـلـ فـيـ الـأـدـاءـ الـوـظـيـفـيـ لـلـقـلـبـ، بـماـ فـيـ ذـلـكـ فـشـلـ قـلـبـيـ.

• إـرـفـاقـ ضـغـطـ الدـمـ (ضـغـطـ دـمـ مـرـتفـعـ).

• قـصـورـ الغـدـةـ الدـرـقـيـةـ (thyroid).

• الـتـهـابـ الـبـنـكـريـاسـ (pancreatitis) الـذـيـ يـسـبـبـ الـمـ.

• الـتـهـابـ الـفـيـضـانـ (Peritonitis) - إـلـهـابـ الغـشاءـ الدـقـيقـ.

• مـرـضـ فـيـ الـكـبـدـ أوـ الـكـلـيـةـ.

• تـصـلـبـ الـجـلـدـ (تصلـبـ النـسـيـجـ الضـامـ) (الـكـسـرـ).

• إـكـتـيـابـ شـدـيدـ إـلـيـ هـذـهـ الـمـرـضـاتـ.

• تـقـلـيـدـ تـشـنجـاتـ (تشـنجـاتـ) إـل