

gsk

**כרטיס מידע בטיחותי  
למטופלים בווליברים**

ווליברים 5 מ"ג (Ambrisentan)

**טבליות מצופות**

ווליברים 10 מ"ג (Ambrisentan)

**טבליות מצופות**

↳ על פי מחקרים בבעלי חיים, נמצא כי

וליברים עלול לגרום למומים בעקבות:

אם הין איש:

ו שולדא יתבצעה בדיקת הרוון.

שליליות טרם תחילת הטיפול.

**אל תיטל ווליברים אם הין בהרוון**

וחודש לآخر סיום הטיפול.

• **עליך להשתמש באכזעיה מניעה מהמין,** בdamn שאפת נוטלה ווליברים.

• **אכזעים מהחומר למינית הרוון**

כללים: אכזעיה מנעה אחד או שניים

עלילות גבוהה (כגון: התתקן תורף רחמי).

VolPC/2020/26441

**بطاقة معلومات حول الأمان  
للمعالجين بـ فوليريس**

**فوليريس 5 ملغ (Ambrisentan)**

**أقراص مطلية**

**فوليريس 10 ملغ (Ambrisentan)**

**أقراص مطلية**

← وفق الأبحاث التي أجريت على الحيوانات،

وُجد أن فوليريس قد يسبب تشوهات لدى

الجنين.

إذا كنت إمرأة:

يجب التأكيد من كون نتائجة فحص الحمل

سلبية قبل بدء العلاج.

لا تناولي فوليريس إذا كنت في فترة الحمل

أو تخططيه لحصول حمل، وكذلك لمدة شهر

بعد إنتهاء العلاج.

• يتوجب عليك إستعمال وسيلة

موثوقة لمنع الحمل، خلال فترة

استعمالك لـ فوليريس.

وسائل موثوقة لمنع الحمل تشمل: وسيلة

منع حمل واحدة ذات نجاعة عالية (مثل:

**VOLIBRIS PATIENT SAFETY INFORMATION CARD**

**Volibris 5 mg (Ambrisentan) Film-coated Tablets**

**Volibris 10 mg (Ambrisentan) Film-coated Tablets**

→ Animal studies have shown that Volibris may cause fetal defects.

If you are a woman:

◦ Ensure a negative pregnancy test before starting treatment.

**Do not take Volibris if you are pregnant or planning to become pregnant and for one month after completing treatment.**

• **Use a reliable form of birth control (contraception) while taking Volibris.**

• Reliable contraceptive methods include: one highly effective contraceptive method (such as: an intrauterine device (IUD) or tubal sterilization), a combination of two contraceptive methods

(such as a hormonal contraceptive method and a barrier contraceptive method or two barrier contraceptive methods). For further details, consult with the attending physician.

- Take a pregnancy test every month while taking the medicine, and also, one month after completing the treatment.
- Ensure a negative result at each pregnancy test.
- If you do not get your period or if you think you might be pregnant, **report to the physician immediately.**

→ Volibris may cause liver injury. It is very important to routinely undergo blood tests to confirm that there is no liver injury.

For further information, read the patient leaflet. For any question, please refer to your attending physician.

لوبل داخل הרחם או ריבט הבוכין),مشاركة طריפתין למניעת الحمل (مثل וסيلة למניעתحمل עازلة או וסילתין לנתנן עازלון למניעת الحمل), לתגביריضافי يجبإستשרהالطبيب المعالج.

• يجب إجراء فحص حمل شهرياً خلال فترة تناول الدواء وكذلك بعد شهر من إنتهاء العلاج.

• يجب التأكيد من كون النتيجة سلبية في كل فحص حمل.

• إذا لم تتنقلي الدورة الشهرية أو إذا كنت تعنقيين بأنه من الجائز أنك حامل، يجب إبلاغ الطبيب بشكل فوري.

← قد يسبب فوليريس ضرراً للقلب، من المهم جداً إجراء فحوص الدم بشكل روتيني، وذلك للتأكد من عدم حصول ضرر للقلب.

معلومات إضافية يجب قراءة نشرة المستهلك، بخصوص أي سؤال الرجاء توجيه طبيبك المعالج.

ואו קשורות החזוצחות), שלוב שיש ת害羞יות למניעת הרוון (כגון: אכזעיה מנעה הורומונלי ואכזעיה מניעת חוץ) לפירוט נורף יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

• יש לבצע בדיקת הרוון מדי חודש במהלך הטיפול והרופה יזכיר לך לאחר סיום הטיפול.

• יש לוודא תוצאות השילות בבדיקה הרוון.

• אם את לא מקבלת מחזר או אם את

חוותת شيئاך שניבור בהרוון, יש

**לחזור לרופא באופן מייד.**

← ווליברים עלול לגרום לפגיעה בכבד. חשוב מחד לבצע בדיקות דם באומן שרטות, ומנגד לוודא שאין פגיעה בכבד.

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכך. בכל שאלה أنا פנה לרופא המטפל שלך.

VolPC/2020/26441