

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה, צורתה וחוזקה

Canidryl 20mg Tablets for Dogs Veterinary	קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי
Canidryl 50mg Tablets for Dogs Veterinary	קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי
Canidryl 100mg Tablets for Dogs Veterinary	קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי

2. חומר פעיל

כל טבליה לשימוש פומי בטעם בשר צלוי מכילה:

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 20 mg

קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 50 mg

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 100 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לכלבים, להפחתת דלקת וכאב הנגרמים כתוצאה מבעיות שריר-שלד וכתוצאה ממחלת מפרקים ניוונית (Degenerative Joint Disease).

טיפול בכאב אחרי ניתוח כהמשך לשיכוך כאבים שניתן בהזרקה.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקות שאינם סטרואידלים (NSAIDs)

4. התוויות נגד

אין לתת את התרופה במקרה של רגישות יתר למרכיב הפעיל או לאחד מהחומרים הלא פעילים.

אין לתת את התרופה לחתולים.

אין לתת את התרופה לכלבים עם מחלות לב, כבד או כליות כאשר קיימת אפשרות להופעת דימומים או כיבים במערכת העיכול, או אם קיימת עדות ללקות בהרכב הדם.

אין לתת את התרופה לגורים מתחת לגיל 4 חודשים.

5. תופעות לוואי:

תופעות בלתי רצויות הקשורות ל-NSAIDs, כמו הקאות, צואה רכה/שלשול, דם סמוי בצואה, אובדן תאבון ותשישות דווחו. תופעות לוואי אלו מופיעות בדרך כלל בשבוע הראשון לטיפול וברוב המקרים חולפות ונעלמות עם הפסקת הטיפול. אולם במקרים נדירים מאוד הן עלולות להיות חמורות או קטלניות.

כמו בתרופות אחרות מקבוצת ה-NSAIDs קיים סיכון להתפתחות של תופעות לוואי נדירות של הכליות או אידיויסינקרטיות של הכבד.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: [/https:// sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה כלבים

7. מינון ואופן המתן

מינון מומלץ:

2 עד 4 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום.

מינון התחלתי של 4 מ"ג קרפרופן לק"ג ליום, פעם ביום או מחולק לשתי מנות שוות.

בהתאם לתגובה הקלינית, ניתן להקטין את המינון לאחר 7 ימים ל-2 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום כמנה בודדת.

קנידריל 20,50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחצות את הטבליות לחצאים.

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחלק את הטבליות לרבעים או לחצאים.

8. אופן השימוש בתכשיר

משך מתן התרופה תלוי בתגובה לטיפול.

למתן דרך הפה בלבד.

אין לעבור את המינון המומלץ.

9. זמן המתנה

לא רלוונטי

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחייית המטרה

מתן התרופה לכלבים מבוגרים עשוי להיות כרוך בסיכונים נוספים. אם לא ניתן להימנע משימוש בתרופה, ייתכן שכלבים אלו יזדקקו למינון נמוך יותר ומעקב רפואי קפדני.

יש להימנע מלתת את התרופה לכלבים הסובלים מהתייבשות, היפוולמיה או לחץ דם נמוך מכיוון שקיים סיכון אפשרי של רעילות מוגברת לכליות.

תרופות מקבוצת ה-NSAIDs עשויות לגרום לעיכוב של פאגוציטוזה. לכן לצורך טיפול במצבים דלקתיים הקשורים לזיהום חיידקי יש להוסיף גם טיפול אנטיביוטיקטי מתאים.

הטבליות הליעיסות מכילות חומרי טעם. על מנת להימנע מנטילת התרופה בשוגג על ידי בעל החיים, יש לשמור את הטבליות הרחק מטווח השגה של בעלי חיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

במקרה של בליעת טבלייה בשוגג ע"י אדם, יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי ולהראות לרופא את עלון התרופה. יש לרחוץ ידיים אחרי מגע עם התרופה.

היריון והנקה של בעל החיים המטופל

אין לתת את התרופה לכלבות הרות או מניקות.

תגובות עם תרופות אחרות:

קרפרופן נקשרת בחוזקה לחלבוני הפלסמה ומתחרה עם תרופות אחרות הנקשרות גם הן בחוזקה לחלבוני הפלסמה, שיכולות להגביר את האפקט הרעיל בהתאמה. אין להשתמש בקנידרייל יחד עם או במרווח של פחות מ-24 שעות מתרופות אחרות מקבוצת NSAIDs. אין להשתמש בקנידרייל יחד עם גלוקוקורטיקואידים.

יש להימנע ממתן יחד עם תרופות נוספות שיש להן פוטנציאל נפרוטוקסי (רעילות לכליות).

אין לתת קנידרייל יחד עם נוגדי קרישה.

מינון יתר

לא נצפו סימני רעילות כאשר כלבים קיבלו תרופה זו במינון של עד 6 מ"ג/ק"ג פעמיים ביום למשך 8 ימים (פי 3 מהמינון המרבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום) ו-6 מ"ג/ק"ג פעם ביום למשך 7 ימים נוספים (פי 1.5 מהמינון המרבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום).

לא קיימת תרופת נגד לטיפול במינון יתר של קרפרופן. יש לתת טיפול תומך כללי, כמו במקרים של מינון יתר של NSAIDs.

תופעות לוואי חמורות עלולות להתרחש בנטילת כמויות גדולות. אם אתה חושד שכלבך צרך כמות טבליית מעבר למינון המומלץ, צור קשר עם הווטרינר.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי התווית והקרטון לאחר (exp. Date). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 25°C.
- יש לשמור במקום יבש בתוך האריזה המקורית.
- יש להגן מאור.
- קנידרייל 100 מ"ג טבליית לכלבים וטרינרי: יש להחזיר טבליית מחולקות לבליסטר ולהשתמש בהן בתוך 72 שעות.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, grilled meat flavor.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קנידרייל 20,50 מ"ג טבליית לכלבים וטרינרי: טבלייה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם קצוות משופעים, עם סימון של קו חצייה בצד אחד.
קנידרייל 100 מ"ג טבליית לכלבים וטרינרי: טבלייה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם סימון קו חצייה בצורת צלב בצד אחד

כל אריזה מכילה 100 טבליות במגשיות (בליסטרים).

בעל הרישום ויבואן:

אי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הכדר 18, נתניה.

שם היצרן:

CHANELLE Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co, Galway, IRELAND

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו במרץ 2018.

מס' רישום התרופה התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

קנידריל 20 מ"ג: 160-20-35099

קנידריל 50 מ"ג: 33967-50-153

קנידריל 100 מ"ג: 33972-51-153

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, ההנחיות מיועדות לבני שני המינים.