

إيكسفورج 5 ملخ/80 ملخ أقراص مطالية

التركيب:
يحتوي كل قرص مطلي على:

Amlodipine (as besylate) 5 mg
Valsartan 80 mg
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 5 ملخ
فالسارتان 80 ملخ

إيكسفورج 5 ملخ/160 ملخ أقراص مطالية

التركيب:
يحتوي كل قرص مطلي على:

Amlodipine (as besylate) 5 mg
Valsartan 160 mg
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 5 ملخ
فالسارتان 160 ملخ

إيكسفورج 10 ملخ/160 ملخ أقراص مطالية

التركيب:
يحتوي كل قرص مطلي على:

Amlodipine (as besylate) 10 mg
Valsartan 160 mg
أملوديبين (على شكل بيسيلات) 10 ملخ
فالسارتان 160 ملخ

المواد غير الفعالة: أظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».
اقرء النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

- تحتوي أقراص إيكسفورج على مركبين يسميان أملوديبين و فالسارتان. هاتين المادتين مخصوصتان لمعالجة إرتفاع ضغط الدم، حيث أن العلاج بكل مركب لوحده لا يعطي نتائج كافية.
- يتنمي أملوديبين إلى فصيلة المواد المسممة " حاجيات قنوات الكالسيوم ". يوقف أملوديبين من دخول الكالسيوم إلى جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع تضيق الأوعية الدموية.
- يتنمي فالسارتان إلى فصيلة المواد المسممة " مضادات المستقبل أنجيوتونسين II ". نحوتنين II هو عبارة عن مادة تنتجه الكلى وهي تسبب تضيق الأوعية الدموية وبذلك تؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم. يعمل فالسارتان على حجب تأثير أنجيوتونسين II.
- تساعد كلتا المادتين على منع تضيق الأوعية الدموية. نتيجة لذلك، يحدث إرتفاع للأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم.
- يسعمل إيكسفورج في علاج إرتفاع ضغط الدم لدى الكبار الذين إرتفاع ضغط الدم لديهم غير مسيطر عليه بشكل كافي بواسطة أملوديبين أو فالسارتان كل على حدة.

الفضيلة العلاجية:

- أملوديبين - من حاجيات قنوات الكالسيوم.
فالسارتان - من مضادات المستقبل أنجيوتونسين II.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) لـ أملوديبين أو لكل واحد من حاجيات قنوات الكالسيوم الأخرى. من شأن ذلك أن يتجلّى بحكة، إحمرار الجلد أو صعوبات في التنفس.
- كنت حساساً (اليرجي) لـ فالسارتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6). إذا كنت تعتقد بأنه من شأنك أن تكون حساساً، راجع الطبيب قبل تناول إيكسفورج.
- لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو مشاكل في الطرق الصفراوية مثل تتشع الصفراء أو إنسداد في جريان الصفراء داخل الكبد.
- كنت في فترة الحمل ما بعد الشهر الثالث (يفضل الإمتناع عن إيكسفورج في بداية الحمل أيضاً، أنتظري فقرة "الحمل والإرضاع").
- لديك ضغط دم منخفض بشكل خطير.
- لديك تضيق في صمام الشريان الأبهري (aortic stenosis) أو صدمة قلبية (الصدمة القلبية) - حالة يكون فيها قلبك غير قادر على تزويد ما يكفي من الدم للجسم).
- كنت تعاني من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.
- لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي و كنت تعالج بدواء لتخفيف ضغط الدم الحاوي على أليسكيدرين.
- إذا إنطبق عليك أي واحد من تلك البنود، بلغ طبيبك من دون أن تتناول إيكسفورج.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- قبل العلاج بـ إيكسفورج، إحك للطبيب إذا:
- كنت مريضاً (قيءات أو إسهال).
- لديك مشاكل في الكبد أو في الكلي.

- الخلاصة النباتية للتهدئة - هيبيريكوم بيرفوراتوم (St. John's wort):
- نيتروجليسيرين ومركبات النيتريات الأخرى، أو الأدوية الأخرى التي تنتهي إلى فصيلة موسعات الأوعية الدموية (vasodilators):
- أدوية لمعالجة البذ (HIV/AIDS) (مثل ريتونافير، إيندينافير، تلفينافير):
- الأدوية المستعملة لمعالجة التلوثات الفطرية (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول):
- الأدوية المستعملة لمعالجة التلوثات الجرثومية (مثل ريفامپيسين، إريثروميسين، كلاراترو咪سين، تيليتروميسين):
- ثيراباميل، بيلاتازيم (أدوية للقلب):
- سيمانتاتين (دواء يستعمل لتخفيض نسبة الكوليسترول):
- دانترولين (ستربير لدرجات حرارة الجسم الشديدة):
- الأدوية المستعملة للحماية من رفع نسخة مزروعة (سيكلوسوبورين):

إستعمال الدواء والطعام:

لا يجوز إستهلاك الچريپ فروت وعصير الچريپ فروت أثناء إستعمال إيكسفورج، سبب ذلك لأن الچريپ فروت وعصير الچريپ فروت قد يرفعان من نسبة المادة الفعالة أملوديبين في الدم، الأمر الذي قد يزيد من التأثير الخافض لضغط الدم بشكل غير متوقع. بالإمكان تناول إيكسفورج مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

عليك بإبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حاملاً، يوصي طبيبك بأمان حاملة بالتوافق عن تناول إيكسفورج قبل أن تصبحي حاملاً، وبعد إكتشافك بأنك حامل ويوصي بك باستعمال دواء آخر عوضاً عن إيكسفورج. لا يوصي بإستعمال إيكسفورج في بداية الحمل (في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل) ولا يجوز إستعماله إذا كنت بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً شديداً للجنين في حال إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

بلغ طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين بالبدء في الإرضاع، تنتقل كميات ضئيلة من أملوديبين في حليب الأم. لا يوصي بإستعمال إيكسفورج أثناء الإرضاع ومن الجائز أن يوصي طبيبك على علاج آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع، خاصة إذا كان الرضيع حديث الولادة أو ولد قبل الأوان.

عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء.

السيادة واستعمال الماكنتات:

هذا الدواء قد يسبب الدوار وقد يؤثر على قدرة تركيزك. لذلك، إذا كنت لا تعرف كيف سيؤثر الدواء عليك، لا تقم بالسيادة، لا تستعمل الماكنتات ولا تقم بإجراء النشاطات الأخرى التي تتطلب التركيز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالقدر الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. هذا الأمر يساعدك في الحصول على النتائج المثلث وتقليل خطورة حدوث أعراض جانبية. المقدير الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدير الدوائي

- اجتز زراعة كلية أو شخص لديك بذلك تعاني من تضيق في شرايين الكلية.
- لديك مشكلة تؤثر على وظيفة الغدة الكظرية المسماة فرط الأaldoستيرونونية الأولى (primary hyperaldosteronism).
- لديك قصور في القلب أو إجترت في القلب أو تعلمت الطبيب بحرص بما يتعلق بالجرعة الدوائية البدائية. من شأن الطبيب أن يشخص أيضاً الأداء الوظيفي لكليتيك.
- أبلغ طبيبك بذلك تعاني من تضيق في صمامات القلب (aortic or mitral stenosis)، أو من إعتلال عضلة القلب التضخمي (hypertrophic cardiomyopathy).
- حصل لديك ذات مرة إنتفاخ، خاصة في الوجه والحنجرة أثناء تناول أدوية أخرى (بما في ذلك مثبطات ACE)، إذا إنطبق عليك تلك الأعراض، توقف عن تناول إيكسفورج وراجع طبيبك حالاً. في هذه الحالة، لا يجوز أبداً معاودة تناول إيكسفورج.
- كنت تتناول واحداً من الأدوية المستعملة لمعالجة إرتفاع ضغط الدم: مثبطات ACE (مثل: إيتاپيريل، لزيتوبيريل، رامبيريل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات الصلة بالسكري.
- أليسكيرين.

الأطفال والمهاترون:

- لا يوصي بإستعمال إيكسفورج لدى الأطفال والمهاترون ما دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن يقوم طبيبك بفحص الأداء الوظيفي لكليتيك، ضغط الدم، وكمية الشوارد الكهربائية في الدم (اليوتياسيمون مثلاً) بشكل دوري. أنظر معلومات إضافية في فقرة " لا يجوز إستعمال الدواء ". إذا إنطبق عليك واحداً من البنود، بلغ الطبيب قبل تناول إيكسفورج.

الاتصالات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

من الجائز أن يضطر طبيبك إلى تغيير المقدار الدوائية أو اتخاذ وسائل حذر أخرى، في حالات معينة من الجائز أن تخضط إلى التوقف عن تناول واحداً من الأدوية.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تستعمل أدوية من المجموعات التالية:

- مثبطات ACE أو أليسكيرين (أنظر المعلومات في فقرات " لا يجوز إستعمال الدواء "، و " تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء "):
- المدرات البولية (نوع من دواء يزيد من التبول):
- ليبيوم، دواء يستعمل لمعالجة أنواع معينة من الإكتان؛
- المدرات البولية الحافظة للبوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح البوتاسيوم؛
- أنواع معينة من مسكنات الآلام المسماة مضادات لإلتهاب اللاستروئيدية (NSAIDs) أو مثبطات سيكوكوكسيجيتاز - 2 (Inhibitors Cox-2):
- أدوية لمعالجة الإلتصالات (مثل كاربامازيبين، فينوباريتال، فينوتوكين، فوسفينوتوكين، بريميردين):

الإعْيادي

عادة هو قرص واحد في اليوم:
يُفضل تناول الدواء بنفس الساعة من كل يوم.

- يجب تناول الأقراص مع كأس من الماء.
- بالإمكان تناول إيكسفورج مع أو بدون طعام، لا يجوز تناول إيكسفورج مع الجريب فروت أو مع عصير الجريب فروت.

- لا توجّد معلومات حول سحق / شطّر أو مضخ الأقراص.
من شأن الطبيب أن يقترح مقداراً دوائياً أكبر أو أصغر، وذلك بحسب إستجابتك للعلاج.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إيكسفورج لدى المسنين (من عمر 65 سنة وما فوق)
يقوم طبيبك بالتصرّف بحدّ أثنيه رفع المقدار الدوائي، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا دفع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطوارئ أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة دوائية حال تذكر، بعد ذلك، يجب تناول الجرعة الدوائية القادمة في الوقت الإعْيادي، لكن، إذا حان تقرير موعد تناول الجرعة الدوائية القادمة، لا يجوز تناول الجرعة الدوائية المنسية.

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.
تناول الجرعة الدوائية القادمة في الوقت الإعْيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توقيتات الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

في حال توقفك عن تناول الدواء إن التوقف عن العلاج بإيكسفورج قد يؤدي لتفاقم مرضك. لا تتوقف عن تناول الدواء إلا بتعليمات الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توقّرت لديك أستئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الصيدلي أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيكسفورج قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh في قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

هناك أعراض جانبية خطيرة تتطلب علاجاً طبياً فوريًا:

لقد عانى قليل من المرضى من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية (ظهور لدى حتى 7 من بين 1,000 مستعمل):
في حال حدوث أي من الأعراض التالية، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب:
رد فعل حساسية مع أعراض مثل طفح حكة، إنفصال الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبات في التنفس، ضغط دم منخفض (الشعور بإغماء، الشعور بدوخة).

تحقيق انتصاف للقضيب التناسلي، إنزعاج أو تضخم الثديين لدى الرجال، ألم، الشعور بوعكة، ألم في العضلات، تقلصات عضلية، زيادة أو تناقص الوزن.
أعراض جانبية نادرة (ظهور لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): إرتباك، اضطرابات الأذن، راحتي اليدين، الرجلين، الكالحين أو راحتي القدمين: إرهاق؛ ضعف العضلات، إنفصال الأذن، إنزعاج أثناء اليوسق، صداع؛ إنفصال العضلات، تناقص عدد خلايا الدم البيضاء، تناقص عدد الصفائح الدموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث كدمات شديدة أو نزف (تضخم كريات الدم الحمراء)، زيادة السكر في الدم (فطري سكر الدم)، إنفصال اللثة، إنفصال بطيني (التهاب المعدة)، أداء وظيفي كيدي شاذ، التهاب الكبد، إصفرار الجلد (بركان)، إنفاق إنزيمات الكبد، الأمر الذي قد يؤثر على بعض الخصوصات الطبيعية، زيادة توتر العضلات، التهاب في الأوعية المومية الذي يتراافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للضوء، إضطرابات تتضمن تصلب، رجفان، وأو صعوبات في الحركة.

أعراض جانبية ذات شعور غير معروف (لا يمكن تقدير الوترية من المعطيات المتوفّرة): تناقص كريات الدم الحمراء، سخونة، ألم في الح猩زة أو ترقّحات في الفم ناتجة عن التلوثات؛ نزف أو كدمات عميقة؛ إنفصال فحوص الكبد؛ تناقص في الأداء الوظيفي الكلوي أو تناقص شديد في الأداء الوظيفي الكلوي؛ إنفصال خاصة في الوجه والحنجرة؛ ألم عضلي: طفح، بقع بنفسجية - حمراء، سخونة، حكة؛ ردود فعل تحسّسية: حويصلات في الجلد (متلازمة حالمة تسمى Dermatitis bullous).

إذا كنت تشعر بذلك الأعراض، توجه إلى طبيبك حالاً!

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاوتت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب لعاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى المنوّج المباشر للتبلّغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء:

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبّب التسمم بدون تعلمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp.date) (الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر).
- لا يجوز تخزين بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز الإستعمال إذا كانت العلبة متضررة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضًا:
إيكسفورج 10 ملخ/160 ملخ:
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
إيكسفورج 5 ملخ/80 ملخ:
إيكسفورج 138 40 31566
إيكسفورج 138 41 31567
إيكسفورج 138 42 31568
Microcrystalline cellulose

أعراض جانبية أخرى التي من الجائز أن تحدث عند إستعمال إيكسفورج:
أعراض جانبية شائعة (ظهور لدى حتى 7 من بين 10,000 مستعمل):
إنفلونزا؛ انسداد الأنف، ألم في الح猩زة وإنزعاج أثناء اليوسق، صداع؛ إنفصال العضلات، إنفصال بطيني (تضخم كريات الدم الحمراء)، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث كدمات شديدة أو نزف (تضخم كريات الدم الحمراء)، زيادة السكر في الدم (فطري سكر الدم)، إنفصال اللثة، إنفصال بطيني (تضخم كريات الدم الحمراء)، حكة، زياة دوار عن الدوام: غثيان وألم في البطن؛ حفاف الغمام؛ تسرع نظم القلب بما في ذلك خفقان القلب؛ الدوار عند الوقوف؛ سعال؛ إسهال؛ طفح جلدي؛ إحمرار الجلد؛ إنفصال في المفاصل، ألم في الظهر؛ ألم في المفاصل.

أعراض جانبية نادرة (ظهور لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):
قلق، تعب، تعب في الأذنين؛ غمام؛ التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بزيادة الإلحاد على التبول؛ عدم القدرة على تحقيق انتصاف القضيب النسائي؛ الشعور بتقلّص ضغط الدم مع أعراض مثل دوار، الشعور بدوخة خطيرة؛ تعرق زائد؛ طفح جلدي بكامل الجسم؛ حكة؛ تقلصات عضلية.

الأعراض الجانبية التي بلغ عنها أثناء إستعمال أمولديبين أو فالسارتان المستعملان بشكل متفرق والتي لم تظهر عند إستعمال إيكسفورج أو ظهرت بوتيرة أكبر مما هو عليه مع إيكسفورج:
أمولدبيبن

الرادرة جداً والخطيرة التالية بعد تناول الدواء: إرجاع مفاجئ أثناء التنفس، ألم في الصدر، ضيق تنفس أو صعوبات في التنفس.

- إنفصال اللسان والحنجرة التي تسبّب صعوبة كبيرة في التنفس.
- أعراض جلدية خطيرة تشمل طفح جلدي شديد، شرى، إحمرار الجلد بكامل الجسم، حكة شديدة، حويصلات، نقشر، وإنفصال الجلد، التهاب في النسيج المخاطي (Steven-Johnson Syndrome)؛ نخر البشرة (السمى)، أو ردود فعل تحسّسية أخرى.

- إنحساء ضلالة القلب، نظم قلب غير منتظمه.
- التهاب البنكرياس الذي قد يسبّب ألم في البطن والظهر التي تترافق بشعور عام غير جيد.

بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية، إذا سبّبت لك الأعراض التالية مشاكل أو إذا استمررت لأكثر من أسبوع، راجع طبيبك:
أعراض جانبية شائعة (ظهور لدى حتى 7 من بين 10,000 مستعمل):
نعايس، خفقان القلب (الإحساس بضربات القلب)، تورّد، إنفصال الكالحين (وذمة)، ألم في البطن، غثيان.

أعراض جانبية غير شائعة (ظهور لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):
تغيرات في الحالة النفسية، قلق، اكتئاب، أرق، رجفة، تغيرات في حالة المذاق، إغماء، فقدان الإحساس بالألم، إضطرابات في الرؤية، خلل في الرؤية، تشنّب في الأذنين، إنفصال الأذن، إنفصال بطيني (تضخم كريات الدم)، عطاس، رشح في الأنف التي تترجم عن التهاب في نسج الأنف (التهاب الأنف)، مشاكل في الهضم، تقيّبات (وذمة)، فقدان الشعور، تعرق زائد، حكة في الجلد، تغير لون الجلد، إنفصال العضلات، زيادة الحاجة للتبول في الليل، زيادة وتيرة التبول، عدم القدرة على

Crospovidone
Magnesium stearate
Silica, colloidal anhydrous
إيكسفورج 5 ملخ/80 ملخ أقراص مطبلية تركيب الطلاء: Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide, yellow (E172)
Macrogol 4000
Talc

إيكسفورج 5 ملخ/160 ملخ أقراص مطبلية تركيب الطلاء: Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide, yellow (E172)
Macrogol 4000
Talc

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
إيكسفورج 5 ملخ/80 ملخ: قرص مطبل يحتوي على "NVR" من جانب واحد وـ "NV" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.
إيكسفورج 5 ملخ/160 ملخ: قرص مطبل يحتوي على "NVR" من جانب واحد وـ "ECE" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.
إيكسفورج 10 ملخ/160 ملخ: قرص مطبل يحتوي على 10 أصفر فاتح ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد وـ "UIC" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.
إيكسفورج 10 ملخ/80 ملخ: قرص مطبل يحتوي على "NVR" من جانب واحد وـ "UIC" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.
إيكسفورج 138 40 31566

إيكسفورج 138 41 31567
إيكسفورج 138 42 31568
Microcrystalline cellulose