

كوسنتيكس ١٥٠ ملг محلول للحقن محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال (قلم-سنسروريدي) للحقن تحت الجلد

المادة الفعالة:

كل قلم كوسنتيكس جاهز للإستعمال (قلم-سنسروريدي) يحتوي ١٥٠ ملغرام (secukinumab).

المواد غير الفعالة وموارد الحساسية:

أنتظراً هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تتحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك.

لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

كوسنتيكس مخصص لمعالجة الأمراض الإلتهابية التالية:

• الصدف اللوبي (psoriasis)

كوسنتيكس مخصص لمعالجة الصدف اللوبي المتوسط حتى الشديد

لدى كبار مرضحين لتلقي علاج جهازي.

• إلتهاب المفاصل الصدافي (psoriatic arthritis)

كوسنتيكس أو علاج مشترك بـ كوسنتيكس مع دواء يسمى

ميتوبروكسات (MTX) مخصوص لعلاج إلتهاب المفاصل

الصدافي النشط لدى كبار وذلك عندما تكون الإستجابة لعلاج سابق بدواء من

نوع DMARD غير كافية.

• إلتهاب الفقار الرئيسي (ankylosing spondylitis)

كوسنتيكس مخصوص لعلاج إلتهاب الفقار الرئيسي النشط لدى كبار عندما

تكون الإستجابة لعلاج عادي (conventional) سابق غير كافية.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطة إنترلوكين (IL) Inhibitors.

المادة الفعالة في كوسنتيكس هي سيكوكينوماب، ضد وحيد النسيلة (monoclonal antibody) الذي يتمتع إلى فصيلة المستحضرات المسماة

مشططات إنترلوكين (IL). يعمل الدواء بواسطة إبطال فاعلية البروتين المسمى

17A، الذي تكون مستوياته مرتفعة في الأمراض مثل الصدفية، إلتهاب المفاصل

الصدافي وإلتهاب الفقار الرئيسي.

الصدف اللوبي

كوسنتيكس هو دواء يستعمل لعلاج الجلد في حالة الصدف اللوبي الذي يسبب إلتهاباً يلحق الضرر بالجلد. يقلل كوسنتيكس من الإلتهاب وأعراض المرض الأخرى. يستعمل كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من الصدف اللوبي المتوسط حتى الشديد.

إن الفائدة التي ستجلبها من إستعمال كوسنتيكس للصدف اللوبي تتمثل في حدوث تحسن الذي يؤدي إلى نظافة الجلد وتقليل الأعراض لديك مثل تشكيل فشرة حكة وألم.

إلتهاب المفاصل الصدافي

كوسنتيكس عبارة عن دواء يستعمل في علاج حالة تسمى «إلتهاب المفاصل الصدافي». التي هي عبارة عن مرض إلتهابي في المفاصل الذي يترافق في أحياناً في البداية على أدوية أخرى. إذا لم تستجب بشكل جيد بما فيه الكفاية لهذه الأدوية، ستحصل على كوسنتيكس لتقليل علامات وأعراض إلتهاب المفاصل الصدافي.

لحضوره ولعظم تلك المفاصل التي تشتغل في المرض.

يستعمل كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب المفاصل الصدافي النشط، ويمكن أن يعطي لوحده أو مع دواء آخر يدعى ميتوروكسات.

إن الفائدة التي ستحل بها من إستعمال كوسنتيكس لإلتهاب المفاصل الصدافي ستكون تقليل علامات وأعراض المرض، إبطاء تضرر الغضروف والعظم في المفاصل، وتحسين قدرتك على أداء النشاطات اليومية الإعتيادية.

إلتهاب الفقار الرئيسي

كوسنتيكس عبارة عن دواء لعلاج حالة إلتهاب المفاصل الذي يعبر مرض إلتهابي حيث يؤثر بشكل أساسى على العمود الفقري لأنه يؤدى إلى إلتهاب في مفاصل العمود الفقري. إذا وجّد لديك إلتهاب الفقار الرئيسي ستحصل أولاً على أدوية أخرى إذا لم تستجب بشكل جيد بما فيه الكفاية لهذه الأدوية، ستحصل من المهم لا تحاول إجراء الحقن الذاتي إلى أن يتم إرشادك من قبل طبيبك.

الممرضة، أو الصيدلي. أيضاً بإمكان المعالج أن يحقن لك كوسنتيكس بعد تلقيه الإرشاد الملائم.

للحصول على تعليمات مفصلة بشأن حقن كوسنتيكس، ضمن قلم جاهز للإستعمال، إستعمال كوسنتيكس ١٥٠ ملغرام محلول للحقن، ضمن قلم جاهز للإستعمال كوسنتيكس قلم - سنسروريدي» في نهاية هذه النشرة.

مدة العلاج

يقرر الطبيب لأى كمية من كوسنتيكس تحتاج وما هي مدة العلاج.

الصدف اللوبي

يستخدم كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب الفقار الرئيسي النشط.

إن الفائدة التي ستحل بها من إستعمال كوسنتيكس لإلتهاب الفقار الرئيسي ستكون

تقليل علامات وأعراض المرض لديك وتحسين الأداء الوظيفي البدنى.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا جواز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (اليرجي) لـ سيكوكينوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية

في كوسنتيكس (الظاهرة في الفقرة ٦). إذا كنت تعتقد بذلك قد تكون حساساً (اليرجي). راجع الطبيب للإستشارة قبل إستعمال كوسنتيكس.

• وجّد لديك ثلث تنشط الذي يعتقد طبيبك بأنه ذو أهمية.

تحذيرات خاصة تتعلق بـ إستعمال الدواء إذا كانت إحدى الحالات التالية تخصك:

• إذا وجّد لديك الآن تلوث.

• إذا كنت تعاني من تلوثات مستمرة أو متكررة.

• إذا وجّد لديك مرض السل.

• إذا حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لللاتكس.

• إذا وجّد لديك مرض كرون.

• إذا وجّد لديك التهاب القولون التقرحي.

• إذا تلقيت لقاحاً في الفترة الأخيرة أو إذا كان من المفترض أن تلقي لقاحاً خلال العلاج بـ كوسنتيكس.

• إذا كنت تلقيت علاجاً آخر لعلاج داء الصدفية، مثل مثبط آخر لجهاز المناعة أو علاج بالضوء بواسطة الضوء فوق البنفسجي (UV).

إنتبه للتلوثات وردود الفعل التحسسية

قد يسبب كوسنتيكس أعراض جانبية شديدة، بما في ذلك تلوثات وردود فعل تحسسية.

عليك متابعة علامات تدل على هذه الحالات إذا كنت تعالج بـ كوسنتيكس.

توقف عن العلاج بـ كوسنتيكس وبلغ الطبيب، أو توجه لتقديم مساعدة طبية حالاً

إذا قاسيت من أحدى الأعراض التي تدل على إحتمال حوث ثلث شديد أو رد فعل

تحسيني. قائمة الأعراض مفصلة في بند «أعراض جانبية شديدة» في الفقرة ٤.

الأطفال والمراهقون

كوسنتيكس غير مخصص للأطفال والمراهقين (دون عمر ١٨ سنة) نظراً لأن

المستحضر لم يتم بحثه لدى هذه الفئة من العمر.

التداللات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة

طبية وإضافات غذائية، إحكام طبيب أو للصيدلي عن ذلك، يجب إبلاغ الطبيب

أو الصيدلي بالأخضر.

إذا تلقيت لقاحاً في الفترة الأخيرة أو إذا كنت تخطط لتلقي لقاح. عليك

الامتناع عن تلقي لقاحات من أنواع معينة (لقاحات حية) أثناء فترة إستعمال

كوسنتيكس.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

يفضل الإمتناع عن إستعمال كوسنتيكس خلال فترة الحمل. لا تتوفر معلومات

حول تأثير الدواء لدى النساء الحوامل. إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة، فيوصى

بالامتناع عن الحمل بإستعمال وسائل من حمل ملائمة. وذلك خلال فترة

إستعمال كوسنتيكس، ولمدة ٢٠ أسبوعاً على الأقل بعد المفترض أن تفوت دوره

من كوسنتيكس، بلغى طبيبك إذا كنت في فترة الحمل. إذا كنت تعتقد بأنك

حامل أو تخططين للحمل.

بلغى طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. أنت وطبيبك تقرران

إما الإرضاع أو إستعمال كوسنتيكس. ليس من المفترض أن تقومي بالأمر في

معاً بعد إستعمال كوسنتيكس لا يجوز الإرضاع ٢٠ أسبوعاً على الأقل بعد

المقدار الدوائي الأخير من كوسنتيكس.

السيادة وإستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر كوسنتيكس على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكينات.

متقاربة بـ مرض الصدفية، إذا لم تكن إمرأة في سن الخصوبة، فيوصى

في البداية على أدوية أخرى. إذا لم تستجب بشكل جيد بما فيه الكفاية لهؤلاء

الآدوية، ستحصل على كوسنتيكس لتقليل علامات وأعراض إلتهاب المفاصل

الصادفي النشط. لتحسين الأداء الوظيفي البدنى، وإبطاء الضرر الحاصل

لحضوره ولعظم تلك المفاصل التي تشتغل في المرض.

يستعمل كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب المفاصل الصدافي

النشط ويمكن أن يعطي لوحده أو مع دواء آخر يدعى ميتوروكسات.

إن الفائدة التي ستحل بها من إستعمال كوسنتيكس لإلتهاب المفاصل الصدافي

ستكون تقليل علامات وأعراض المرض، إبطاء تضرر الغضروف والعظم في المفاصل

وتحسين قدرتك على أداء النشاطات اليومية الإعتيادية.

إلتهاب المفاصل الصدافي

كوسنتيكس عبارة عن دواء يستعمل في علاج حالة تسمى «إلتهاب المفاصل

الصادفي». التي هي عبارة عن مرض إلتهابي في المفاصل الذي يترافق في أحياناً

في البداية على أدوية أخرى. إذا لم تستجب بشكل جيد بما فيه الكفاية لهؤلاء

الآدوية، ستحصل على كوسنتيكس لتقليل علامات وأعراض إلتهاب المفاصل

الصادفي النشط. لتحسين الأداء الوظيفي البدنى، وإبطاء الضرر الحاصل

لحضوره ولعظم تلك المفاصل التي تشتغل في المرض.

يستعمل كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب المفاصل الصدافي

النشط ويمكن أن يعطي لوحده أو مع دواء آخر يدعى ميتوروكسات.

إن الفائدة التي ستحل بها من إستعمال كوسنتيكس لإلتهاب المفاصل الصدافي

ستكون تقليل علامات وأعراض المرض، إبطاء تضرر الغضروف والعظم في المفاصل

وتحسين قدرتك على أداء النشاطات اليومية الإعتيادية.

إلتهاب الفقار الرئيسي

كوسنتيكس عبارة عن دواء لعلاج حالة إلتهاب الفقار الرئيسي، الذي يعتبر مرض

إلتهابي يؤثر بشكل أساسى على العمود الفقري لأنه يؤدى إلى إلتهاب في

مفاصل العمود الفقري. إذا وجّد لديك إلتهاب الفقار الرئيسي ستحصل أولاً على

أدوية أخرى إذا لم تستجب بشكل جيد بما فيه الكفاية لهذه الأدوية، ستحصل

على كوسنتيكس لتقليل علامات وأعراض المرض، لتقليل إلتهاب المفاصل وتحسين

الإداء الوظيفي البدنى.

يستخدم كوسنتيكس لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب الفقار الرئيسي النشط.

إن الفائدة التي ستحل بها من إستعمال كوسنتيكس لإلتهاب الفقار الرئيسي ستكون

تقليل علامات وأعراض المرض لديك وتحسين الأداء الوظيفي البدنى.

التهاب المفاصل الصدافي

لدى مرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الذين يعانون أيضاً من الصدف اللوبي بدرجة متوسطة حتى شديدة أو مرضى لم يستجيبوا كما يجب للأدوية المسماة (tumour necrosis factor) TNF blockers (blockers).

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل ١ من بين ١٠ مستعملين)

• فروج البرد (فروج الهريس في منطقة الفم)

• إسهال

• سيلان الأنف (رشح)

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل ١ من بين ١٠ مستعملين)

• كل مقدار دوائي ذو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢، ٣ و ٤

ولاحقاً ستلتقي حقن مرة في الشهر. في كل مرة ستحصل على مقدار دوائي

قدر ٣٠٠ ملغرام الذي يعطى بحقنتين كل منها ١٥٠ ملغرام.

لمرضى إلتهاب المفاصل الصدافي الآخرين

• كل مقدار دوائي هو ٣٠٠ ملغرام يعطى بحقنتين تحت الجلد كل منها ١٥٠ ملغرام

بعد المقدار الدوائي الأول ستلتقي حقن أسبوعية إضافية في الأسبوع ١، ٢،

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى مستعمل ١ من بين ١٠٠ مستعمل)

• تلوث فطري في الفم (تلوث الفم بالمببضات)

• علامات لنسب منخفضة من خلايا الدم البيضاء، مثل سخونة، ألم في الحنجرة أو تقرحات في الفم نتيجة تلوثات (قلة العدلات)

• فطر راحة القدم

• تلوث الأذن الخارجية (التهاب الأذن الخارجية)

• إفراز من العينين يتراافق بحكة، إحمرار وإنفاس (التهاب الملتحمة)

• طفح يترافق بحكة (شرى)

• تلوثات في الطرق التنفسية السفلية

• تقلصات وألم في البطن، إسهال، فقدان الوزن أو دم في البراز (علامات

المشاكل في الأمعاء)

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى مستعمل ١ من بين ١٠٠٠ مستعمل)

• رد فعل تحسسي حاد يتراافق بصدمة إستهدافية

• إحمرار وتنفس الجلد على سطح منطقة واسعة في الجسم، الذي قد يكون حاكاً أو مؤلماً (exfoliative dermatitis)

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروفة (أعراض شبيهها لم يحدد بعد)

• تلوث فطري للجلد والأغشية المخاطية (يشمل داء المببضات نوع من القطر) في المريء

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلغي عن أعراض جانبية

بالإمكان التبلغي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغي عن أعراض جانبية عقب علاج وائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغي عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع. وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسوس بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة أو على ملصقة القلم الجاهز للإستعمال.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• لا يجوز الإستعمال إذا احتوى السائل على جزيئات تبدو بسهولة للعين، إذا كان عكراً أو إذا كان لونهبني يشكل واضح.

ظروف التخزين

يجب تخزين كوسنتيكس في العلبة الأصلية للحماية من الضوء. يجب التخزين في البراد بدرجة حرارة تتراوح ما بين ٤-٨ درجة مئوية. لا يجوز التجميد. لا يجوز الخزن، إذا دعت الحاجة، بالإمكان تخزين كوسنتيكس خارج البراد لفترة واحدة قدرها حتى ٤ أيام بدرجة حرارة الغرفة، لكن بما لا يتجاوز ٣٠ درجة مئوية.

كوسنتيكس مخصص للإستعمال الأحادي فقط.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامنة المنزلية. يستحسن الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تused في الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Water for injection, Trehalose dihydrate, L-histidine/L-histidine hydrochloride monohydrate, L-methionine and Polysorbate 80 low peroxide quality.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

كوسنتيكس محلول للحقن هو سائل شفاف. لونه قد يتغير من عديم اللون حتى مائل إلى الأصفر.

تحتوي كل علبة على ١ أو ٢ أقلام - سنسوريدي جاهزة للإستعمال (من الجائز إلا تسوق كافة أحجام العلب).

اسم صاحب الإمتياز وعنوانه: نوفارتييس إسرائيل م.ض.. ص.ب. تل - أبيب.

اسم المنتج وعنوانه: نوفارتييس فارما شطرين اي بي جي، شطرين، سويسرا.

من أجل نوفارتييس فارما اي بي جي، بازل، سويسرا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها حفص ورخص في تاريخ حزيران ٢٠١٩ وتم تحديتها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠١٩.


رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٥٤-٣٤٣٤٢.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

عملية الحقن:

- ٤) نزع الغطاء:
 - يجب نزع الغطاء فقط عندما تكون جاهزاً للإستعمال القلم.
 - إنزع الغطاء بواسطة تدويره بإتجاه الأسماء.
 - إن الغطاء بعد نزعه.
 - لا تناول وصل الغطاء من جديد.
 - يجب إستعمال القلم خلال ٥ دقائق من لحظة إزالة الغطاء.



تعليمات إستعمال كوسنتيكس ١٥٠ ملغم محلول للحقن، ضمن قلم جاهز للإستعمال.



كوسنتيكس قلم - سنسوريدي

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال

سيكوكينوماب

تعليمات الإستعمال للمعالجة



إقرأ كافية التعليمات بكاملها قبل الحقن.

هذه التعليمات مخصصة لمساعدتك على إستعمال كوسنتيكس قلم - سنسوريدي بشكل صحيح.
من المهم ألا تناول الحقن الذاتي إلى أن تحصل على إرشاد من الطبيب، الممرض أو الصيدلي.

قلم كوسنتيكس سنسوريدي الخاص بك:

يجب تخزين القلم الخاص بك في العلبة داخل البراد ما بين ٤-١٥ درجة مئوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

• لا يجوز تجميد القلم.

• لا يجوز إستعمال القلم إذا سقط بعد نزع الغطاء عنه.



من أجل إجراء حقن بشكل أسهل، يجب إخراج القلم من البراد ٣٠-١٥ دقيقة قبل الحقن ليتسنى له بلوغ درجة حرارة الغرفة.

لأن شوئه تحتاج بعية إجراء الحقن:

العلبة لا تشتمل:

- منديل كحولي
- كرقة قطنية أو شاش.
- وعاء للنفايات الحادة.


(يلزم قلمين من أجل مقدار دوائي قدره ٣٠٠ ملغم)




عليك قراءة هذا قبل عملية الحقن

خلال الحقن ستسمع طقطتين قويتين.
الطقطة الأولى تشير بأن الحقن قد بدأ بعد مرور عدة ثوان. ستشير الطقطة الثانية بأن الحقن قارب على الانتهاء.
عليك الاستمرار في إلصاق القلم بقوته إلى الجلد إلى أن ترى بأن المؤشر الأخضر يملاً النافذة ويتوقف عن الحركة.

- ١) بداية الحقن:
 - أقصي القلم بقوته إلى الجلد لكي تبدأ الحقن.
 - الطقطة الأولى تشير إلى بداية الحقن.
 - واصل إلصاق القلم بقوته إلى الجلد.
 - يبين المؤشر الأخضر تقدم الحقن.




- ٧) إنتهاء الحقن:
 - إنتظر لسماع الطقطة الثانية، هي تشير إلى أن الحقن قارب على الانتهاء.
 - تأكد من أن المؤشر الأخضر قد ملأ النافذة وتوقف عن الحركة.
 - الآن يمكن إخراج القلم.




بعد الحقن

- ٨) تأكيد من أن المؤشر الأخضر يملاً النافذة:
 - ذلك يعني بأنه تم حقن الدواء. راجع الطبيب إذا لم يbedo المؤشر الأخضر ظاهراً للعين.
 - من الجائز أن تظهر كرقة قطنية أو شاش على سطح الحقن. يمكن إلصاق كرقة قطنية فلينة من الدم في مكان الحقن. يمكن إيقافها على هذا النحو لمدة ١٠ ثوان. لا يجوز فرك مكان الحقن. يمكنك تقطيعه بمنطقة ملائمة ضماد لاصق (پلاستر) إذا دعت الحاجة.



- ٩) التخلص من كوسنتيكس قلم - سنسوريدي
 - يجب التخلص من القلم المستعمل إلى وعاء النفايات الحادة (أي، وعاء يمكن إغلاقه، مقاوم للتثقب أو وعاء مشابه).
 - لا يجوز مطلقاً معاودة إستعمال القلم الخاص بك.



تعليمات إستعمال كوسنتيكس ١٥٠ ملغم محلول للحقن، ضمن قلم جاهز للإستعمال.

كوسنتيكس قلم - سنسوريدي

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال

سيكوكينوماب

تعليمات الإستعمال للمعالجة

إقرأ كافية التعليمات بكاملها قبل الحقن.

هذه التعليمات مخصصة لمساعدتك على إستعمال كوسنتيكس قلم - سنسوريدي بشكل صحيح.
فلم - سنسوريدي يتشكل صحيح.

من المهم ألا تناول الحقن الذاتي إلى أن تحصل على إرشاد من

الطبيب، الممرض أو الصيدلي.

قلم كوسنتيكس سنسوريدي الخاص بك:

يجب تخزين القلم الخاص بك في العلبة داخل البراد ما بين ٤-١٥ درجة مئوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

• لا يجوز تجميد القلم.

• لا يجوز إستعمال القلم إذا سقط بعد نزع الغطاء عنه.



من أجل إجراء حقن بشكل أسهل، يجب إخراج القلم من البراد ٣٠-١٥ دقيقة قبل الحقن ليتسنى له بلوغ درجة حرارة الغرفة.

لأن شوئه تحتاج بعية إجراء الحقن:

العلبة لا تشتمل:

- منديل كحولي
- كرقة قطنية أو شاش.
- وعاء للنفايات الحادة.

(يلزم قلمين من أجل مقدار دوائي قدره ٣٠٠ ملغم)



قبل الحقن

١) من المهم إجراء فحص الأمان قبل الحقن:

يجب أن يكون السائل شفافاً. لونه قد يتغير من عديم اللون حتى مائل إلى الأصفر.

لا يجوز إستعمال محلول إذا كان يحتوي على جزيئات تبدو بسهولة للعين، عكراً أو لونبني. من الجائز أن ترى فقاعات هواء صغيرة. هذه ظاهرة طبيعية.


لا يجوز إستعمال القلم بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية.

لا يجوز إستعمال القلم إذا كان ختم الأمان معطوباً.

راجع الصيدلي إذا لم ينطخ القلم إحدى هذه الفحوصات.

٢) أختر مكان الحقن:

- المنطقة الموصى بها هي مقدمة البطن، لكن ليس بمكان يمكّنك الحقن في أسفل السرة.
- يجب اختيار مكان مختلف في كل مرة تحقن لنفسك.
- لا تحقن في مناطق يكون فيها الجلد حساساً. مرضوضاً، أحمر، مغطى بقشرة أو قاسي. يجب الامتناع عن الحقن في مناطق فيها ندب أو علامات شد.



٣) تنظيف مكان الحقن:

- إغسل يديك بالصابون والماء الدافع.

- من خلال إستعمال حركة دائرة، نظف مكان الحقن بمنديل كحولي. أتركه ليجف قبل الحقن.

- لا يجوز معاودة لمس المنطقة النظيفة قبل الحقن.

