

فليكسرجي بخاخ للأنف

فلوتوكازون بروبيونات 0.05% w/w

يحتوي كل مقدار دوائي على 50 مكغ فلوتوكازون بروبيونات.

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في البند 6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.

أغلق مختر واحد وأدخل الفوهة المختر الثاني. ميل الرأس إلى الإمام قليلاً وحافظ على القبضة منتصبة. امسك القبضة.

4.

ابداً باستنشاق الهواء إلى الداخل رويداء، عن طريق أنفك. في أثناء استنشاق الهواء قم بفتح طبلة من البخاخ داخل المنخر وذلك بالضغط بأصابعك بشدة على عنق الفوهة بتجاه الأنف.

5.

قم بزفر الهواء إلى الخارج عن طريق الفم. عاود المرحلة 4 من أجل البخ بخة ثانية لنفس المنخر.

6.

آخر الغوة من هذا المنخر قم بزفر الهواء إلى الخارج عن طريق الفم.

7.

عاود المراحل 3 حتى 6 في المختر الثاني.

8.

بد استعمال البخاخ، قم بتنقيف الفوهة بذعر بواسطة منديل من القماش أو

منديل ورقي تظيفي وأغلق البخاخ بالطعنة.

تقطيف البخاخ:

1. اززع العطاء والفوهة.

2. قم بفتح الفوهة والخطاء بالماء الدافئ لعدة دقائق وحينها قم بالغسل بماء الصنوبر الجاري.

3. قم بزاله بقايا الماء عنها ودعها تجف.

4. قم بتنقيف الفوهة ثانية.

5. إذا دعت الحاجة، اضغط على المضخة عدة مرات حتى الحصول على رذاذ طيفي.

6.

لا يجوزتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طبع الدواء والتتأكد من المقدار

الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لمز الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال فلوكسirجي بخاخ للأذن قد سبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدبر من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أي منها.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى أقل من 1 من كل 10000 شخص):

توقف عن تناول الدواء وتوجيه حالاً لتنقى علاج طبي إذا كنت تقاسي من:

• ردود فعل تحسسية. هذه يمكن أن تشمل ظهور طفح أو أحمرار في الجلد، انتفاخ الفم، اللسان أو الوجه، ضيق عام مفاجئ أو دوار، سعال أو صعوبات في التنفس، جفاف، تشفيق وفقدان الجلد.

توقف عن استعمال الدواء وبلغ الطبيب إذا كنت تقاسي من:

• مشاكل في العينين مثل الماء.

• مشاكل في الأذن مثل الماء أو نزف متواصل.

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):

• نزف من الأنف.

7.

أعراض جانبية شائعة (تظهر بين 1 من كل 10 أشخاص إلى 1 من كل 100 شخص):

• صداع.

• رائحة أو طعم غير مستحبين.

• جفاف أو تهيج في الأنف أو في الحنجرة.

أعراض جانبية ذات شعور غير معروف (أعراض لم يُحدد بعد شيوعاها):

• مشاكل في العينين مثل تشوش الرؤية.

• جروح في الأنف.

أعراض جانبية إضافية التي تلغى عنها:

• عطالي بعد استعمال البخاخ، لكن توقف هذا الأمر بسرعة.

من المهم الحرص على تعليمات المقدار الدوائي التي ذكرت في البند 3. إن استعمال فلوكسirجي بخاخ للأذن بمقاييس دولية أو لفترات أطول من 3 أشهر متالية يمكن أن يؤدي لعدة تغيرات في جسمك، مثل الميل الزائد لحدوث تلوثات.

