

ليوريزال 10 ملء أقراص 25 ملء ليوريزال

التركيب:

يحتوي كل قرص على:
باكلوفين 10 ملء

Baclofen 10 mg

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية»

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء إذا
والإرضاع».

ووصف هذا الدواء لعلاج مرضك. راجع الطبيب أو الصيدلي.
قد يضره حتى ولو بدا لك أن مرضه مشابه لمرضك.

• يحتوي قرص ليوريزال 25 ملء، يحتوي قرص ليوريزال 10 ملء على 83 ملء.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لإرخاء العضلات / أو لإرخاء التشنجات الناتجة عن
عوامل مختلفة.

يستخدم ليوريزال لتقليل تحفيز التصلب / أو التشنج
الزاد للعضلات نتيجة أمراض وحالات مختلفة.

إن إرخاء العضلات بواسطة ليوريزال يحسن من القدرة
على التحرك، وسيهل من إجراء الشفاطات اليومية.

إذا توفر لديك أسلطة عن طريق عمل ليوريزال، أو لماذا
وصف لك هذا الدواء، يجب التوجه للطبيب.

مرخي عضلي مع فعالية في العمود الفقري.

2) قبل إستعمال الدواء

- لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
 - كنت حساساً (الergic) - ليوريزال أو لكل واحد من مرکبات الدواء الأخرى، المفصلة في الفقرة 6.
 - كنت تعاني أو كنت تعاني في الماضي من قرحة في المعدة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- قبل العلاج - بـ ليوريزال، إحدى الطبيبات إذا:
 - كانت لديك سكتة.
 - كنت تعاني من الصرع.
 - كنت تعاني من أي مرض نفسي.
 - كنت مالجأ ضد ارتفاع ضغط الدم.
 - لديك مرض الباركنسون.
 - كنت تعاني من مرض في الكبد، في الكلى أو في الرئتين.
 - لديك مرض السكري.
 - لديك صعوبات في النبولة.

- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة (أنظر فقرة «الحمل
والإرضاع»).
- لديك مرض تحمل لنشاء القمح (تحتوي الأقراص على
كمية قليلة من نشاء القمح، الأقراص ملائمة لأشخاص
يعانون من مرض السيلياك، مع ذلك، إذا وجد لديك
حساسية للقمح لداء مختلف عن مرض السيلياك)
فلا يجوز تناول الدواء).
- لديك ساقية للإدمان أو التعلق بالدواء.

- إذا اضطررت عليك واحد أو أكثر من تلك الحالات، فتجب
إبلاغ الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ليوريزال، لأنه من
الجائز أن ليوريزال غير مناسب لك.

- التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:
 - إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى،
بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات
غذائية، إحدى الطبيبات أو الصيدلي بالآخر، إذا كنت تتناول:
 - الطبيب أو الصيدلي بأقصى طلب.

- أدوية أخرى لإرخاء العضلات، مثل بيزاندين.

- أدوية لعلاج الإضطرابات في الحالة النفسية مثل لينيوريم،
أو مضادات الاكتئاب، ثلاثة الملفة مثل أمبريتين.

- أدوية تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم مثل ديليتازم.

- أدوية أخرى التي تؤثر أيضاً على الكلى مثل بيوروفين.

- أدوية لعلاج مرض الباركنسون مثل ليقودو أو
كاربيدووا.

• أدوية تبطئ الجهاز العصبي مثل مضادات الهيستامين
مثل بروميتابازين، أدوية مهدئة مثل تيمازپام،
مستحضرات أفيونية المفعول التخفيف من الألم
مثل مورفين ومضادات التشنج (أدوية للصرع مثل
كاربامازيبين).

الحمل والإرضا

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
لا يجوز إستعمال ليوريزال خلال فترة الحمل، إلا إذا
أوصاك الطبيب بفعل ذلك. بلغي الطبيب إذا كنت في
فترة الحمل أو تخطيطن للحمل، إذا توجب عليك تناول
ليوريزال خلال فترة الحمل، فإن الجنين سيتعرض أيضاً
لـ ليوريزال، بعد الولادة من الجائز أن تكون لدى رضيعك
أعراض خفاف مثل اختلالات (وقف لارتفاع الغطام
في القرقاء «إذا توقفت عن تناول الدواء»).
فقط كمية قليلة من ليوريزال تنتقل إلى حليب الأم.

يتنافش معك طبيبك فيما إذا يمكنك الإرضاع خلال
فترة تناول ليوريزال.

السيادة واستعمال الماكولات

من شان بعض المتعالجين الشعور بميل إلى النوم
و/أو بدوراً، أو اضطرابات في الرؤية خلال فترة تناول
ليوريزال. إذا حدث لك هذا الأمر، فلا يجوز ساقطة المركبات
أو إجراء أمور أخرى تتطلب منك أن تكون يقظاً (مثل
تشغيل أجهزة أو مراكز) حتى زوال هذه التأثيرات.
بالنسبة للأطفال، يجب تجنبه من ركوب الدراجات أو
من اللعب بالقارب من حركة المروّر وما شابه.

تحذيرات خاصة

• يجب توخيحذر عند شرب المشروبات الكحولية -
 فهي قد تؤثر عليك أكثر من المعتاد.

• هناك أشخاص من بين المتعالجين - بـ باكلوفين حيث
لديهم اتكار للاحراق الذي أو قتل أنفسهم أو حاولوا
قتل أنفسهم. غالباً عانوا هولاً، الأشخاص أيضاً من
إكتئاب، هم يستعملون الكحول بشكل مبالغ فيه أو كانوا
عرضة لـ إفاكار حول الـ انتهاج. إذا وجد لديك في أي
وقت أتكاراً لإذن نفسك أو قتل نفسك، تحدث حالاً مع
الطبيب أو قدرقب مقرب بأن قرر طلبك، كذلك، من قرر بـ
عائلي من أي تغير طرأ على تصرفاتك وأطلب منهم
قراءة هذه الشرة.

• من الجائز أن يرغب طبيبك في أن يجري لك فحوص
دورية خلال فترة تناول ليوريزال.

• إذا كنت مقبلًا على اجتياز آية عملية جراحية، فيجب
إبلاغ الطبيب بذلك تناول ليوريزال.
الأطفال والمرأهون
ليوريزال غير مخصص للأطفال دون وزن 33 كلغ.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب
فقط.

يخبرك الطبيب كم قرضاً بالضبط يجب عليك أن تتناول
من ليوريزال، من شأن الطبيب أن يرفع أو يخفض المقدار
الداخلي من الدواء وفقاً لاحتياجاتك للعلاج.

تعلق الجرعة الدوائية على ليوريزال باستجابة المتعالج
للدواء. سبباً تناول جرعة دوائية متزايدة من الدواء
حيث يتعرف تدريجياً خلال أيام، وذلك بإشراف
الطبيب، حتى بلوغ الجرعة الدوائية المناسبة لك. يخبرك
الطبيب متى يجب عليك تناول الدواء.

عليك الاستحضار من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً
بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج.
لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

لا يجوز المضغ!

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام وبطء الأقراص مع
القليل من السوائل مثل مشروب حلبي.

ليوريزال 10 ملء - بالإمكان شتر القرص.

ليوريزال 25 ملء - إن خط الشرط مخصص فقط
للمساعدة على سرسر القرس تسهيل البلع، وليس للتقسيم
إلى جرعات دوائية متزايدة.

إن تناول ليوريزال في نفس الوقت من كل يوم يساعدك
على أن تذكر متى تتناول الدواء.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة كما حدد من
قبل الطبيب المعالج.

إذا سنت تناول الدواء

إذا سنت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا
يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة، تناول الجرعة الدوائية
اللتالية في الموعد الإعتيادي، وإشتهر الطبيب.

• تحتوي على ليوريزال 10 ملг - 25 ملг على 50 قرصاً.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ليوريزال 10 ملг: 120 93 23361
ليوريزال 25 ملг: 124 09 23362

اسم المنتج وعنوانه:

ليوريزال 10 ملг:
نوفاريس فارما إس. بي. أي., توري أنونزياتا, إيطاليا

من أجل نوفاريس فارما أي جي, بازل, سويسرا.
ليوريزال 25 ملг:

نوفاريس فارماسيوتيكا إس. بي., برشلونة, إسبانيا
من أجل نوفاريس فارما أي جي, بازل, سويسرا.

صاحب الامتياز وعنوانه:
نوفاريس إسرائيل م.ض., ص.ب. 7126, تل - أبيب.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحوهاُ فحصاً وُرِّص في تاريخ تشرين الثاني 2012 وتم تحديدها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ تشرين الأول 2019.

من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكورة على الغلاف. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

التبلغي عن أعراض جانبية

بإمكان التبلغي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغي عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى المنوّع المباشر للتبلغي عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنّب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر

في مكان مغلق بعيداً عن متناول أئدي ومجايل رؤية الأطفال وأروى الرخص، وذلك لتفادي اصباتهم بالتسوس.

لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحية

(exp. date)

الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين دون 25 درجة

مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.

إذا أخبرك الطبيب بالتوقف عن تناول أقراص ليوريزال،

فقم بإعطاء الأفراد المتفقة عدك للصيادي لاتلافها.

احفظ الأقراص فقط إذا أخبرك الطبيب بذلك. لا يجوز رمي الأقراص في المجاري أو في القمامنة. حفاظاً على البيئة.

(6) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Wheat starch PH, cellulose microcrystalline, povidone, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ليوريزال 10 ملг - أقراص بلون أبيض - مائل إلى الأصفر، مستديرة ومسطحة ذات أطراف مائلة.

طبع في جانب واحد «CG» وفي الجانب الثاني «L/K» مع خط للنشر.

ليوريزال 25 ملг - أقراص بلون أبيض - مائل إلى الأصفر، مستديرة ومسطحة ذات أطراف مائلة. طبع

في جانب واحد «CG» وفي الجانب الثاني «UR» مع خط للنشر. إن خط الشرط هذا خصص فقط لتشهيل البlix، وليس للتقسيم الجرعيين دوائين.

جفاف في الفم
مشكل في العينين

عدم ثبات، ارتتجاف أو مشكل آخر في السيطرة على العضلات

إنخفاض ضغط الدم (إغماء)

إضطرابات في الجهاز الهضمي: مشكل في المعدة تشمل،

الرغبة في التقيؤ؛ تققيؤ؛ إمساك؛ إسهال

تعمر زائد؛ طفح

تبول زائد من التبول أو ألم أثناء التبول

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

خدر أو وخز في راحتي البندين أو راحتي القدمين

تقاصر زائد للعضلات

إضطرابات في حالة التذوق

تشوش أو بطء النطق

ألم في البطن

مشكل في الكبد

صعوبة التبول

مشاكل جنسية لدى الرجل، مثلًا العجز الجنسي (impotence)

تشنجات (خاصة لدى مرضى الصرع)

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

انخفاض حرارة الجسم (انخفاض حرارة الجسم)

أعراض جانبية إضافية (تشيع غير معروف)

طفح باز على الجلد وحاتك urticaria - يعرف أيضاً

طفح القراد أو شرى

نبض بطيء

ارتفاع نسبة السكر في الدم

صعوبات في التنفس خلال النوم (متلازمة إنقطاع

النفس خلال النوم)

أعراض فطام ناجمة عن التوقف الفوري عن تناول الدواء

(أنظر الفقرة «إذا توقيفت عن تناول الدواء»)

إذا ظهر عرض جانبية، إذا تفاقمت إحدى الأعراض

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر عليك إبلاغ الطبيب حالاً.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

يجب الموافقة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقيفت من تناول الدواء

لا يجوز تناول التوقف بشكل مقاييس عن تناول ليوريزال.

قبل التوقف يجب مناقشة الطبيب أو الصيدلي، إذا قرر

الطبيب إيقاف العلاج بالدواء ليوريزال، فيستحب خفض الجرعة الدوائية بالتدريج لتجنب إعراض الفطام مثل

تشنجات ضلليلة وتصلب زائد في العضلات، نظم قلب سريع، سخونة، إرباك، هذيان، تغيرات في الحالة النفسية والمواطفة، إضطرابات نفسية، الشعور بالملائفة أو تشنجات.

لا يجوز تناول دويبة في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، يستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ليوريزال قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية من البالغ لأنها تساعد أي منها.

بلغ من حدوث الأعراض الجانبية المدونة لاحقاً:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10):

إرهاق: ميل للنوم؛ غثيان

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10):

ضعف زائد في الأطراف أو الشعور بالإرهاق: ألم في العضلات

صداع دوار أو الشعور بدوخة

صعوبة في التنفس

عدم القدرة على النوم

تقلبات في المزاج، إرباك، هذيان، كوابيس ليلية