

**פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו בדצמבר 2019
עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה:

אואטק 150 ג' וטרינרי
Avatec 150 G Veterinary
קדם תערובת בצורת אבקה

2. הרכב:

כל 1 ק"ג מכיל:

חומר פעיל:

לסלוסיד סודיום 150g Lasalocid Sodium

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף 13- "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

כתוסף רפואי למזון של פטמים והודיים למניעת קוקסידיוזיס הנגרם מזני אימיריה
(Eimeria).

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטאט.

4. התווית נגד:

אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ללסלוסיד סודיום.

5. תופעות לוואי:

אין תופעות לוואי ידועות.

אם הבחנת בתופעות חמורות כלשהן או בתופעות אחרות אשר אינן מוזכרות בעלון לצרכן
זה, אנא יידע את הרופא הוטרינרי שלך.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה:

פטמים והודיים.

7. צורת מתן ומינון:

קדם תערובת בצורת אבקה.

יש לערבב תחילה עם כמות קטנה של מזון ורק לאחר מכן עם הכמות הסופית.

פטים:

יש לערבב היטב 500-830 גרם של אוואטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 75-125ppm לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית. המינון המקובל הוא 600 גרם לטון, על מנת להגיע לריכוז של 90ppm לסלוסיד סודיום בתערובת. יש להאכיל באופן ממושך מגיל יום ולא מאוחר יותר מ-5 ימים לפני שחיטה.

הודיים:

יש לערבב היטב 500-830 גרם של אוואטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 75-125ppm לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית. יש להאכיל באופן ממושך מגיל יום עד גיל מקסימום של 16 שבועות.

8. אופן השימוש בתכשיר:

להוספה וערבוב הומוגניים במזון בהתאם להוראות רופא וטרינר.

9. זמן המתנה:

זמן המתנה לבשר לפטים והודיים – 5 ימים

10. אזהרות:

אזהרות מיוחדות לכל זני המטרה

לא לשימוש במטילות.

לא לשימוש בבעלי החיים המייצרים חלב למאכל אדם.

אסור לשימוש בסוסים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
אין.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

בזמן הערבוב או העיסוק בחומר יש ללבוש כפפות ומסכה לפנים.

יש להתרחץ לאחר העבודה ולפני האוכל.

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה.

יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.

באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים ב MSDS (material safety data sheet של המוצר).

פוריות והטלה

לא לשימוש במטילות.

תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין להשתמש בו זמנית עם תרופות אחרות נגד קוקסידיזיס.

מינון יתר

אין תופעות ידועות.

חוסר תאימות (incompatibility)

אין.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל- 25 °C.
- לאחסן באריזה המקורית.
- חיי מדף לאחר הערבוב עם מזון: התערובת ניתנת לשימוש למשך 3 חודשים.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Calcium lignosulphonate
Ferric oxide
Calcium sulphate dihydrate

- כיצד נראית התרופה: אבקה אדמדמה.

- האריזה: שק המכיל 20 ק"ג.

- שם היצרן וכתובתו:

Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l, Via Rubadello 6, 41036 Medolla, Italy.

- בעל הרישום וכתובתו: א. בי-זי ייעוץ ושיווק בע"מ, גאליה 76885.

מספר רישום התכשיר בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 146-20-33397-00



AHZ 777 1912