



ינואר 2020

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,
 ברצוננו להודיעך על עדכון בעלון לרופא של **Eliquis 2.5mg, Eliquis 5mg** :

APIXABAN 2.5mg Indicated for:

Prevention of venous thromboembolic events (VTE) in adult patients who have undergone elective hip or knee replacement surgery.

Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with One or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA) age ≥ 75 years; hypertension; diabetes mellitus, symptomatic heart failure (NYHA Class \geq II).
 Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults.

APIXABAN 5mg Indicated for:

Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF), with one or more risk factors, such as prior stroke or transient ischaemic attack (TIA); age ≥ 75 hypertension; diabetes mellitus, symptomatic heart failure (NYHA Class \geq II).
 Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in adults

להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא:

4.8 Undesirable effects

System Organ Class	Prevention of VTE in adult patients who have undergone elective hip or knee replacement surgery (VTEp)	Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with NVAF, with one or more risk factors (NVAF)	Treatment of DVT and PE, and prevention of recurrent DVT and PE (VTEt)
Alopecia	Rare	Uncommon	Uncommon

להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן:

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי האופייניות למתן אליקוויס בטיפול למניעת אירועים של פקת ורידית בחולים מבוגרים לאחר

ניתוח יזום להחלפת מפרק הברך או הירך:

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב-1 מתוך 1000 איש) :

דימום לתוך השריר, דימום בעין, דימום מהחניכיים ושיעול דמי, דימום מפי הטבעת, , **נשירת שיער**

תופעות לוואי האופייניות למתן אליקוויס בטיפול למניעת שבץ ותסחיפים בחולים מבוגרים עם פרפור פרודוריים

(שמקורו איננו במסתמי הלב) ולפחות גורם סיכון אחד נוסף:

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע ב-1 מתוך 100 איש) :

• **נשירת שיער**

תופעות הלוואי הבאות הינן ידועות אם הנך נוטל אליקוויס לטיפול או למניעת הישנות קרישי דם בורדי הרגליים

או בכלי הדם בריאות:

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע ב-1 מתוך 100 איש) :

• **נשירת שיער**

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.

<https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp?safa=h>

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד. 12133 הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,
 אורטל עבודי
 רוקחת ממונה