

Pitrex
Cream**פיטרקס**
קרם

Contains: Tolnaftate 1%

עדכון בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Topical treatment of superficial dermatomycoses.

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום) והסרות מידע כטקסט מחוק):

פיטרקס®
קרם

הרכב:

טולנאפטאט 1% w/w (Tolnaftate 1% w/w)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) אינם משתפרים לאחר 10 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

קרם לטיפול מקומי במחלות עור פטרייתיות שטחיות.

קבוצה תרפויטית: נוגד פטריות לטיפול מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה**אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- לטיפול בזיהומים בציפורניים או בקרקפת.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

רחוב התאנה 1 פארק תעשייה חמ"ן, ת.ד. 975, שוהם 60850 טל: 03-6864645, פקס 03-6864944 www.tevapharm.com

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התכשיר מכיל בוטילאיטיד הידרוקסיטולואן (Butylated hydroxytoluene (E 321)) שעלול לגרום לתגובת עור מקומית (למשל דלקת עור ממגע), או לגירוי בעיניים או ברקמות ריריות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

יש למרוח שכבה דקה על השטח הנגוע 2-3 פעמים ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנתיים.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 10 ימים יש לפנות לרופא.

- אין לבלוע.
- לשימוש חיצוני בלבד.
- יש להימנע ממגע עם העיניים.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע.
יש לרחוץ את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. **בין טיפול לטיפול ניתן להשתמש באבקת טלק או באבקה נגד פטריות כדי לייבש את המקום.**

אם הטיפול הוא ברגליים, יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש, במיוחד בין אצבעות הרגליים. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפטרקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה אם תופעות הלוואי הבאות מחמירות:

- גירוד מדי פעם, גירוי -מקומי או פריחה(נדיר).

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
• תגובות עוריות, דלקת עור ממגע (contact dermatitis)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

[...]

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות
<http://www.health.gov.il> וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.