

فوريكينازول-تربيما أقراص مطليّة

تحتوي كل قرص مطلي على: فوريكينازول 200 ملг
قائمة المواد غير الفعالة وموادات الحساسية بالمستحضر: انظر البند "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء" والقافة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى تهابها قبل استعمالك للدواء. تحظى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء للعلاج من الحالات. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. كل دose فوريكينازول-تربيما تحتوي على ملجم مخصوص لالأطفال ورضع دون عمر ستين.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

فوريكينازول-تربيما هو عبارة عن مستحضر مضاد للطفريات. هو يصل بواسطة إبادة أو إيقاف نمو طفريات مختلفة التي تسبب ثلوثات. المستحضر مخصوص المرضى الذين يعانون من ثلوثات فطرية خطيرة. لا بل ربما تشكل خطرًا على الحياة. كذلك، فإن المستحضر يستعمل لمنع الثلوثات الفطرية لدى المتعالجين الذين اجتازوا زراعة أعضاء. يجب استعمال المستحضر فقط تحت الرعاية الطبية.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للطفريات من فصيلة التريازول.

2. قبل استعمال الدواء إذا:

- ☒ كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركيبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6.
- ☒ لا يجوز استعمال هذا الدواء مع تيرفيندين (الحساسية)، أستيميزول (الحساسية)، سيسابريد (المشاكل المعدية)؛ موزيد (المشاكل النفسية)، كوبيندين (المشاكل ظلم القلب)، فونيورابين (المعالجة الإلتحاحات) (العلاج السلس)، كارامازيبين (العلاج اللثارات الفطرية) والأرق الشديد)، مشقات الأرجوت (إرجوتامين، بيهيدرو إرجوتامين)، إيفافيرينز (علاج التهاب الأمعاء)، سيروليموس (الذى المرضى الذين اجتازوا زراعة أعضاء)، إيفافيرينز بجرعة دوائية قد ترتفع إلى 400 ملجم وما فوق في اليوم (العلاج HIV)، ريتونافير فيجرات الدوائية التي تتطوى مرتبطة في اليوم، قدرها 400 ملجم وما فوق لكل مرة (العلاج HIV)، بيته بيهيريكوم (St John's Wort).

قبل العلاج بـ فوريكينازول-تربيما احك الطبيب إذا:

- ☒ كنت تعاني أو عانت في الماضي من رد فعل تحسسي لمستحضرات من فصيلة الأزول.
- ☒ كنت تعاني من مرض في عضلة القلب أو من خلل في نظم القلب.
- ☒ كنت تعاني أو عانت في الماضي من مرض في الكبد. يراقب طببك وظائف الكبد لديك عن طريق إجراء فحوص دم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- ☒ يجب تحذير أي تعرض للشمس أثناء استعمال الدواء. من الهم تغطية مناطق الجسم التي يمكن أن تعرض للشمس واستعمال كريم واقي ذي عامل وقائي (SPF) مرتفع، لأنه قد تحدث زيادة في حساسية الجلد لأشعة الشمس. هذا التحذير يخص الأطفال أيضا.
- ☒ أثناء استعمال الدواء، احك للطبيب فورا إذا تطور لديك حرق ياتي عن الشمس، طفح شديد فمن شأن طببك أن يوجهك طبيب جلدي. هناك احتمال ضئيل تطور سرطان الجلد عند الاستعمال طول الأمد بـ فوريكينازول-تربيما.
- ☒ يراقب طببك وظائف الكبد والكليني طرق إجراء فحص الدم خلال العلاج بـ فوريكينازول-تربيما. يرجى أن تبلغ الطبيب إذا شعرت بالألم في البطن أو إذا شعرت أنه طرأت تغيرات على قواط العازل.
- ☒ قبل بدء العلاج وخلاله يجب إجراء فحص لاضطرابات في نسب الشوارد الكهربائية مثل نفس البوتاسيوم في الدم، نفس المغنيسيوم في الدم، نفس الكالسيوم في الدم.
- ☒ الأدوية الأخرى وفوريكينازول-تربيما

طبيبك العلاج إذا تطور لديك أو لدى طفلك أعراض جانبية مرافقه للعلاج.

- يجبتناول الفرس على الأقل ساعة قبل أو ساعة بعد وجبة الطعام. يجب ابتلاء الفرس كاملا مع التقليل من الماء. إذا لم يكن هناك خط للشرط، لا يجوز شطر الفرس. ليست هناك معلومات حول السحر المضمن.
- إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء. توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضار عك عليه الدواء من الجائز أن تشعر بحساسية زائدة للضوء نتيجة تناول مقدار دوائي مفرط.

- إذا تناولت الدواء من الماء تناول الدواء كل يوم في ساعة مديدة.
- إذا ثبنت تناول الدواء في الوقت المخصص، تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت الاعتيادي، لكن لا يجوز بآي حال من الأحوال تناول مقداراً دوائياً مصاعداً للتعويض عن المقدار الدوائي المنفي.
- يجب الاستمرار في العلاج حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك.

- إذا توقفت عن تناول الدواء لدى ممicker فان التلوث لديك قد يستمر أو يعود.
- لدى متعالجين لديهم جهاز تنفس ضيق أو يعانون من ثلوث شديدة من الجائز أن يتطلب الأمر علاجاً طفلياً الأقل لمنع عودة التلوث.
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء. استشر الطبيب أو الصيدلي.

- **4. الأعراض الجانبية**
كما بكل دواء، إن استعمال فوريكينازول-تربيما قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعانى أي منها.
- **أعراض جانبية خطيرة - يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه حالاً للطبيب**
- طفح
- برجاع وأو تغير في تناول فحص وظائف الكبد في فحوص الدم
- التهاب البنكرياس
- أعراض جانبية شائعة جداً (من شائعها أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- خلل في الرؤية (تغيرات في الرؤية بما في ذلك تشوش الرؤية، تغيرات في الألوان، حساسية زائدة للضوء، عمي الألوان، خلل في العين، هالة، عمي ليلي، تقلبات في الرؤية، رؤية وضيق، أوردة، تناقص حصة الرؤية، زغالة، تناقض مجال الرؤية، بقع/نقاط في مجال الرؤية)
- سخونة
- طفح
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- انتفاخ الأطراف
- ألام في البطن
- صعوبات في التنفس
- ارتفاع إنزيمات الكبد

- **أعراض جانبية شائعة (من شائعها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):**
- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللثة، قشرة لثة، ضعف نسبيه مختلقة، بما في ذلك طبلة، ليصل من بلايا الماء وأو الپیضاء (ترافق أحياناً بسخونية)، انتفاخ نسبيه الصفرات الدموية التي تساعد على تخفير الدم
- نسبيه مركب مختلقة في الدم، نسبة پوتوانوسوم مختلقة في الدم، نسبة صوديوم مختلقة في الدم، قلق، رغبة راحة، اكتئاب، ارتباك، صعوبات في النوم، هذين انتفاخات، رجفة أو حرکات لا ارادية للعضلات، الشعور بوخذ أو أحاسيس غير اعتيادية في الجلد، زيادة توتر العضلات، تنافس، دوار
- تنافس في العين
- مشكل في نظم القلب بما في ذلك تيوض سريع / بطء جداً، إغماء
- ضغط الدم منخفض، التهاب الأوردة (الذي يمكن أن يكون ذو صلة بشكل خترة دموية)

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومركبات غذائية، أحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالعكس إذا كنت تتناول:

- أدوية التي يجب تحجيم اعطائها من أمكن بمشاركة فوريكينازول-تربيما، وتطلب الأمر ملائمة المدار الدوائي إذاً، أعطيت سوية.
- فيتنوتين (العلاج الصرعي). إذا كنت تتناول هذا الدواء فيجب مرافقته بنسبة فيتنوتين في الدم.
- ريتونافير (العلاج HIV) بمقدار دوائي مخصوص قدره 100 ملجم مرتبطة في اليوم. لا يمكن تناول قabilis دوائية معيينة من ريتونافير مع فوريكينازول-تربيما، لأنظر "لا يجوز استعمال الدواء إذاً، تحت ذات المقدار"
- ريفابوتين (العلاج السلس). إذا كنت متعالجاً بـ ريفابوتين، فعليك اختيار تعداد دم ومتابعة الآعراض الجانبية لـ ريفابوتين بشكل روتيني.

- أدوية عند مشاركتها مع فوريكينازول-تربيما من حيث أنها لا تزال ذات التأثير المزعوب:
- وارفارين ومضادات خوارج أخرى (مثل فينيروكومون، أستينوكارول)
- سيلوكسيبرين، تاكروليموس (المتعالجين الذين اجتازوا زراعة أعضاء)
- مثبطات (مثل أورفاستاتين، سيماستاتين، أوسلستاتين) (العلاج مستقر كولسترول مرتفع)
- بيتونيزاباتين (مثل ميبارولام، البرازولام، وتريزابولام) (الألق الشديد والتهنئة)
- أوبيريزابول (العلاج فرحة المعدة)

- أقراص منع الحمل
- مشفات الفينا (مثل فينيركتستين وفينيلاستين) (العلاج السرطان)
- إيفافيرينز ومضادات أخرى للإنزيم HIV بروتنيز (لا يجوز تناول مقدار دوائية معيينة من إيفافيرينز مع فوريكينازول-تربيما، إيفافيرينز (لا يجوز تناول الدواء إذاً تحت ذات المقدار)
- ميثادون (العلاج الإدمان)
- أفيونات قصيرة المدى (مثل الفنتانيل، سوفيفتانيول) (سكنات للألام في الإجراءات الجراحية)

- أوكسيكودون وهيدروكودون (لتسكن الألام المتوسطة حتى الشديدة)
- أدوية لاستير ونيبيه مضادة للالتهاب (مثل بيوپروفين وديكلوفيناك) (العلاج الألم والالتهاب)
- فوريكينازول (العلاج للتلوثات الفطرية)
- إيفورليموس (العلاج سرطان متقد في الكلية ولدى متعالجين اجتازوا زراعة أعضاء)

- **الحمل والإرضاع**
لا يجوز استعمال الماء إذا كنت حامل، إلا إذا تلقت تعليمات صريحة من الطبيب. يجب على النساء في سن الحضورة استعمال وسائل ناجحة لمنع الحمل أثناء استعمال الدواء. توجهي طببك على حالاً إذا أصبحت حاماً حالاً فرحة تناول فوريكينازول-تربيما.
- إذا كنت ماماً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، توجهي للطبيب قبل تناول الدواء.

- **السيولة واستعمال الماكينات**
قد يؤدي فوريكينازول-تربيما إلى تشوش في الرؤية أو إلى حساسية للضوء. إذا أثر ذلك عليك فلا يجوز السياقة أو تشغيل مكائنات خطيرة، بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من الركوب على الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.
- **معلومات هامة عن بعض مركيبات فوريكينازول-تربيما**
تحتوي الأقراص على لاكتوز وبالتالي إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فعليك التوجه للطبيب قبل تناول الدواء.
- **3. كيفية استعمال الدواء؟**
يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا.
- علىك الاستحسان من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريق العلاج بالمستحضر.
- المدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يحدد المقدار الدوائي اعتماداً على وزنك وت نوع التلوث لديك.
- من الجائز أن يرفع أو يخفض طببك المقدار الدوائي اليومي، اعتماداً على استجابتك للعلاج.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!
- يجب إعطاء الدواء للأطفال فقط إذا كان الطفل قادرًا على ابتلاء الأقراص (على أية حال، ليس قبل سن 6 سنوات).
- إذا كنت أنت أو طفلك تستعملان فوريكينازول-تربيما لمنع التلوثات الفطرية، فمن الجائز أن يوقف

مصحوبات خطيرة في التنفس، الم في الصدر، انفاس الوجه (الم، الشفتين وحول العينين).

احتباس السوائل في الرئتين

• إمساك، سعوبات في الهضم، التهاب الشفتين

• برقان، التهاب الكبد (hepatitis) وضرر الكبد

طفح جلدي الذي قد يؤدي إلى تقرش خطير وஹوصلات في الجلد التي تتميز بمنطقة حمراء، مسطحة في الجلد معطاء بتنوء صغيرة موصولة، أحمراء في الجلد

• حكة

• تضطّلت الشعر

• ألم في الظهر

• فشل كلوي، بول دموي، تغيرات في فحوص الأداء لوظيفي للكلى

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

• الشعور بوعكة، تيبق والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الجهاز الهضمي الذي يؤدي إلى حدوث إسهال، التهاب في الجهاز الهضمي

• التهاب النسج الرقيق الموجود في الجدار الداخلي للبلون ويعطي توسيع البطن

• تضخم الغدد الليمفاوية (أحياناً مؤلم)، فشل نخاع العظم، ارتفاع سبعة اليوزينيات (الحمضات) في الدم

• تراجع في الأداء الوظيفي للذلة الكظرية، قصور الغدة الدرقية

• أداء وظيفي دماغي غير اعتيادي، أعراض شبيهة بأعراض الباركنسون، ضرر عصبي الذي يؤدي إلى خدر، ألم، وخز أو الشعور بحرق في الأطراف

• مشكلة في التوازن أو التنسيق

• تورم في الصداع

• ارتوارج الروءوع، حالات خطيرة في العين تشمل: الم أو التهاب في العينين والجفنين، حرقات غير عادمة للعين، تصرّر عصب الرؤية الذي يؤدي إلى اضطراب في الرؤية، انتفاخ القرص

الصوري

• تغير في حاسة المذاق

• اضطرابات في السمع، طنين في الأذنين، فيريتيجو (الشعور بدوران)

• التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، انتفاخ والتهاب اللسان

• تضخم الكبد، قفل كبدى، حصى أو مرض كيس في كيس المرارة

• التهاب المفاصل، التهاب الأوردة (الذي يمكن أن تكون ذو صلة بتشكل خثرة دموية)

• نظم طبقي روبرج جداً أو تقوية ضربات قلبية، ارتفاق أحياناً بدفعات كهربائية غير ثابتة

(E.C.G.)

• تغيرات في الخطوط الكهربائية للقلب

• ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم، ارتفاع نسبة اليلوريا في الدم

• رود فعل تحسسي في الجلد (أحياناً خطير) بما في ذلك حالات جلدية تشكل خطراً على الحياة

التي تؤدي إلى ظهور وهوصلات مولمة، حرج / تاليل في الجلد وفي الأغشية المخاطية،

الترعرع للضوء أو اللثام، جلد أحمر ومنهيج، بقع حمراء أو ينفسحية على الجلد جراء

الانفاس تعداد الصفائح الدموية، إكزيما

• رد فعل تحسسي أو رد فعل شاذ للجهاز المناعي

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

• ارتفاع شفط الغدة الدرقية

• رد فعل تحسسي في الدماغ (مضاعفة خطيرة لمرض كبدى)

• تدهور في الأداء الوظيفي للدماغ، تكرر القرني، حرکات لا إرادية للعينين

• ضرر خطير لعصب الرؤية، تكرر القرني، حرکات لا إرادية للعينين

• طهور وهوصلات نتيجة حساسية / التعرض للضوء

• اضطرابات ياهما في جهاز المناعة للجسم قسم من الجهاز العصبي المحيطي

• مشكلات في نظم أو في التوصيل الكهربائي للقلب (أحياناً تشكل خطراً على الحياة)

• رد فعل تحسسي يشكل خطراً على الحياة

• اضطرابات في جهاز تنفس الم

• رد فعل تحسسي في الجلد (أحياناً خطير) بما في ذلك انتفاخ سريع (وذمة) في الجلد، بقع

حكة أو مولمة جلد سيليك، محرر متراقب فتقزير، حكة في الجلد وفي الأغشية المخاطية، حالة

جلدية تشكل خطراً على الحياة التي تؤدي لانفصال أجزاء واسعة من البشرة (الطبقة الخارجية

للجلد) عن الخلايا

• بقع جلدية صفراء، حادة وحرشفيّة، أحياناً سميكه تتراافق بـ "فرون".

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

• نمش وفتح صباوغية

5. كيفية تخزين الدواء

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أياً من الأطفال ومحالٍ رؤية الأطفال / أو الرضع وذلك لتفادي اصطيهاب التسمم. لا تسبب التغيير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• شروط التخزين: احفظ في مكان جاف. درجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone, pregelatinized starch, magnesium stearate, HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol.

يحتوي كل قرص على 248.5 ملجم لاكتوز مونوهيدرات.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى الطبلة:

تحتوي كل طبلة على 14 أو 28 قرصاً مطابياً، مظلولاً، ذات لون أبيض. المنتج وصاحب التسجيل: تربما، منتجات طبية إسرائيلية معبروت م.ض.، معبروت 4023000، إسرائيل.

فترة حفظ هذه التفاصيل والتوصيات عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ آذار 2014 وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ آب 2019.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 151.41.33937.00 من أجل سهولة وتهوير القراءة، تمت صياغة هذه التفاصيل بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

مبروت 4023000

منتجات طبية إسرائيلية

مبروت.م.ض.

