

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أوجمنتين ٨٧٥ ملغ أقراص أقراص مطلية.

- إذا كنت تتناول بروبينيسيد (يستعمل للنقرس)، فمن الجائز أن يقرر طبيبك ملاءمة الجرعة الدوائية من أوجمنتين.
- إذا كنت تتناول الأدوية التي تساعد على منع تخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكونومارول) مع أوجمنتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.
- يمكن أن يؤثر أوجمنتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

يحتوي كل قرص على: ٨٧٥ ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات) amoxicillin (as trihydrate)
١٢٥ ملغ حمض كلافلونيك (على شكل ملح البوتاسيوم) clavulanic acid (as potassium salt)

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة ٦

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أكل. لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوجمنتين لدى الكبار والأطفال لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل.

أوجمنتين عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين إثنين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلونيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة «بينيسيلينات» التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلونيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية: أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة البينيسيلينات.
حمض كلافلونيك: مثبطات الإنزيم بيتا - لاكتاماز.

(٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافلونيك، لبينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة ٦)
 - حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنتفاخ الوجه أو الحنجرة
 - حدث لديك ذات مرة مشاكل في الكبد أو يرقان (إصفرار الجلد) عند تناولك لمضاد حيوي.
- ← لا تتناول أوجمنتين إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول أوجمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول أوجمنتين إذا:

- كنت مصاب بمرض القيلة
 - كنت تتلقى علاجاً جراًء مشاكل في الكبد أو الكلية
 - كنت لا تتبول بشكل سليم.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا ينطبق عليك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول أوجمنتين.
- في حالات معينة، من الجائز أن يفحص طبيبك نوع الجرثومة المسببة للتلوث لديك. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أوجمنتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات معينة يجب الإنتباه إليها

قد يؤدي أوجمنتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إختلاجات (تشنجات) وإلتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك لـ أوجمنتين، لتقليل خطورة حدوث أية مشاكل. انظر «حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها» في الفقرة ٤


فحوص الدم والبول

بلغ الطبيب بأنك تتناول أوجمنتين وذلك إذا كنت تتجاوز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص بول (لفحص نسب الجلوكوز). وذلك لأن أوجمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوصات من هذا النوع.

الأدوية الأخرى وأوجمنتين

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. خاصة:

- إذا كنت تتناول الوورينول (يستعمل للنقرس) مع أوجمنتين، فهناك احتمال أكبر بأن تعاني من رد فعل تحسسي جلدي.



- قد يؤثر أوجمنتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك لتلقي إستشارة قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

يمكن أن يسبب أوجمنتين أعراضاً جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير قادر على السياقة. لا تقود السيارة أو تشغل الماكينات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من ٢٢ ملغ صوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خال من الصوديوم.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بشأن الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

الكبار والأطفال الذين يزنون ٤٠ كلغ وأكثر

- الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد مرتين في اليوم
- جرعة دوائية أكبر: قرص واحد ثلاث مرات في اليوم

الأطفال الذين يزنون أقل من ٤٠ كلغ

يوصى بعلاج الأطفال بعمر ٦ سنوات وما دون ذلك بواسطة معلق أوجمنتين عن طريق الفم. يجب إستشارة الطبيب في حال إعطاء أقراص لأطفال يزنون أقل من ٤٠ كلغ.

إن الأقراص غير ملائمة لأطفال الذين يزنون أقل من ٢٥ كلغ.

لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص معالجات دون عمر شهرين.

معالجون لديهم مشاكل في الكلية والكبد

- إذا وجدت لديك مشاكل في الكلية فمن الجائز أن يتم تغيير الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار طبيبك عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وجدت لديك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن تحتاج إلى إجتيان فحوصات دم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف الكبد لديك.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

كيف تتناول أوجمنتين

- يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء مع وجبة الطعام.
- بالإمكان شطر الأقراص على طول الخط المؤشر من أجل تسهيل البلع. يجب تناول قسمي القرص في نفس الوقت. لا تتوفر معلومات بشأن السحق والمضغ.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوي خلال اليوم، بفواصل زمني قدره ٤ ساعات على الأقل. لا تتناول جرعتين خلال ساعة واحدة.
- لا يجوز تناول أوجمنتين لأكثر من أسبوعين. عليك العودة لمراجعة الطبيب إذا ما زلت تشعر بسوء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أوجمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثبان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلاجات. راجع طبيبك بأسرع ما يمكن. وخذ معك علبة الدواء لترهيا للطبيب. إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول أوجمنتين

- إذا نسيت تناول جرعة دوائية، فتناولها لحظة تذكرك بذلك.
- لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل إنتظر ٤ ساعات تقريباً قبل تناول الجرعة الدوائية التالية. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

