

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إينكروز إيليتا 55 مكغ، مسحوق للإستنشاق

كل مقدار دوائي يتحرر من منشقة الـ إينكروز إيليتا يحتوي على 55 ميكروغرام من المادة الفعالة يوميكليدينيوم (Umeclidinium) (كمية تعادل 65 ميكروغرام يوميكليدينيوم بروميد)

لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية أنظر الفقرة 2 – «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 – «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يحتوي إينكروز إيليتا على المادة الفعالة يوميكليدينيوم.

يستعمل هذا الدواء لعلاج مرض الرئتين الإنسي/ادي المزمن (COPD) لدى الكبار. COPD هو عبارة عن مرض طويل الأمد يحدث فيه إنسداد أو تضيق تدريجي للطرق الهوائية وللحويصلات الهوائية في الرئتين، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات تنفسية تتفاقم ببطء. إن تقلص العضلات المحاطة بالطرق الهوائية تضيق الطرق الهوائية وتحد تنفس الهواء وبذلك تزيد من صعوبات التنفس.

هذا الدواء يكبح تقلص هذه العضلات، وبذلك يسهل من دخول وخروج الهواء من الرئتين. بالإستعمال المنتظم يمكنه أن يساعد في السيطرة على الصعوبات التنفسية لديك وعلى تقليل تأثيرات الـ COPD على حياتك اليومية.

لا يجوز إستعمال إينكروز إيليتا للتخفيف من النوبة المفاجئة لضيق النفس أو الصفير.

إذا قاسيت من نوبة من هذا النوع، فعليك إستعمال منشقة مخصصة للتخفيف السريع (مثل سالبوتامول).

إذا لم يكن بحوزتك منشقة مخصصة للتخفيف السريع توجه إلى طبيبك.

الفصيلة العلاجية: مضاد الفعل الكوليوني.

ينتمي إينكروز إيليتا إلى فصيلة الأدوية المسماة موسّعات القصبات الهوائية.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) لـ يوميكليدينيوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).

← إذا كنت تعتقد بأن الذي يظهر أعلاه يخصك، فلا تستعمل هذا الدواء حتى تفحص مع طبيبك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إينكروز إيليتا، إحك للطبيب إذا:

• كنت تعاني من الربو (لا تستعمل إينكروز إيليتا لعلاج الربو)

• وجدت لديك مشاكل في القلب

• وجدت لديك مشكلة في العينين تسمى چلوکوما ضيقه الزاوية

• وجد لديك تضخم في غدة الپروستات، صعوبة في التبول أو إنسداد المثانة البولية لديك

• وجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد

→ إفحص مع طبيبك إذا كنت تعتقد بأن واحد مما ذكر يخصك.

صعبات في التنفس حالاً بعد إستعمال إينكروز إيلبيتا

إذا قاسيت من ضغط في الصدر، سعال، صفير أو ضيق في التنفس حالاً بعد إستعمال منشقة إينكروز إيلبيتا الخاصة بك:

→ توقف عن إستعمال هذا الدواء وتوجه حالاً للتلاقي مساعدة طبية، لأنه من الجائز أنك تعاني من حالة خطيرة تسمى تقلص القصبات التناصفي.

مشاكل في العينين خلال العلاج بـ إينكروز إيلبيتا

إذا كنت تقاسي من ألم أو إنزعاج في العينين، تشوش مؤقت في الرؤية، كنت ترى هالات ضوئية أو مشاهد ملونة متراقة بإحمرار العينين خلال العلاج بـ إينكروز إيلبيتا:

→ توقف عن إستعمال هذا الدواء وتوجه حالاً للتلاقي مساعدة طبية، يمكن لهذه أن تكون علامات لنوبة شديدة من چلوكوما ضيقية الزاوية.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال أو لراهقين دون عمر 18 سنة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. إذا لم تكن واثقاً مما يحتويه دوائك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

بالأخص إحذ للطبيب أو للصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أخرى طويلة المدى لعلاج المشاكل التنفسية، والتي تشبه هذا الدواء، مثل: تيوتروبيوم. لا تستعمل إينكروز إيلبيتا سوية مع تلك الأدوية الأخرى. إذا لم تكن واثقاً بما يحتوي دواؤك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك قبل إستعمال هذا الدواء. لا تستعملي هذا الدواء إذا كنت في فترة الحمل، إلا إذا أوصاك طبيبك بذلك.

ليس معروفاً فيما إذا كانت مركبات إينكروز إيلبيتا يمكن أن تنتقل إلى حليب الأم. إذا كنت في فترة الرضاعة، فأنت ملزمة بالفحص مع طبيبك قبل أن تستعملي إينكروز إيلبيتا.

السيارة وإستعمال الماكنات

من غير المحتمل أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السيارة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي إينكروز إيلبيتا على اللكتوز

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل إستعمال هذا الدواء.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة نشقة واحدة كل يوم في نفس الساعة من اليوم. يتوجب عليك إستنشاق نشقة فقط مرة واحدة في اليوم لأن تأثير هذا الدواء يستمر 24 ساعة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به

استعمال إينكروز إيلبيتا بشكل دائم

مهم جداً أن تستعمل إينكروز إيلبيتا كل يوم، كما تم إرشادك من قبل طيبك. هذا الأمر يساعدك على بقاءك من دون أعراض طوال النهار والليل.

لا يجوز إستعمال إينكروز إيلبيتا للتخفيف من نوبة مفاجئة ضيق التنفس أو الصفير. إذا قاسيت من نوبة من هذا النوع فعليك إستعمال منشقة مخصصة للتخفيف السريع (مثل سالبوتامول).

كيفية إستعمال منشقة إيلبيتا

لمعلومات كاملة أنظر تعليمات الإستعمال مرحلة تلو الأخرى' ما بعد الفقرة 6 في هذه النشرة.
إينكروز إيلبيتا مخصص للإستعمال بالإستنشاق. من أجل إستعمال إينكروز إيلبيتا، عليك إستنشاقه إلى رئتيك عبر الفم بواسطة منشقة إيلبيتا.

إذا لم تتحسن الأعراض لديك

إذا لم تتحسن أو تقامت أعراض الد - COPD لديك (ضيق في التنفس، صفير، سعال) أو إذا كنت تستعمل المنشقة للتخفيف السريع في أوقات متقاربة أكثر:
→ راجع طيبك بأسرع وقت ممكن.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

فعليك التوجه حالاً للطبيب أو للصيدلي الخاص بك للتلقى إستشارة لأنك من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي. إذا أمكن، أريهم المنشقة، العبوة أو هذه النشرة. من شأنك أن تلاحظ بأن قلبك ينبض أسرع من المعتاد، لديك إضطرابات في الرؤية أو جفاف في الفم.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا إستعمل طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال الدواء

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المحدد، لا تستنشق مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. إستنشق المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي.

إذا بدأ صفير لديك أو حدث ضيق في التنفس، إستعمل المنشقة للتخفيف السريع (مثل سالبوتامول)، ومن ثم توجه للتلقى إستشارة طبية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن إستعمال الدواء

إستعمل هذا الدواء طالما أوصى طيبك بذلك. فهو يكون ناجع فقط طالما كنت تستعمله. لا تتوقف إلا إذا أوصاك طيبك بذلك، حتى ولو كنت تشعر بشكل أفضل، لأن الأعراض لديك قد تتفاقم.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إينكروز إيلبيتا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

ردود فعل تحسسية

ردود فعل تحسسية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص).
إذا ظهر لديك واحد من الأعراض التالية بعد إستعمال إينكروز إيلبيتا، توقف عن إستعمال هذا الدواء وإحك عن

ذلك لطبيبك فوراً:

- حكة
- طفح جلدي (تدرن حاك - شرى) أو إحمرار.

أعراض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- نبض سريع
- تبول متكرر ومؤلم (من شأنه أن يكون علامة لإلتهاب المساك البولية)
- زكام
- تلوث الأنف والحنجرة
- سعال
- الشعور بضغط أو ألم في الخدين والجيدين (من شأنها أن تكون علامات لإلتهاب الجيوب المسمى إلتهاب الجيوب الأنفية)
- صداع
- إمساك

أعراض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- نبض غير منتظم
- ألم في الحنجرة
- جفاف الفم
- طفح
- إضطرابات في حاسة التذوق.

أعراض جانبية نادرة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1000 شخص:

- ألم في العينين.

أعراض جانبية أخرى

أعراض جانبية أخرى ظهرت لدى عدد قليل جداً من الأشخاص، لكن وتنيرة ظهورها المضبوطة غير معروفة (لا يمكن التقييم من المعلومات المتوفرة):

- ضعف الرؤية أو ألم في العينين جراء ارتفاع الضغط في العينين (علامات محتملة لحدوث چلوكوما)
- تشوش الرؤية
- ارتفاع الضغط داخل العين الذي يتم قياسه
- صعوبة وألم عند التبول — من شأنها أن تكون علامات لإنسداد المثانة البولية أو إحتباس البول
- دوار

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقديم إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين المنشقة في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة والإخراج فقط مباشرة قبل الإستعمال الأول. لا تفتح اللوبيحة إلا عند بدء الإستعمال. منذ لحظة فتح اللوبيحة، بالإمكان إستعمال المنشقة حتى 6 أسابيع من موعد فتح اللوبيحة. عند إخراج المنشقة من اللوبيحة، يجب الكتابة على ظهر الملصقة الخلفية للمنشقة والعلبة، في المكان المخصص لذلك، التاريخ الأخير لإستعمال المنشقة.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة فوق 30 درجة مئوية.
- إذا كانت المنشقة مخزنة في البراد، فدع المنشقة تعود لدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل قبل الإستعمال.
- لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إنتشر الصيدلي حول كيفية رمي أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً —

Magnesium stearate, lactose monohydrate

(أنظر الفقرة 2 تحت 'يحتوي إنكروز إيليبتا على اللكتوز')

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة —
إنكروز إيليبتا عبارة عن مسحوق للاستنشاق.
- منشقة إل إيليبتا مكونة من جسم بلاستيكى رمادي اللون، غطاء فوهة أخضر فاتح و عدد للمقادير الدوائية. هي معبة ضمن لوبيحة ذات غطاء ألومنيوم يمكن إزالته. تحتوي اللوبيحة كيس ماص للرطوبة، لتقليل الرطوبة في العلبة.
- المادة الفعالة هي على شكل مسحوق أبيض ضمن شريط لوبيحة داخل المنشقة.
تحتوي كل منشقة على 7 أو 30 مقدار دوائي.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز وعنوانه: چلاكسوسミٹكلайн (إسرائيل) م.ض، شارع بازل ٢٥، بيتح تكفا.
- اسم المنتج وعنوانه: چلاكسو أوبيريشنس UK م.ض، (چلاكسو ويلكام أوبيريشنس)، وير، إنكلترا.
أقرت وزارة الصحة بصيغة هذه النشرة ومحتوها فحص ورخص من قبلها بتاريخ تموز 2017، وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ كانون الثاني 2019.


رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 153-34134
من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الإستعمال مرحلة تلو الأخرى

ما هي منشقة الـ إيلبيتا؟

في المرة الأولى التي تستعمل فيها منشقة الـ إينكروز إيلبيتا أنت لست بحاجة لفحص فيما إذا كانت المنشقة تعمل كما ينبغي؛ فهي تحتوي على مقايير دوائية معايرة مسبقاً وهي جاهزة للإستعمال الفوري.

تحتوي علبة منشقة الـ إينكروز إيلبيتا الخاصة بك على:



المنشقة معبأة ضمن لوحة، لا تفتح اللوحة إلى أن تكون مستعداً لبدء إستعمال المنشقة الجديدة الخاصة بك. عندما تكون مستعداً لإستعمال المنشقة، يجب تقشير غطاء الألومنيوم إلى الخلف لفتح اللوحة. تحتوي اللوحة على كيس ماص للرطوبة، لتقليل الرطوبة. إرم هذا الكيس – لا يجوز فتحه، أكله أو إستنشاقه.



عندما تخرج المنشقة من اللوحة، ستكون في وضع «مغلق». لا تفتحها إلى أن تكون جاهزاً لاستنشاق مقدار دوائي. عند فتح اللوحة، دون على ظهر الملصقة الخلفية للمنشقة والعلبة، في المكان المخصص لذلك، التاريخ الأخير لاستعمال المنشقة. التاريخ الأخير للإستعمال هو 6 أسابيع من التاريخ الذي فتحت فيه اللوحة. بعد هذا التاريخ، لا يجوز إستعمال المنشقة بعد. بالإمكان رمي اللوحة بعد الفتح للمرة الأولى.


إن تعليمات إستعمال منشقة الـ إيليبتا المفصلة لاحقاً يمكن أن تستعمل من أجل المنشقة التي تحتوي على 30 مقداراً دوائياً (التي تكفي لـ 30 يوماً من العلاج) أو 7 مقادير دوائية (التي تكفي لـ 7 أيام علاجية).

1) إقرأ هذه المعلومات قبل أن تبدأ

إذا كنت تقوم بفتح وإغلاق الغطاء من دون إستنشاق الدواء، فأنك ست فقد المقدار الدوائي.

المقدار الدوائي المفقود سيحفظ داخل المنشقة بشكل آمن، ولكنه لم يعد متيسراً للإستعمال.

من غير الممكن إستعمال مقدار دوائي زائد أو مقدار دوائي مضاعف بالخطأ بنشقة واحدة.



2) قم بتجهيز مقدار دوائي

انتظر بفتح الغطاء إلى أن تكون جاهزاً لاستنشاق مقدارك الدوائي.
لا تقم بغض المنشقة.

- قم بزلق الغطاء باتجاه الأسفل حتى سماع "طقه".
- دواوك الآن جاهز للإستنشاق.
- عدد المقادير الدوائية يعد تنازلياً بـ 1 لتأكيد هذا العمل.



- إذا لم يقم عداد المقadir الدوائية بالعد التنازلي أثناء سماعك "طقة"، فالمنشقة لم تحرر دواء.
راجع الصيدلي الخاص بك للإستشارة.

(3) إستنشق دواعك


- أثناء مسك المنشقة بعيداً عن فمك، قم بالزفير إلى الخارج قدر إستطاعتك.
لا تزفر لداخل المنشقة.
- ضع الفوهة بين شفتيك وأطبق شفتيك بشدة من حولها.
لا تغلق فتحة الهواء بأصابعك.



- قم بإستنشاق نشقة واحدة طويلة، عميقه ومتجانسة إلى الداخل. احبس هذا النفس لزمن طويل قدر الإمكان (على الأقل 3 - 4 ثوان).
- أخرج المنشقة من فمك.
- أزفر إلى الخارج ببطء وبلطف.

من الجائز ألا تستطيع الشعور بطعم أو الشعور بالدواء، حتى ولو كنت تستعمل المنشقة بشكل صحيح.
إذا كنت ترغب بتنظيف الفوهة، استعمل منديل ورقي جاف، قبل أن تغلق الغطاء.

(4)أغلق المنشقة



- قم بزلق الغطاء بإتجاه الأعلى ما أمكن، وذلك لتغطية الفوهة.
العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
© 2020 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.