

**تيكوفاك™ 0.5 مل، معلق للحقن**

يحتوي كل مقدار دوائي (0.5 مل) على:

2.4 ميكروغرام لقاح مفعول للفيروس Encephalitis

2.4 micrograms of inactivated Tick-Borne Encephalitis Virus

قائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر

تظهر في الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

**(1) لأى غرض مخصص الدواء؟**

تيكوفاك™ 0.5 مل عبارة عن لقاح فعال مخصص لمنع مرض

ناجم عن الفيروس Tick-Borne Encephalitis.

مخصص ل Maherقين من عمر 16 سنة وما فوق وللكلاب.

يؤدي اللقاح إلى أن ينتج الجسم أضداد ضد الفيروس، هو لا يحمي من الفيروسات والجراثيم الأخرى (بعضها ينتقل أيضاً

بواسطة لغذاء القراد) التي يمكن أن تسبب لأعراض مشابهة.

الفصيلة العلاجية: لقاح لإلتهاب الدماغ

**(2) قبل إستعمال الدواء****☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

☒ كنت أنت حساساً (اليرجي) أو طفل الماء الفعالة أو لك واحد من المركبات الإلخافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6). مثلاً، حدث لديك أو لدى طفل طفح، إنفصال للوجه أو الحنجرة، صعوبات في التنفس، إزرقاق اللسان أو الشفتين، ضغط دم منخفض وإنيار. يجب الإنبهار للحساسية المتقاطعة مع الأمينوچيليكوزيدات عدا نيوميسين وجنتاميسين.

☒ حدث لديك أو لدى طفل رد فعل تحسسي خطير بعد تناول البيض أو الدجاج.

☒ يوجد لديك أو لدى طفل مرض حاد متوسط أو شديد (مع أو بدون سخونة). يجب تأجيل تلقي اللقاح.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء****☒ قبل العلاج بـ تيكوفاك™، إحك للطبيب إذا:**

• توجد لديك أو لدى طفل مشاكل نزفية أو ميل لحدوث أزمة دموية

• توجد لديك أو لدى طفل مرض مناعي ذاتي (مثل إلتهاب المفاصل الروماتيزمي أو التصلب المتعدد)

• يوجد لديك أو لدى طفل جهاز مناعي ضعيف (أى أنه أنت أو طفل لا تتصديان للتلوثات بشكل جيد)

• كنت أنت أو طفل لا تتجانس الأضداد بشكل جيد

• كنت أنت أو طفل تستعملان أدوية للسرطان

• كنت أنت أو طفل تستعملان أدوية تسمى ستيروئيدات (تخفف من الإلتهابات)

• يوجد لديك أو لدى طفل أي مرض دماغي أو إضطرابات

• يوجد لديك أو لدى طفل إضطراب عصبي أو إلتهابات إخلاقية

• إذا إنطبقت عليك أو على طفلك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، من الجائز ألا يكون اللقاح مناسب لكما. بدلاً من ذلك من الجائز أن يقرر الطبيب إعطاء اللقاح لك أو لطفلك. من الجائز أن يطلب الطبيب إجراء فحوص دم للتأكد من أن اللقاح قد عمل.

**☒ الأطفال والمرأهقون**

☒ لا يجوز إعطاء هذا اللقاح لأطفال دون عمر 16 سنة. لهذه الفتاة العمرية يجب إعطاء لقاح تيكوفاك™ جونيور الخاص للأطفال.

**☒ التفاعلات بين الأدوية**

☒ إذا كنت أنت أو طفلك تستعملان، أو إذا إستعملتما مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات

الغذائيه، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

إذا تلقيت أنت أو طفالك مؤخرًا لقاها آخر، يقرر طبيبك في أي منطقة ومتى يجب إعطاء اللقاح تيكوفاك™ من الجائز ألا يوفر تيكوفاك™ الحماية الكافية وذلك إذا كنت أنت أو طفالك تتلقيان علاجاً مثبطاً للجهاز المناعي.

إحك للطبيب إذا مرضت أنت أو طفالك أو تلقيتما لقاها ضد الحمى الصفراء، إلتهاب الدماغ الياباني أو حمى الضنك. ذلك لأنه من الجائز أن لديك أو لدى طفالك أضداد في الجسم التي يمكن أن تتفاعل مع الفيروس Tick-Borne Encephalitis الذي يستعمل في الإختبارات لقياس مستوى الأضداد في جسمك. يمكن أن تطيء هذه الإختبارات تنتائج خاطئة.

**☒ الحمل والإرضاع**

إذا كنت أنت أو ابنته في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدان بأنه من الجائز أنك أنت أو طفالك في فترة الحمل أو تخطيطان للحمل، فعليكما التوجه للطبيب أو للصيدلي لتلقي إستشارة قبل تلقي اللقاح. يناقشك طبيبك أو ينماقش طفالك حول المخاطر المحتملة وحول الفوائد إن تأثير تيكوفاك™ خلال فترة الحمل أو الرضاعة غير معروف. لكن، من الجائز أن يعطي اللقاح مع ذلك إن كانت الخطورة كبيرة لحدوث تلوث وذلك بعد دراسة الفائدة مقابل الخطورة.

**☒ السياقة وإستعمال الماكولات**

من غير المتوقع أن يؤثر اللقاح على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكولات. لكن، من الجائز أن تحدث لديك أو لدى طفالك مشاكل في الرؤية أو أن تشعرا بدوار.

**☒ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي المستحضر على پوتاسيوم وصوديوم بنسب أقل من 1 ميليمول للمقدار الدوائي، أي أنه يعتبر خال من البوتاسيوم والصوديوم.

**☒ (3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة إستعمال المستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. يعطي هذا اللقاح عادة بالحقن في العضل في الجزء العلوي من الذراع. لا يجوز إعطاء اللقاح بالحقن في الأوعية الدموية. في حالات إستثنائية فقط (إذا وجد لديك أو لدى طفالك مشاكل نزفية أو إذا كنتما تتلقيان أدوية مضادة للتختثر لتمثيع الدم) بالإمكان إعطاء اللقاح بالحقن تحت الجلد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا إستعملت بالخطأً مقدارًا دوائياً أكبر.

من المستبعد جداً تلقي مقدارًا دوائياً مفرطاً لأن الحقن يعطى بواسطة محقنة جاهزة للإستعمال التي تحتوي على مقدار دوائي منفرد.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

**☒ (4) الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال تيكوفاك™ قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

بال مشابه لكافية اللقايات، يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي خطير. رد الفعل هنا هو نادر جداً، لكن يتطلب الأمر علاجاً طيباً فوريًا وإشرافاً طبياً. أعراض لرد فعل تحسسي خطير تشمل: إنفصال الشفتين، الفم، الحنجرة (الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في البلع أو في التنفس)

• طفح وإنفصال في البدن، الرجلين والكاحلين

• فقدان الوعي جراء إنخفاض ضغط الدم.

تحدث هذه العلامات والأعراض عادة سريعاً جداً بعد الحقن، عندما لا يزال الشخص في العيادة. إذا حدثت هذه الأعراض بعد ترك المكان الذي أعطيت فيه الحقنة، يجب التوجه حالاً للطبيب.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):

• ألم في منطقة الحقن

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة.  
يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.  
يجب التخزين في البراد 2-8 درجات مئوية، لا يجوز التجميد.  
يجب حفظ المحقنة في العلبة الخارجية للحماية من الضوء.  
لا يجوز إستعمال اللقاح إذا لاحظت وجود جسيمات غريبة أو تسرب.

## (6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Sodium chloride, Human serum albumin, Aluminium hydroxide (hydrated), Disodium phosphate-dihydrate, Potassium dihydrogenphosphate, Sucrose, Formaldehyde, Protamine sulfate, Neomycin and gentamicin, Water for injection

### ● كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

يسوق تيكوڤاك™ كمعلق 0.5 مل (للحقن ضمن محقنة جاهزة للإستعمال). تحتوي العلبة على 1، 10، 20 أو 100 محقنة جاهزة للإستعمال مسبقاً. من الجائز أن لا تسوق كافة أحجام العلب. من الجائز أن تحتوي العلبة على إبرة. الإبر معقمة ومخصصة للإستعمال لمرة واحدة.

كل محقنة جاهزة مسبقاً معأبة ضمن لوحة. إن الفتحة في عبوة اللوحة هي مقصودة وتسمح بموازنة الرطوبة خلال فترة ترك اللقاح ليبلغ درجة حرارة الغرفة. يجب فتح اللوحة (بليستر) عن طريق نزع الغطاء من أجل إخراج المحقنة. لا يجوز الضغط على المحقنة من خلال اللوحة.

بعد الخلط، يكون محلول بلون كريم فاتح وحلبي.

صاحب الإمكانيات وعنوانه: فايزر فارماسيتيكا إسرائيل. م.ض.، شارع شنكر 9، هرتسليا بيتوواح 46725.

### إسم المنتج وعنوانه:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص ورخص في تاريخ: آب 2019

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 162-33-35413

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

## المعلومات التالية مخصصة فقط لأفراد المهن الطبية والطاقم المعالج:

يجب أن يبلغ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الإعطاء. يجب الشخص جيداً قبل الإعطاء وذلك لخلط معلق اللقاح بشكل جيد. بعد الخزن، يجب أن يكون معلق تيكوڤاك™ 0.5 مل عبارة عن معلق متجانس لامع بلون كريمياً فاتح. قبل الإعطاء، يجب أن يتم فحص اللقاح بصرياً لوجود أية جسيمات مادة غريبة و/أو حدوث تغيرات بمظهره الفيزيائي. في حال ملاحظة أي منها، يجب رمي اللقاح.

بعد إزالة غطاء المحقنة، يجب وصل الإبرة حالاً ونزع وaci الإبرة قبل الإعطاء. لحظة وصل الإبرة يجب أن يُعطى اللقاح على الفور.

في حالات استثنائية للإعطاء تحت الجلد، يجب إستعمال إبرة مناسبة.

يجب رمي المستحضر الذي لم يستعمل أو النفايات بموجب التعليمات المحلية.

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص):

- صداع
- غثيان
- آلام في العضلات والمفاصل
- الشعور بإرهاق أو الشعور بسوء

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص):

- إنتفاخ الغدد الليمفاوية
- تقيؤات
- سخونة

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص):

- رد فعل تحسسي
- ميل للنوم
- داء السفر

● إسهال

● ألم في البطن

● إحمرار، تصلب الأنسجة، إنتفاخ، حكة، وخز وسخونة في منطقة الحقن

أعراض جانبية إضافية ذات شيوع نادر والتي بلغ عنها جراء متابعة ومراقبة المستحضر بعد تسويقه:

### ● إلحاقي

● إثارة أمراض مناعية ذاتية مثل التصلب المتعدد

● ردود فعل تحسسية

● إضطرابات في الأعصاب مثل التهاب الدماغ والجبل الشوكي، التهاب في الجبل الشوكي

● مرض يشمل حدوث ضعف عضلي، شعور غير اعتيادي، وخز في الذراعين، في الرجلين، وفي القسم العلوي من الجسم (متلازمة غيلان - باريه)

● التهاب الدماغ، إحتلالات، التهاب السحايا الدماغية

● علامات لتهيج السحايا الدماغية مثل ألم وتصلب الجزء الخلفي من الرقبة

● أعراض عصبية مثل شلل في الوجه، شلل، التهاب في الأعصاب، شعور غير اعتيادي أو متذبذبي مثل وخز أو خدر، نزف أو ألم نابض على طول عصب واحد أو أكثر، التهاب العصب البصري

● الشعور بدوار

● إضطرابات في الرؤية، فرط حساسية للضوء، ألم في العينين

● طنين في الأذنين

● تسارع ضربات القلب

● ضيق تنفس

● ردود فعل جلدية، (تهيج و/أو حكة في الجلد)، التهاب الجلد، إحمرار الجلد، تعرق زائد، التهاب الجلد

● ألم في الظهر، إنتفاخ في المفاصل، ألم في الرقبة، تصلب عضلي هيكلية وتصلب الرقبة، ألم في البدين والرجلين

● قشعريرة، مرض يشبه الإنفلونزا، ضعف عام، وذمة، مشي غير ثابت، تراكم السوائل تحت الجلد

● ألم في المفاصل في مكان الحقن، كتل وإلتهاب في مكان الحقن.

في دراسة صغيرة للمقارنة بخصوص رد الفعل المناعي بعد إعطاء تيكوڤاك™ بالحقن في العضل والحقن تحت الجلد لدى الكبار الأصحاء، فإن الإعطاء تحت الجلد سبب مزيداً من ردود الفعل الموضعية في منطقة الحقن (متلازمة إحمرار، إنتفاخ، حكة وألم) خاصة لدى النساء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

## (5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسخيم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روّيّة الأطفال و/أو الرضع، وذلك لفقدان إصابتهم بالتسخيم.