

تيكوفاك™ جونيور 0.25 مل، معلق للحقن Pfizer

يحتوي كل مقدار دوائي (0.25 مل) على:

1.2 ميكروغرام لقاح معطل للقيروس Encephalitis

1.2 micrograms of inactivated Tick-Borne Encephalitis Virus

قائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر تظهر في الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

تيكوفاك™ جونيور 0.25 مل عبارة عن لقاح فعال مخصص لمنع مرض ناجم عن القيروس Encephalitis

اللهاج مخصص للأطفال بعمر 1-15 سنة.

يؤدي اللهاج إلى أن ينتج الجسم أضداد ضد القيروس. هو لا يحمي من القيروسات والجراثيم الأخرى (بعضها ينتقل أيضاً بواسطة لدغات القراد) التي يمكن أن تسبب لأعراض مشابهة.

الفصيلة العلاجية: لقاح لإلتهاب الدماغ

(2) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

☒ كان طفلك حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6). مثلاً، حدث لدى طفلك طفح، إنفصال الوجه أو الحنجرة، صعوبات في التنفس، إزراق اللسان أو الشفتين، ضغط دم منخفض وإنهار. يجب الإنبهار للحساسية المقاومة مع الأمينوكروزيدات عدا نيوميسين وجنتاميسين.

☒ حدث لدى طفلك رد فعل تحسسي خطير بعد تناول البيض أو الدجاج.

☒ وجد لدى طفلك مرض حاد متوسط أو شديد (مع أو بدون سخونة). يجب تأجيل تلقي اللهاج.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

☒ قبل العلاج بـ تيكوفاك™ جونيور، إحك للطبيب إذا:

- وجد لدى طفلك مشاكل نزفية أو ميل لحدوث نزف دموية
- وجد لدى طفلك مرض مناعي ذاتي (مثل إلتهاب المفاصل الروماتيزمي أو التصلب المتعدد)

- وجد لدى طفلك جهاز مناعي ضعيف (أي أن طفلك لا يتصرف للتلوثات بشكل جيد)

- كان طفلك لا ينتج الأضداد بشكل جيد

- كان طفلك يستعمل أدوية للسرطان

- كان طفلك يستعمل أدوية تسمى ستيروئيدات (تحفف من الإلتهابات)

- وجد لدى طفل أي مرض دماغي

- وجد لدى طفلك إضطراب عصبي أو إضطرابات إختلاجية إذا إنقطقت على طفلك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فمن الجائز لا يكون اللهاج مناسب له. بدلاً من ذلك من الجائز أن يقرر الطبيب إعطاء اللهاج لطفلك. من الجائز أن يطلب الطبيب إجراء فحوص دم للتأكد من أن اللهاج قد عمل.

☒ التفاعلات بين الأدوية

إذا كان طفلك يستعمل، أو إذا إستعمل مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

إذا تلقى طفلك مؤخرًا لقاحاً آخر فيقرر طبيبه في أي منطقة ومتى يجب إعطاء اللهاج تيكوفاك™ جونيور.

من الجائز لا يوفر تيكوفاك™ جونيور الحماية الكاملة وذلك إذا كان طفلك يتلقى علاجاً مثبطاً للجهاز المناعي.

إحك للطبيب إذا مرض طفلك أو تلقى لقاح ضد الحمى الصفراء، إلتهاب الدماغ البابي أو حمى الضنك. ذلك لأنه من الجائز أن لدى طفلك أضداد في جسمه التي يمكن أن تتفاعل مع القيروس Tick-Borne Encephalitis في الإختبارات لقياس مستوى الأضداد في جسمه. يمكن أن تعطى هذه الإختبارات نتائج خاطئة.

☒ الحمل والإرضاع

إذا كانت إبنته في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقد بأنها قد تكون في فترة الحمل أو تخطط للحمل فعليكما التوجه للطبيب أو للصيدلي لتلقي إشتارة قبل تلقي اللهاج. يناقشكما الطبيب حول المخاطر المحتملة وحول الفوائد. إن تأثير تيكوفاك™ جونيور خلال فترة الحمل أو الرضاعة غير معروف. لكن، من الجائز أن يعطي اللهاج مع ذلك إن كانت الخطورة كبيرة لحدوث تلوث.

☒ السياقة وإستعمال الماكنات

من غير المتوقع أن يؤثر اللهاج على القدرة على تشغيل الماكنات، اللعب في الشارع أو ركوب الدراجات. لكن، من الجائز أن تحدث لدى طفلك مشاكل في الرؤية أو أن يشعر بدوار.

☒ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوى المستحضر على بوتااسيوم وصوديوم بنسب أقل من 1 ميليمول للمقدار الدوائي، أي أنه يعتبر خال من البوتاسيوم والصوديوم.

☒ (3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة إستعمال المستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز إعطاء هذا اللهاج لأشخاص من عمر 16 سنة وما فوق. بخصوص هذه الفئة العمرية يتتوفر لقاح تيكوفاك™ 0.5 مل. يُعطى هذا اللهاج عادة بالحقن بالعنق في الجزء العلوي من الذراع. لأطفال دون عمر 18 شهراً بالإمكان إعطاء اللهاج بالحقن في الفخذ. لا يجوز إعطاء اللهاج بالحقن في الأوعية الدموية. في حالات إستثنائية فقط (إذا وجدت لدى طفلك مشاكل نزفية أو إذا كان يتلقى أدوية مضادة للتخثر لتنبيع الدم) بالإمكان إعطاء اللهاج بالحقن تحت الجلد.

☒ لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا إستعملت بالخطأً مقداراً دوائياً أكبر من المستبعد جداً تلقي مقداراً دوائياً مفرطاً لأن الحقن يعطي بواسطة محنة جاهزة للإستعمال التي تحتوي على مقدار دوائي منفرد.

يجب الموازنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بطفلك.

☒ (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تيكوفاك™ جونيور قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن يعاني طفلك أي منها.

بالتشابه لكافية اللقايات، يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي خطير. رد الفعل هذا هو نادر جداً، لكن يتطلب الأمر علاجاً طبياً فوريًا وإشرافاً طبياً. أعراض رد فعل تحسسي خطير تشمل:

- إنفصال الشفتين، الفم، الحنجرة (الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في البلع أو في التنفس)

• طفح وإنفصال في اليدين، الرجلين والكاحلين

• فقدان الوعي جراء إنخفاض ضغط الدم.

تحدث هذه العلامات والأعراض عادة سريعاً جداً بعد الحقن، عندما لا يزال الشخص في العيادة. إذا حدثت هذه الأعراض لدى طفلك بعد مغادرة المكان الذي فيه أعطيت له الحقنة، يجب التوجه حالاً للطبيب.

يمكن أن تحدث سخونة مرتفعة لدى الأطفال. لدى الأطفال الصغار (عمر 1-2 سنوات) لـ 1 من كل 3 يوجد سخونة أياً كانت بعد الحقنة الأولى. لدى الأطفال بعمر 3-15 سنة يوجد سخونة لدى أقل من 1 من كل 10. عادة تستمر السخونة فقط 1-2 أيام. تحدث سخونة بشيوع منخفض أكثر بعد الحقنة الثانية، الثالثة أو الحقنة الداعمة. إذا دعت الحاجة، بإمكان طبيب طفلك أن يوصي بعلاج لمنع أو لخفض السخونة.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة.
يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
يجب التخزين في البراد (2-8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد.
يجب حفظ المحقنة في العلبة الخارجية للحماية من الضوء.
لا يجوز إستعمال اللقاح إذا لاحظت وجود جسيمات غريبة أو تسرب.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Sodium chloride, Human serum albumin, Aluminium hydroxide (hydrated), Disodium phosphate-dihydrate, Potassium dihydrogenphosphate, Sucrose, Formaldehyde, Protamine sulfate, Neomycin and gentamicin, Water for injection

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

يسوق تيكوفاك™ جونيور كمعلق 0.25 (مل) للحقن ضمن محقنة جاهزة للاستعمال. تحتوي العلبة على 1، 10، 20 أو 100 محقنة جاهزة للاستعمال مسبقاً. من الجائز أن تستهلك كافة أحجام العلب. من الجائز أن تحتوي العلبة على إبرة. الإبر معقمة ومخصصة للاستعمال لمرة واحدة.
كل محقنة جاهزة مسبقاً معبأة ضمن لوحة. إن الفتحة في عبوة اللوحة هي مقصودة وتسمح بموازنة الرطوبة خلال فترة ترك اللقاح ليبلغ درجة حرارة الغرفة. يجب فتح اللوحة (بليستر) عن طريق نزع الغطاء من أجل إخراج المحقنة.
لا يجوز الضغط على المحقنة من خلال اللوحة.
بعد الخلط، يكون محلول بلون كريم فاتح وحليبي.

صاحب الإمتياز وعنوانه: فايزر فارماسيتكا إسرائيل. م.ض.
شارع شنكر 9، هرتسليا بيتوواح 46725.

إسم المنتج وعنوانه:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص ورُخص في تاريخ: آب 2019

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 35412-32-162.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المعلومات التالية مخصصة فقط لأفراد المهن الطبية والطاقم المعالج:

يجب أن يبلغ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الإعطاء. يجب الخض جيداً قبل الإعطاء وذلك لخلط معلق اللقاح بشكل جيد.
بعد الخض، يجب أن يكون تيكوفاك™ جونيور 0.25 مل عبارة عن معلق متجانس لامع بلون كريماً فاتح. قبل الإعطاء، يجب أن يتم فحص اللقاح بصرياً لوجود أي جسيمات مادة غريبة و/أو حدوث تغيرات بمظهره الفيزيائي. في حال ملاحظة أي منها، يجب رمي اللقاح.
بعد إزالة غطاء المحقنة يجب وصل الإبرة حالاً ونزع وaci الإبرة قبل الإعطاء. لحظة وصل الإبرة يجب أن يُعطي اللقاح على الفور. في حالات إستثنائية للإعطاء تحت الجلد، يجب إستعمال إبرة مناسبة.
يجب رمي المستحضر الذي لم يستعمل أو النفايات بموجب التعليمات المحلية.

أعراض جانبية إضافية:
أعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص):
• ألم في منطقة الحقن

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص):
• صداع
• إنتفاخ، تصلب وإحمرار في منطقة الحقن
• غثيان أو تقيؤات، قلة الشهية للطعام
• الشعور بإرهاق أو الشعور بسوء
• قلة راحة ونوم غير جيد (لدى الأطفال الصغار)
• ألم في العضلات
• سخونة

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص):
• إنتفاخ الغدد الليمفاوية

• ألم في البطن
• ألم في المفاصل
• قشعريرة

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص):
• وخز في منطقة الحقن

• شعور غير اعتيادي وقلة الشعور مثل وخز أو خدر على إمتداد عدة أعصاب
• الشعور بدوران

• فيرتيفو (دوخة دورانية)
• إسهال
• مشاكل هضمية
• شرى

أعراض جانبية إضافية ذات شيوع نادر والتي بلغ عنها جراء متابعة ومراقبة المستحضر بعد تسويقه:

• رد فعل تحسسي

• إلتهاب الدماغ، علامات لتهيج السحايا الدماغية مثل تصلب الجزء الخلفي من الرقبة

• أمراض عصبية مثل شلل في الوجه، شلل، إلتهاب الأعصاب في اليدين، في الرجلين، وفي الجزء العلوي من الجسم (متلازمة غيلان - باريه)
• إضطرابات في الرؤية، فرط حساسية للضوء، ألم في العينين

• طنين في الأذنين

• ضيق في التنفس

• ردود فعل جلدية، (تهيج و/أو حكة في الجلد)، إحمرار الجلد، تعرق زائد

• تصلب عضلات الهيكل العظمي والجزء الخلفي من الرقبة، ألم في الذراعين وفي الرجلين

• مرض يشبه الإنفلونزا، ضعف، إنتفاخ الجلد، المشي بشكل غير ثابت

• إختلالات مع أو بدون سخونة

في دراسة صغيرة للمقارنة بخصوص رد الفعل المناعي بعد إعطاء تيكوفاك™ بالحقن في العضل والحقن تحت الجلد لدى الكبار الأصحاء، فإن الإعطاء تحت الجلد سبب مزيداً من ردود الفعل الموضعية في منطقة الحقن (مثلاً إحمرار، إنتفاخ، حكة وألم) خاصة لدى النساء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما يعاني طفلك من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبي للأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.