

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה:

דקוקס וטרינרי

קדם תערובת מגורענת לבעלי-חיים

2. הרכב:

כל ק"ג מוצר מכיל:

דקוקוינט בריכוז 60 גרם

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף 12 – "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ופטמים.
- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם.
- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוסיס.

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטאט מקבוצת קוינולינים.

4. התוויות נגד:

אין להשתמש בו זמנית עם תכשיר אנטי-קוקסידיאלי נוסף.

5. תופעות לוואי:

לא ידועות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה:

עגלים, טלאים, עזים ופטמים.

7. אופן השימוש ומיבון:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ומניעת קוקסידיוזיס בטלאים:

יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 1 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו.

- לטיפול בקוקסידיוזיס בפטמים:
לתוך כל טונה מספוא, יש להוסיף 0.50 ק"ג דקוקס 6% וטרינרי (לקבלת 30ppm decoquinat). משך המתן יקבע ע"י רופא וטרינר.

- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם:
יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 0.5 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – לא פחות מ 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו. במקרים חריפים, ניתן להכפיל את המינון.

- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוסיס:
לשימוש בכבשה בהריון.
יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 2.0 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – טיפול יומי למשך 14 שבועות אחרונים של ההריון.

8. זמן המתנה:

- זמן המתנה לשחיטת בשר עבור בקר, צאן - יום אחד (1) לאחר הטיפול האחרון.
- זמן המתנה לשחיטת בשר פטמים –אפס ימים (0) לאחר הטיפול האחרון.
- חלב: התכשיר אינו מיועד לשימוש בחולבות.

9. אזהרות:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחית המטרה

בטיפול של טלאים דרך כבשת האם, יש בנוסף לתת טיפול אורלי ישירות לטלה.

אזהרות נוספות

לא לשימוש בפרות חולבות.

חוסר תאימות (incompatibility)

אין לערבב הטיפול בתכשיר זה יחד עם טיפולים אנטי-קוקסידיאליים נוספים.

10. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. הרחק מאנשים לא מוסמכים.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

- תנאי אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל- 25°C.
- חיי מדף לאחר שיחזור: 3 חודשים לאחר ערבוב עם מזון.
- לשימוש וטרינרי בלבד.

11. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

12. מידע נוסף:

- נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם:
Colloidal silica, Soya-bean oil, Wheat middlings
- אריזה: שק המכיל 10 ק"ג
- היצרן: Codbeck Blenders, England.
- בעל הרישום: א. בי-זי ייעוץ ושיווק בע"מ, גאליה 76885.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך ינואר 2016 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך מרץ 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 082 95 92333.