



يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

### **فيسيكير 5 ملغ أقراص مطبلة**

### **فيسيكير 10 ملغ أقراص مطبلة**

يحتوي كل قرص مطبل من فيسيكير 5 ملغ على:

Solifenacin succinate 5 mg سوليفيناسيون سوكبينات

يحتوي كل قرص مطبل من فيسيكير 10 ملغ على:

Solifenacin succinate 10 mg سوليفيناسيون سوكبينات

لعلية المادة غير الفعالة ومسيلات الملاحة في المستحضر - انظر البند 6 والبند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

أقرأ النشرة بأامان حتى تهابها قبل استعمالك للدواء، تهابي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن

الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم

حالتهم الطبية مشابهة.

لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والمرأهقين الذين سنهم دون الـ 18.

### **1. لأى غرض مخصص هذا الدواء؟**

الدواء مخصوص لعلاج شلل البول وأو حالات ارتقان وتهاب التبول وإلحاح البول لدى المرضى الذين

يعانون من فرط نشاط المثانة البولية.

**الفصيلة العلاجية:** مضادات الكوليدين

### **2. قبل استعمال الدواء:**

#### **لا بجوز استعمال الدواء:**

إذا كنت حساساً (أرجلاً) لسوليفيناسيون أو لأيٍ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.

في حالة حصر البول، الإضطرابات الخثيرة في الجهاز الهضمي (تضخم القولون السُّمْيَّ)، الورن العضلي الوبيل (ضعف شديد في العضلات)، الضغط داخل العين، المصحوب بانخفاض الرؤية (الزرق).

لدى مرضى الكلى الذين يخضعون للعلاج باليال، والمرضى الذين يعانون من الفشل الكبدي الخطير.

لدى المرضى الذين يعانون من مرض كلوي خطير أو مرض كبدى متسلط ويتلقون علاجاً متزامناً بدواء آخر يسبب اختفاصاً في وترة تخلص الجسم من فيسيكير، مثل كيتوكونازول.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

**I. قبل العلاج بفيسيكير، أخبر الطبيب إذا:**

كانت لديك مشكلة في التبول (النسداد جزئي)، كنت تعاني من امساك، كنت معرضاً لخطر تباطؤ فعالية

الجهاز الهضمي (حركة المعدة والأمعاء)، كنت تعاني من مرض كلوي حاد، كنت تعاني من مرض كبدى متسلط، كنت تعاني من فتق جابي أو من حرقة المعدة، كنت تعاني من اضطراب في الجهاز

العصبي (اعتلال عصبي متسلط).

**II. الأولاد والمرأهقون:**

استعمال فيسيكير لدى الأولاد والمرأهقين الذين سنهم دون الـ 18 غير مدرج في دواعي استعماله.

### **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر يوماً وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي: قرص واحد من 5 أو 10 ملغ في اليوم. سيمت تحديد الجرعة الدوائية بشكل فردى من قبل الطبيب.

يُفضل تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الدواء كاملاً مع الماء.

البرىں / الشطر / المصبع: يمنع هرس/ شطرو / مضخة الفرسن بسبب طلاء الفرسن.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوخه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عبوة الدواء.

الأعراض الجانبية لفوتير الجرعة الدوائية: صداع، جفاف الفم، دوران، تشوش الرؤية، نعاس، هلوسة، فرط الاستثاره، احتقاحات، صعوبات في التنفس، دقات قلبية متسرعة، توسيع الحدة، حصر البول.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواطنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المنشورة للتخلص عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متداول أبيدي الأولاد / أو الأطفال الرضيع ومحال رؤيهم، وذلك سترئن التسمم. لا تسبّب التقوّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.  
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبءة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### ظروف التخزين:

خرقه في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

## 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:  
يحتوي فيسيكير 5 ملغم على:

Lactose monohydrate, Maize starch, Hypromellose, Magnesium stearate, Talc, Macrogol 8000, Titanium dioxide (E171), Yellow ferric oxide (E172).

يحتوي فيسيكير 10 ملغم على:

Lactose monohydrate, Maize starch, Hypromellose, Magnesium stearate, Talc, Macrogol 8000, Titanium dioxide (E171), Red ferric oxide (E172).

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبءة:

قرص فيسيكير 5 ملغم المطلي مستدير باللون الأصفر الفاتح، مطبوع على أحد جانبيه "150" وشعار المصنع على الجانب الآخر . تحتوي كل عبوة على شرائط حويصلات تتشعّب لـ 10 أقراص. عدد الأقراص في العبءة: 10 أو 30 أو 50 أو 60 أو 90 أو 100. لا تُسوق جميع أحجام العبوات.  
قرص فيسيكير 10 ملغم المطلي مستدير باللون الوردي الفاتح، مطبوع على أحد جانبيه "151" وشعار المصنع على الجانب الآخر . تحتوي كل عبوة على شرائط حويصلات تتشعّب لـ 10 أقراص. عدد الأقراص في العبءة: 10 أو 30 أو 50 أو 60 أو 90 أو 100. لا تُسوق جميع أحجام العبوات.

صاحب الأمتياز / المستورد وعنوانه: ك. صن ط.م.ض، شارع هماراش 4، هود هشارون.

اسم الصنعت وعنوانه: أميتيلان فالاما اوروبا ب.م.ض، ليبن، هوندا.

حدّدت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحظهاها فحص وأقرّ من قبلها في تاريخ 03/2014، وقد تم تحدّيث محتوى هذه النشرة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في تاريخ 02/2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فيسيكير 5 ملغم 1356731279

فيسيكير 10 ملغم: 1356831280

من أجل البثسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكورة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.  
قد يؤدي إيقاف العلاج إلى ظهور أعراض فرط نشاط المثانة البوالية مرة أخرى أو تفاقمها.  
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة راجع الملصق وتتأكد من الجرعة في كل مرّة تتناول فيها الدواء.  
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية:

منذ كل دواء، قد يؤدي استعمال فيسيكير إلى شهادة أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعارى من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا:

ظهور رد فعل تحسسي جلدي يتجلّى كومبات تحت سطح الجلد مصحوبة بصعوبات في الملاكك التنسية - ظاهرة تسمى الوذمة الوراثية (Angioedema) .

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

أصبحت بنيوة تحسسية أو رد فعل جلدي خطير (مثلًا ظهور حويصلات وتشنج الجلد).  
أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

جفاف الفم

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:  
إمساك، تشقق الرؤية، غثيان، صعوبات في الهضم مثل شعور بامتلاء البطن، ألام في البطن، تجشؤات، حرقة المعدة وازدحام في البطن.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000:  
التهاب المسالك البوالية أو المثانة البوالية، تغص وانتفاخ، تغيرات في حالة النوم، جفاف/ تهيج العينين، الحجرة، الجلد أو الأنف، صعوبة في التنفس، حرقة المعدة، الجزء المريري، ونمة في الجزء السفلي من الرجل.

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10,000:  
انسداد الأمعاء، إمساك شديد، حصر البول، دوار، صداع، تقيّبات، حكة، فطح جلدي.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:  
هلوسة، ارتباك، فطح جلدي تحسسي.

أعراض جانبية انتشارها غير معروفة:  
• تغيرات في التوصيل الكهربائي في القلب (تغيرات في الـ ECG)، نظم قلبي غير منتظم، دقات قلبية

قوية، نبض سريع  
• اضطراب في الشفاعة، متغيرات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم قد تسبّب نظماً قلبياً غير سوري

• ضغط مرتفع داخل الميالين

• اضطراب في المسوت

• اضطراب في وظيفة الكبد

• ضعف العضلات

• اضطراب في وظائف الكلكتين

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التخلص من أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التخلص عن أعراض