

תאריך: פברואר 2020

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה

חברת טבע מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר

אייבו 2% לילדים תרחיף Iboo 2 % for Children Suspension

Contains: Ibuprofen 100 mg / 5 ml

עדכונים בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

For the reduction of fever and relief of mild to moderate pain.

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום):

2. לפני השימוש בתרופה
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול באייבו 2% לילדים ספר לרופא אם:

- אתה או ילדך סובלים או סבלתם מלחץ דם גבוה, בעיות לב או שבץ מוחי, כיוון שישנה עליה קטנה בסיכון לבעיות לב בעת שימוש באיבופרופן.
- אתה או ילדך סובלים מאבעבועות רוח (Varicella). מומלץ להימנע מהשימוש באייבו 2% לילדים במהלך פרק הזמן בו יש אבעבועות רוח.

נהיגה ושימוש במכונות:
לא צפויות השפעות על היכולת לנהוג ולהפעיל במכונות במינונים ובמשך הטיפול המומלצים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
תרופה זו מכילה 2.5 מ"ג סודיום בנזואט ב-5 מ"ל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם השתמשת או נתת לילדך מינון גבוה יותר

אם נטלת או ילדך נטל מנה גדולה יותר מהנדרש או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה תמיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר על מנת לקבל חוות דעת לגבי הסיכון ולהתייעץ בנוגע לפעולה שיש לנקוט. התסמינים עלולים לכלול בחילה, כאב בטן, הקאה (עלולה להיות כמות קטנה של דם), כאב ראש, צלצול באוזניים, בלבול ותנועת עיניים קופצניות.

במינונים גבוהים דווח על נמנום, כאבים בחזה, דפיקות לב חזקות, אובדן הכרה, עוויתות (בעיקר אצל ילדים), חולשה וסחרחורת, דם בשתן, תחושת קור בגוף ובעיות נשימה.

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את מתן התרופה לילדך ולספר לרופא במקרה של:

- חברות או דימום שאינם מוסברים, עייפות, הידבקות ביותר זיהומים מהרגיל כגון כיבים בפה, הצטננויות, כאב גרון, חום (אלו יכולים להיות סימנים של אנמיה או הפרעות דם אחרות).

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

<http://www.health.gov.il>, וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.