

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:
• מופעים סימנים של מין יתר כגון נגנום, כאב ראש ובקרה של ששלול המלולות בחום גבוה.

התרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון. בשינויים אלה אין מקום לדאגה.
אם הופעה תופעתן הוואי, אם אתה מטופעתת הולוי אוזנאה עלייה, עליך או ואיך אתה סובל מטופעתת לוואי שלא הזרקה עליון, עליה להתייחס עט הרופא.

ניתן לדוזו על תופעותן לוואי, לפחות עט רפואי תרופה" (www.health.gov.il) המפנה הבית של אלטר מרשר הריאות ל佗וטה לאוא, או עט' קסינה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. אין לאחסן את התרופה?
מנוע העולא רופאה זו ולרופה אחרת יש לשמור במקום סגור
מחוץ להשיש ידים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמן הרעלת.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מופרשת מהרופה.
אי להשתמש בתפקיד אחר תאריך התפופה (EXP) המופיע על
גב האריזה. תאריך התפופה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה הנומוכה מ- 25°C .

6. מידע נוספת:
טוף על החומר העשיל התרופה מכילה גם:
Calcium carbonate, Povidone K-25, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose 4910, Magnesium Stearate, Ponceau 4R, Macrogol 6000.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האրיזה:
אריזה המכילה, 30, 20, 15, 10, 7, 2, 1 מ"מ מצופות בעבודה, עגולות ומורמות משני צדדיים.
יתכן שלא כל דילוי האරיזות משוקקים.
שם הייצור ובעל הרישום הכרונוגרף: עצט תעשיית כימיות בע"מ,
רחוב הקדמה, 3, קריית מלאכי.

עלון זה מוארך 03/2020 יינו בפורמת שנקבע עט' מרשר
הריאות ותונכו ותואם לעלון תגשיר ומתקור שנדבר ואושר עט'
מרשר הריאות בתאריך: 01/2015.
מספר רשם תרופה בפקס המרכז הרפואי מרשר
הריאות: 1406531601.
לשם פשטות והקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף
זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

3. כיצד תשמש בתרופה?
על לבדוק האם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בזוגע למינן ואופן
הטיפול בתבשיר.
הmanın המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2 טבליות.
ילדים מתחת לגיל 12 שנים: יש להיעזר ברופא.
במידה והחמלן על די הרופא – ילדים מתחת לגיל 9 שנים: מומלץ
להשתמש בביוני X בלבד.

לפי הצורך ניתן לחזור למינן זה כל חצי שעה עד שעה, עד 8
פעמים בכל 24 שעות.
אין לעבור על המנה המומלצת.
צורת הנטלה: שבלוע את התרופה עם מים.
כטישה/חיציה/לעיפה:
אין ללעוף. הטבילה מיועדת לבליה.
אין לצחוץ את התבילה על מנת לטל כמות מופחתת.

עם זאת, על מנת להקל על הבליעה, ניתן במידת הצורך לכתחזק
לחצוץ את התבילה לשימוש מיידי. יש לבלוע את החלקים מיד
לאור הכטישה/חיציה.

אם נטלה בטעות מינן בגובה יותר: אם נטלה מנת יתר או אם
בטעות בעל-ליד מן הרופאה, פה מידי לרופא או לחדר מושך של בית
חולים והבא את הרופאה תרופה איתה. אל תגרום להקאה ללא
הוראה מופרשת מהרופה.
אם שכחת ליטול את התרופה: אם שכחת ליטול התרופה זו בזמן
המיועד, אין ליטול מנה כפולה. רק את המנה הבאה בזמן הרגע
והיעוך בוops.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול? במרקחה של שלושלים יש
להרבבות בשתיית משקאות ללא קפאין כדי להתגבר על אי-איבוד
נוונים.
אם ליטול תרופה בחושן בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן
נטול תרופה. הרוכב וشكפים אם גורק דקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ
ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל רופאה, השימוש **בביוני X** עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים. אם תיתבל למרקחה רשותית תופעת הלוואי.
יתכן ולא תסובול מכך מוחה.
יש להפסיק התסומים הבאים: חולשה, עיוותות, בעיות בנשימה,
מושעים התסומים הבאים: חולשה, עיוותות, בעיות בנשימה,
טישוטש ראייה, בלבול, צלצלים באוזניים או איבוד שמיעת, עצירות
חרומה.

2. לפני שימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הננסים אשר מכילה התרופה.
- אין להשתמש במקרים מסוימים בחום כדוגמת שפעת
אובבעות ורוח (חחשש לתסתומת רוי).
- הן אלרגי לסליצילטים (כולל אספירין), או אם הן נועל
תשיירים ארומטיים המכילים סליצילט. התרופה מכילה
סליצילט.
- אתה סובל מכיב קיבה (אולוקס), דימומים, צואה דמית
או שחרור.

אזורות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
• לפני התחלת טיפול **בביוני X** ספר לרופא אם:

- הן בהריון או מניקה.
- הן סובל או בבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה
(כגון אסטמה), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון קירשיס וכ'), שגדון, התיבשנות או
קיבה).
- אם יש לך חום.
- ולסיליצילטים.

• אין להשתמש בתרופה בילדים ובתבוגרים עד גיל 20 שבועיים
משמעות או בעקבות רוח או שיש להם גם שאיבדו הרבה
נוונים.

• אין להשתמש בתרופה בילדים ובתבוגרים עד גיל 9 שבועיים
משמעות או בעקבות רוח או שיש להם גם שאיבדו הרבה
נוונים.

• אין להשתמש בתרופה בילדים ובתבוגרים עד גיל 2 שבועיים
משמעות או בעקבות רוח או שיש להם גם שאיבדו הרבה
נוונים.

• אין להשתמש בתרופה בילדים ובתבוגרים עד גיל 6 שבועיים
משמעות או בעקבות רוח או שיש להם גם שאיבדו הרבה
נוונים.

• אין להשתמש בתרופה בילדים ובתבוגרים עד גיל 6 שבועיים
משמעות או בעקבות רוח או שיש להם גם שאיבדו הרבה
נוונים.

• אין להשתמש בתרופה בין תרופתיות:
אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחורהן, תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם וטסמי תחזון, ספר עליך קר לרופא או הרוקח אם אתה לוקחת:

במיוחד לשיעור המינון בעלון זה.
היעועץ ברוקח אם הן זקוק למיעד נסוף. עליך לפנות אל הרופא
באם סיכון המחלת (סימפטומים) מחייבים או אינם מסתירים
וחולים והבא את רופא יומיים.
אם אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או לתקופת מושכת
בלילו. יומיים. כמו כן יש להפסיק את הטיפול ולפנות מידי לרופא
לאור יומיים. אם השלישול מלאו בחום גבוה או אם החול צלצלים באוזניים או
איבוד שמיעת.

1. למה מייעצת התרופה?
התרופה מייעצת להקלה בבקרים של שלשול, בחילה, גידם, כאבי
בון עוויים, קלה קיבה וקשיש בעיכול.

למניעה שלשלול אצל מטילים.

תרופות לדלקת מפרקים (ארטראיטיס)
• אספירין וסליצילטים

• תרופות נגד שגדון כגון פרובנציד או סולפיניפריזין
טטרציקלינים

• תרופות לסתות מוסכט
• שימוש ברופאה ומצון:

נתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.
• שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
אין לשותות ינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם
התרופה.

• הרוון, הנקה ופוריות:
אם הן בהריון או מניקה, יש להיעז ברפוא לפני השימוש
בתרופה.

עלון לצרכן לפני תקונת הרוקחים (תקשיים) התשס"ג 1986
התרופה משווקת לא מרשם רפואי

ביטני X טבליות 262 מ"ג
כל טבלייה מכילה: ביומוט אסבלסיליצילט 262 מ"ג

לפירות מרכיבים נוספים בתרופה ראה סעיף 6 - מידע נוספים.
קרא בעינוי את תולון עד סוף בטרם תשמש בתרופה. עלון זה
מכיל מידע תומצתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה
אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מייעצת לבוגרים ולילדים מעל גיל 12. מתחת לאיל
שנים יש לפנות לרופא.

עליך ליטול את הרכבתן לפני ההזראות בסעיף המינון בעלון זה.
היעועץ ברוקח אם הן זקוק למיעד נסוף. עליך לפנות אל הרופא
באם סיכון המחלת (סימפטומים) מחייבים או אינם מסתירים
וחולים והבא את רופא יומיים.
אם אין להפסיק את הטיפול ולפנות מידי לרופא
לאור יומיים. כמו כן יש להפסיק את הטיפול ובמקרה
אם השלישול מלאו בחום גבוה או אם החול צלצלים באוזניים או
איבוד שמיעת.

התרופה מיעצת להקלה בבקרים של שלשול, בחילה, גידם, כאבי
בון עוויים, קלה קיבה וקשיש בעיכול.

למניעה שלשלול אצל מטילים.

תרופות לדלקת מפרקים (ארטראיטיס)
• אספירין וסליצילטים

• תרופות נגד שגדון כגון פרובנציד או סולפיניפריזין
טטרציקלינים

• תרופות לסתות מוסכט
• שימוש ברופאה ומצון:

נתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.
• שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
אין לשותות ינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם
התרופה.

• הרוון, הנקה ופוריות:
אם הן בהריון או מניקה, יש להיעז ברפוא לפני השימוש
בתרופה.

