

ببتي X أفراد 262 ملغ

يحتوي كل قرص على: بيسموث سباسالسيلايت 262 ملغ

Bismuth Subsalicylate 262 mg

لتقطيل المركبات الأخرى في الدواء انظر البند 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بأكملها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

أو الطبيب إذا كانت من متطلبي العلاج أقل من 12 عاماً. يجب التوجه إلى

بتوخُب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد يومين. كذلك يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان الإهمال مصحوباً بالحمى الشديدة، أو إذا شاع تهاب في الأنفين أو فقدان اللسمع.

1. لأى غرض مخصوص هذا الدواء؟

الدواء مخصوص للتخفيف من حالات الإسهال، الغثيان، الغازات، ألم البطن

التشنجية، توسيع المعدة وعسر الهضم.

منع الإسهال لدى المسافرين.

2. قبل استعمال الدواء:**X لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

كنت حساساً (أرجح) لل المادة الفعالة أو لأى من المركبات الأخرى التي

يحتوي عليها الدواء.

لا يجوز الاستعمال عند المعاناة من أمراض مصحوبة بالخشى مثل

الإفقوذاني والحمائى (جدري الماء) (خوفاً من نشوة ملائكة ربي).

كنت حساساً للساليسيلاتات (بما في ذلك الأسيبرين)، أو كنت تستعمل

مستحضرات أخرى تحتوي على ساليسيلات. يحتوي الدواء على

ساليسيلات.

كنت تعاني من قرحة المعدة، النزيف الدموي، البراز الدموي أو الأسود.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية الآمنة عادة هي:

البالغون والأولاد الذين سنهن فوق الـ 12: 12 قرصاً.

الأولاد الذين سنهن دون الـ 12: يجب استشارة الطبيب.

إذا أوصى الطبيب بذلك - الأطفال الذين سنهن دون الـ 9: يوصى باستعمال ببتي X السائل.

بالإمكان تناول هذه الجرعة الدوائية بحسب الحاجة كل نصف ساعة إلى ساعة، حتى 8 مرات على مدار 24 ساعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية التناول

يجب أبتلاء الدواء مع الماء.

هرس/النطير/المضغة

لا يجوز المصونة، الفرس مخصوص للبلع.

لا يجوز شرب القرص بهذه تناول كفته أفل.

على هرس/النطير، القرص يهيف تناول كفته أفل.

للاستعمال الفوري، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يجب بلع جميع الأجزاء فوراً بعد

هرس/النطير.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية المطلوبة؛ إذا تناولت

جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوخِّه فوراً إلى الطبيب أو إلى

غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. لا تسبِّب التقيؤ بدور

تعليمات صريحة من الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

X قبل البدء بالعلاج ببتي X، أخبر الطبيب إذا:

كنت حاماً أو مرضعاً.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسى (مثل

الربو)، الكلبة/الجهاز الهليني، الجهاز الهضمي (مثل قرحة المعدة)، الجهاز

الدموي (مثل التهاب وما إلى ذلك)، التقرس، التجفاف أو إذا كانت لديك

حمى.

كنت حساساً لغذاء ما أو دواء ما، خاصة للأسيبرين والساليسيلاتات.

لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والمرأهفين الذين لا تتجاوز سنهم

الـ 20، الذين يعانون من الإفقوذاني أو الحمائى (جدري الماء) أو الحمى أو الذين

فقوا الكثير من السائل.

لا يجوز إعطاء للأولاد أو بالبالغين لعلاج الغثيان العضوي المنشا.

لا يجوز استعمال الدواء إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد يومين.

صيغت هذه النشرة في 03/2020 بالتماشي مع الصيغة التي حذرتها وزارة الصحة وموتها طباق نشرة المستحضر الأصلي، التي فحصت وأقرت من قبل وزارة الصحة في 01/2015.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 1406531601.
من أجل التيسير ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت العادي وانتظر الطبيب.
كيف تستطع المساعدة في نجاح العلاج؟ في حالة الإسهال يجب الإكثار من شرب السوائل التي لا تحتوي على الكافيين من أجل التغلب على فقدان السوائل.
لا يجوز تناول الأدوية في المفتوحة! راجع الملصق وأنك من الجرعة **لكل مرأة**.
تناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، فاستعمل الدواء، واستمر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية.

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بيتي^X إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:
ظهرت الأعراض التالية: ضيق، تشنّجات، مشكلات في النطق، تشوش الرؤية، ارتجاع، طنين في الأذنين أو فقدان السمع، امساك شديد.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا:
ظهرت علامات فرط الحرارة مثل العماش، الصداع، والإسهال المصحوب بالحمى الشديدة.

قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البراز أو اللسان. لا تستدعي هذه التغيرات القلق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بوسائله الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستماراة المخصصة للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امن التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأي الأطفال الرضيع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبّب التقوّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Calcium carbonate, Povidone K-25, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose 4910, Magnesium Stearate, Ponceau 4R, Macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وهو هو محتوى العبوة:

تحتوي العبوة على 2، 7، 10، 15، 20، 30، 50، 60 قرصاً مطلقاً وردي اللون، مستديرًا ومحدّباً من كلا الجانبين.

قد لا تُسوق جميع أحجام العينات.

اسم الجهة المصنعة وصاحب الامتياز وعناته: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض، شارع هكيمدا 3، كريات ملخي.

