

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات 1986)

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

بييتي X معلق (262 ملغ / 15 مل)

يحتوي كل 15 مل على:

بيسموث سابساليسيلات 262 ملغ

Bismuth Subsalicylate 262 mg

لتفصيل المركبات الأخرى في الدواء انظر البند 6 -
معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا
توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
الدواء مخصص للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12.
يجب التوجه إلى الطبيب إذا كانت من متلقي العلاج أقل
من 12 عاماً. يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً
للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة.
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.
يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض
(الأعراض) أو لم تحسن بعد يومين. كذلك يجب إيقاف
العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان الإسهال مصحوباً
بالحمى الشديدة، أو إذا نشأ طنين في الأذنين أو فقدان
للسمع.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من حالات الإسهال، الغثيان،
الغازات، الآم البطن، التشنج، توعك المعدة وعسر
الضم.

لمنع الإسهال لدى المسافرين.

2. قبل استعمال الدواء:

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) للمادة الفعالة أو لأي من
المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.
- لا يجوز الاستعمال عند المعاناة من أمراض
مصحوبة بالحمى مثل الإنفلونزا والحمى (جدي
الماء) (خوفاً من نشوء متلازمة ربي).
- كنت حساساً للسالييلات (بما في ذلك
الأسبيرين)، أو كنت تستعمل مستحضرات أخرى
تحتوي على سالييلات. يحتوي الدواء على
سالييلات.
- كنت تعاني من قرحة المعدة، النزيف الدموي،
اليراز الدموي أو الوبسود.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

❗ قبل البدء بالعلاج بببيت X معلق، يجب إخبار الطبيب

إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعاً.

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة
الجهاز التنفسي (مثل الربو)، الكلى/الجهاز البولي،
الجهاز العصبي (مثل قرحة المعدة)، الجهاز الدوري
(مثل التخثر وما إلى ذلك)، الفرس، التخفاف أو إذا
كانت لديك حمى.

- كنت حساساً لغذاء ما أو لدواء ما، خاصةً للأسبيرين
والسالييلات.

❗ لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والمراهقين الذين
لا تتجاوز سنهم الـ 20، الذين يعانون من الإنفلونزا أو
الحمى (جدي الماء) أو الحمى أو الذين فقدوا الكثير
من السوائل.

❗ لا يجوز إعطاؤه للأولاد أو البالغين لعلاج الغثيان

العصوي المنشأ.

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا تفاقمت علامات المرض

(الأعراض) أو لم تحسن بعد يومين.

❗ لا يجوز استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو

لفترة متواصلة دون استشارة الطبيب.

❗ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى
بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية،
فاخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصاً يجب إبلاغ
الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

- أسبيرين وسالييلاتات
- أدوية مضادة لتخثر الدم
- أدوية مضادة للقرص مثل بروبينيسيد أو سولفينيزارون
- نيتروإسكيزينات
- أدوية للسكري
- أدوية لتهاليف المفاصل (أرثريتيس)

❗ استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

❗ استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب البيرة أو المشروبات الروحية خلال فترة
العلاج بالدواء.

❗ الحمل، الإرضاع والخصوبة:

❗ إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فيتوجب عليك استشارة الطبيب
قبل استعمال الدواء.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في جرعة
من 30 مل لذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

يحتوي الدواء على 240 ملغ Propylene Glycol في
كل جرعة من 30 مل.

يحتوي الدواء على 39 ملغ Sodium Benzoate في
كل جرعة من 30 مل.
يحتوي الدواء على 4R Ponceau الذي قد
يسبب رد فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من
الجرعة الدوائية وكمية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية الاعتيادية عادةً هي:

البالغون والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12: 30 مل.

الأولاد الذين سنهم دون الـ 12: يجب استشارة الطبيب.

بالإمكان تكرار تناول هذه الجرعة الدوائية كل نصف

ساعة إلى ساعة، حتى 8 مرّات على مدار 24 ساعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول

قبل الاستعمال يجب خضّ الدواء جيّداً وشربه وفقاً للجرعة
الدوائية الموصى بها.

يجب المواظبة على قياس الجرعة بواسطة كأس القياس
المرفقة.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية

المطلوبة: إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع

الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة

الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. لا

تسبب التقوّل بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

❗ إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في

الوقت المطلوب، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول

الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟ في حالة الإسهال

يجب الإكثار من شرب السوائل التي لا تحتوي على

الكافيين من أجل التغلب على فقدان السوائل.

❗ لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد

من الجرعة في كل مرّة تناول فيها الدواء. ضع النظارات

الليّنية إذا كنت بحاجة إليها.

❗ إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء،

فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أيّ دواء، قد يؤدي استعمال بييتي X معلق إلى نشوء
أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة

قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

❗ يجب التوقّف عن الاستعمال والتوجّه فوراً إلى الطبيب إذا:

ظهرت الأعراض التالية: ضغف، تشنجات، مشاكل في

التنفس، تنشّش الرّوية، ارتباك، طنين في الأذنين أو فقدان

السمع، إمساك شديد.

❗ يجب التوقّف عن الاستعمال والتوجّه إلى الطبيب في

أسرع وقت ممكن إذا:

ظهرت علامات فرط الجرعة مثل النعاس، الصداع،

والإسهال المصحوب بالحمى الشديدة.



LFL 785 03/20

قد يسبب هذا الدواء تغييراً في لون البراز أو اللسان. لا تستدعي هذه التغيرات القلق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

الاستعمال بعد الفتح: صالح للاستعمال لمدة شهرين كحد أقصى بعد يوم فتحه.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Salicylate, Sucralose, Sodium Benzoate, Strawberry Cream Flavor, Salicylic Acid, Ponceau 4R, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قنينة تحتوي

على 100 ملل معلق وردي اللون بنكهة الفراولة.

اسم الجهة المصنعة وصاحب الامتياز وعنوانه:

ك ص ط للصناعات الكيمائية م.ض.، شارع هكيدما 3، كريات مآخي.

صيغت هذه النشرة في 03/2020 بالتماشي مع الصيغة

التي حدتها وزارة الصحة ومحتواها مطابق لنشرة

المستحضر الأصلي، التي فُحصت وأقرت من قبل وزارة الصحة في 01/2015.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة

الصحة: 1407531557.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.