**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة**
**(مستحضرات) -١٩٨٦**
**أقرأ / ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**

# كاثيجل مع ليدوكائين

**مادة هُلامية (جل) معَدة للإدخال للإحليل**

**التركيب:**

**المادة الفعالة وتركيزها:**

Lidocaine hydrochloride 2%
Chlorhexidine dihydrochloride 0.05%

**المواد غير الفعالة:**

Hydroxyethylcellulose, Glycerol, Sodium lactate solution, Water for injection.

**الفصيلة العلاجية:**

ليدوكائين -مخدر موضعي؛ كلور هِكْسيدين -مطَهر موضعي.

**الإستطباب:**

الدواء مخصص للإدخال للإحليل قبل إدخال قثطار أو جهاز آخر ,تنظير داخلي ,تنظير المثانة.

**متى لا يجوز إستعمال المستحضر:**

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء إذا كنت تعاني/ن من حساسية لأحد مركباته أو إذا كنت تعاني/ن من حالة بطء القلب الشديد.
لا يجوز استعمال هذا المستحضر للرضع تحت جيل سنة واحدة الذين يتعاطون أدوية تسبب حدوث حالة" خضاب الدم المبَدل الدموي methaemoglobinaemia "مثل أميدات السولفا.
لا يجوزاستعمال هذا المستحضر للخدّج الذين ولدوا قبل الأسبوع ال -٣٧.
لا يجوز استعمال الدواء إذا كان الجلد في مكان العلاج مصاباً أو ملتهباً.
لا يجوز إدخال المادة الهلامية (الجل) مباشرة لداخل الاحليل في أعقاب تجربة غير موفقة لإدخال القثطار.

**يحظر استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج:**

إذا كنت حاملاً أو مرضعة.
إذا كنت تعاني/ن من نقص في إنزيم G6PD (حساسية للفول).
إذا كنت تعاني/ن أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب ,جهاز الدم (فقر دم مثلا), الكبد ,الكلية ,داء الصرع.

**تحذيرات:**

من الممكن أن يسبب هذا الدواء حساسية موضعية.
أثناء التخدير ,يجب استعمال مادة تزليقية (مادة للتشحيم) خالية من الليدوكائين.

**التفاعلات بين الأدوية:**

عليك إبلاغ الطبيب المعالج إذا كنت تتعاطى/ين دواء إضافيًا أو انتهيت قريباً من العلاج بدواء آخر ,وذلك لتفادي المخاطر أو انعدام فاعلية العلاج الناتجة عن التفاعلات بين الأدوية. خاصة بالنسبة للأدوية التابعة للمجموعة التالية:مخدر موضعي آخر ,مركبات أميدات السولفا ,الأدوية المستعملة لعلاج عدم انتظام نبضات القلب.

**الأعراض الجانبية:**

بالإضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء ,فقد تظهر أثناء استعماله تأثيرات جانبية أثناء فترة العلاج ,على سبيل المثال :تهيج موضعي ,الشعور بالسخونة ,استجابة تحسسية.
إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تُذكَر في هذه النشرة , أو إذا طرأ أي تغيير على صحتك بشكل عام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء ,عليك عندئذ مراجعة الطبيب المعالج على الفور.

**الجرعة الدوائية:**

الجرعة الموصى بها عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب:

قارورة واحدة – لا يجوز إدخال أكثر من قارورة واحدة (أنظر/ي "إرشادات الاستعمال").

**انتبه/ي!**

يمنع البلع !هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

تجنب/ي ملامسة الدواء للعينين.

**إرشادات الاستعمال:**

هذا الدواء مخصص للإدخال بشكل بطيء للإحليل قبل إدخال جهاز طبي. **ينفَذ العلاج فقط بوساطة طبيب أو طاقم طبي مدرب آخر.**

١ . نظف/ي فتحة الاحليل.

٢ . عليك إزالة الورق من غطاء العبوة واكسر/ي طرف القارورة.

٣ . حرر/ي قطرة واحدة من الجل حتى تكون عملية إدخال المِطباق (الجهاز) أكثر سهولة.

٤ . اضغط/ي تدريجياً لإدخال محتوى القارورة.

**تجنب /ى التسمم!**

يجب حفظ هذا الدواء وكافة الأدوية الأخرى في مكان مغلق وبعيدًا عن متناول الأطفال و /أو الرضع وذلك لتفادي التسمم.

إذا تناولت جرعة زائدة من الدواء أو قام ولد ببلع شيء من الدواء عن طريق الخطأ ,عليك التوجه فورًا لغرفة الطوارئ الموجودة بالمشفى ,كما يجب إحضار علبة الدواء معك.

لا تتقيأ /ي الدواء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

**التخزين:**

يخزن هذا الدواء بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. يجب حفظه في علبة الكرتون لوقايته من الضوء.

يمكن الاحتفاظ بالأدوية لفترة محدودة من الوقت حتى في حالة حفظها في العلبة الأصلية الخاصة بها أو تخزينها بالطريقة الموصى بها .يرجى ملاحظة تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة !في حالة الشك ,يرجى استشارة الصيدلي الذي قام ببيع الدواء لك.

لا تقم بتخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

**رقم سجل الدواء:** 134 65 31156 00

**المنتج:** فارم فابريك، مونتاڤيت,GmbH , النمسا.

**صاحب التسجيل:** ع. لبيدوت فارماسيوتيكالس م.ض., ٨ شارع هاشيطا ,المنطقة الصناعية ,قيساريا ٣٨٩٠٠.

تم وضع صيغة هذه النشرة من قبَل وزارة الصحة ,وتم فحص محتواها والمصادقة عليها في أيار ٢٠١١.