



אפריל 2020

רופא/ה נכבד/ה

רוקח/ת נכבד/ה

חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלון לצרכן של התכשירים Alimta 100mg, Alimta 500mg עודכן.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשה שינוי המהווה החמרה. קיימים עדכונים נוספים.

העלון המעודכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום:

אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה, טל': 09-9606234

ברכה,
רון שורץ
רוקח ממונה
מ.ר. 793

Alimta 100 mg, Alimta 500 mg

אלימטה 100 מ"ג, אלימטה 500 מ"ג

Each vial contains 100 mg of pemetrexed (as pemetrexed disodium).

Each vial contains 500 mg of pemetrexed (as pemetrexed disodium).

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

Malignant pleural mesothelioma:

ALIMTA in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curative surgery.

Non-small cell lung cancer:

ALIMTA in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology (see section 5.1).

ALIMTA is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy (see section 5.1).

ALIMTA is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology (see section 5.1).



העדכונים העיקריים בעלון לצרכן הינם:

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשים)

פיגמנטציה מוגברת של העור

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה: השכיחות אינה ניתנת להערכה מתוך הנתונים הקיימים

דלקת של העור, בעיקר של הגפיים התחתונות, הכוללת נפיחות, כאב ואודם.