

**نشرة طبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) 1986**  
يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب



إيكسيدرين، حبسولات، 250 ملغ / 250 ملغ / 65 ملغ

الموادّ الفعّالة وكميّتها:  
تحتوي كلّ حبسولة على:

Acetylsalicylic acid	250 mg	حمض الأسيتيل ساليسيليك
Paracetamol	250 mg	پاراسيتامول
Caffeine	65 mg	كافئين

لمعاينة قائمة الموادّ غير الفعّالة ومسبّبات الأرجية، انظر البند 6.  
اقرأ النشرة بامعان حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدليّ.

يتوجّب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في البند 3 - كيف تستعمل الدواء. استشر الصيدليّ إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمّت أعراض المرض أو لم تتحسنّ بعد 5 أيّام عند الاستعمال لتسكين الألم أو بعد 3 أيّام عند الاستعمال لتسكين الألم المصحوب بالحمّى (انظر البند 3 - كيف تستعمل الدواء).

### 1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدواء مخصّص للتخفيف المؤقت من: الصداع، والألم المعتدل إلى المتوسط المرتبط بالصداع النصفيّ (الميجرينا)، والألم والانزعاج النابعين من الطمث والألم المصحوب بالحمّى.  
الفصيلة العلاجية:

حمض الأسيتيل ساليسيليك - مضادّ للالتهابات لاستيرويديّ (NSAIDs)  
پاراسيتامول - مسكن للألام وخافض للحرارة  
كافئين - قلويد الكسانتين، محقّر للجهاز العصبيّ المركزيّ

### 2. قبل استعمال الدواء

☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) للموادّ الفعّالة أو لأيّ واحد من المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر التفصيل في البند 6).
- قد تشمل أعراض ردّ الفعل التحسّسيّ: الربو، الأزيز أو ضيق التنفّس، الطفح الجلديّ أو الشرى، انتفاخ الوجه أو اللسان، سيلان الأنف. إذا لم تكن متأكّداً، فاسأل الطبيب أو الصيدليّ الخاصّ بك.
- كان لديك في الماضي ردّ فعل تحسّسيّ على أدوية أخرى تُستعمل لتسكين الألم أو لعلاج الالتهاب أو الحمّى، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين.
- كانت لديك قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء، أو إذا كان لديك ماضٍ من القرحة الهضميّة.
- لاحظت وجود دم في البراز أو كان البراز أسود اللون (أعراض لنزيف أو ثقب في الجهاز الهضميّ).
- كنت تعاني من الهيموفيليا أو من اضطرابات أخرى في الدم.
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب، الكبد والكليتين.
- كنت تستعمل أكثر من 15 ملغ ميثوثريكسات في الأسبوع (انظر البند التفاعلات بين الأدوية).
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (انظري البند: الحمل، الإرضاع والخصوبة).

تحذيرات خاصّة تتعلّق باستعمال الدواء

ⓘ قبل العلاج بإيكسيدرين، أخبر الطبيب إذا:

- لم يتمّ تشخيص الصداع النصفيّ (الميجرينا) لديك في الماضي، لأنّه يجب استبعاد حالات قد تكون خطيرة، تتعلّق بالدماغ أو بالجهاز العصبيّ، قبل العلاج.
- كنت تعاني من صداع نصفيّ (ميجرينا) حادّ إلى درجة أنّه يتطلّب الاستراحة في السرير، أو إذا كان لديك صداع يختلف عن نوبات الميجرينا الاعتياديّة لديك، أو إذا كنت تعاني من التقيّوات بالتزامن مع آلام الميجرينا.
- بدأت لديك أحداث الصداع بعد الإصابة في الرأس أو بسببها، أو نتيجة لبذل المجهود، السعال أو الانحناء.
- كنت تعاني من الصداع المزمن (خمسة عشر يوماً أو أكثر في الشهر لمدة أكثر من ثلاثة أشهر)، أو إذا شعرت بأول صداع بعد سنّ الـ 50.
- كنت تعاني من حالة وراثيّة تسمّى نقص الإنزيم G6PD (جلوكوز - 6 - فوسفات ديهيدروجيناز) الذي يؤثّر على كريات الدم الحمراء وقد يسبّب فقر الدم، اليرقان أو تضخّم الطحال عند التعرّض لأغذية معيّنة ولأدوية مثل أدوية معيّنة مضادة للالتهاب (مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين))، أو يسبّب أمراضاً أخرى.
- عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضميّ مثل قرحة المعدة، النزيف الدمويّ أو البراز الأسود. إذا كان لديك انزعاج في البطن أو حرقة المعدة بعد تناول مسكنات الألام أو الأدوية المضادة للالتهاب.
- كنت تعاني من اضطرابات نزفيّة أو من نزيف غير سويّ من المهبل بشكل مختلف عن الدورة الشهرية (مثل النزيف الطمثيّ الشديد والمتواصل بشكل شادّ).

- خضعت مؤخرًا لجراحة (بما في ذلك الجراحات البسيطة مثل جراحة الأسنان) أو كنت ستخضع لجراحة خلال الأيام السبعة القريبة.
- كنت تعاني من ربو البالغين، حمى القش (التهاب الأنف التحسسي)، سلائل الأنف (الپولپ)، مرض تنفسي مزمن أو كنت تطوّر أعراضًا تحسسية (مثل ردود الفعل الجلدية، الحكة، الشرى)
- كنت تعاني من نقرس (چاوت)، سكري، فرط نشاط الغدة الدرقية، اضطرابات نظم القلب، فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة، خلل في وظيفة الكليتين أو الكبد.
- كنت تعاني من الإدمان على الكحول (انظر البند - استعمال الدواء والطعام).
- كنت تستعمل أدوية أخرى تحتوي على حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين) أو الباراسيتامول، أو أدوية أخرى، لأنّ هناك أدوية معينة قد تعيق عمل إكسبيرين وتسبب أعراضًا جانبية (انظر الفصل - التفاعلات بين الأدوية)
- كنت معرضًا لخطر التجفاف (مثلًا: نتيجة للتقيؤات، الإسهال، أو قبل جراحة كبيرة أو بعدها).
- كان عمرك أقل من ثمانية عشر عامًا. هناك علاقة محتملة بين حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين) ومتلازمة ربي عند استعماله لدى الأولاد والمراهقين. متلازمة ربي هي متلازمة نادرة، تؤثر على الدماغ والكبد، وقد تكون فتاكًا. لهذا السبب، لا يجوز استعمال إكسبيرين لدى المراهقين والأولاد الذين سنهم دون الـ 18 بدون إرشاد صريح من الطبيب.

#### ⚠ تحذيرات أخرى:

كما هو الحال عند استعمال أي نوع من مسكنات الألم التي تخفّف الصداع، فإنّ استعمال إكسبيرين في أوقات متقاربة جدًا (يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر بالنسبة لهذا الدواء) عند وجود صداع مزمن (خمسة عشر يومًا في الشهر أو أكثر)، لمدة أكثر من ثلاثة أشهر قد يفاقم الصداع أو الميجرينا لديك.

إذا كنت تعتقد أنّ هذه قد تكون حالتك، فراجع طبيبك للاستشارة. قد تضطرّ إلى التوقّف عن استعمال إكسبيرين لكي تحلّ المشكلة. قد يقلّل إكسبيرين من أعراض التلوث (مثل الصداع، حرارة الجسم المرتفعة) ولذلك من الممكن أن يجعل تشخيص التلوث أكثر صعوبة. إذا كنت تشعر بأنك لست بحالة جيّدة عليك مراجعة الطبيب، فتذكّر أن تقول له إنك تستعمل إكسبيرين.

#### ⚠ الأولاد والمراهقون

إكسبيرين غير مخصّص للأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 12.

#### ⚠ الفحوص والمتابعة

قد يؤثّر إكسبيرين على نتائج الفحوص المخبرية. إذا طلب منك إجراء فحوص للدم، للبول أو فحوص مخبرية أخرى، فتذكّر أن تحكي أنّك تستعمل إكسبيرين.

#### ⚠ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصّة إذا كنت تستعمل:

- أي مستحضر آخر يحتوي على الباراسيتامول، حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين) أو أي مسكّن آخر للألم/خافض آخر للحرارة.
- أدوية لمنع تخثر الدم مثل مضادات التخثر التي تُستعمل عن طريق الفم (مثل وارفارين)، هيبارين، أدوية حالة للخرثرة (مثل ستريبتوكيناز)، أو أدوية أخرى مضادة للصفائح (تيكلوبيدين، كلوبيدوجريل، سيلوستازول).
- الكورتيكوستيرويدات (تُستعمل لتخفيف الالتهاب).
- الباربيتورات والبنزوديازيبينات (لعلاج القلق والأرق).
- الليثيوم، مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) أو فلووفوكسامين (لعلاج الاكتئاب).
- سولفونيل يوريا والإينسولين (لعلاج السكري).
- ميتوتريكسات (لعلاج أنواع معينة من السرطان، التهاب المفاصل أو الصدفة).
- أدوية معينة لعلاج التلوث (مثل ريفامبيسين، إيزونيايد، كلورامفينيكول، سيبروفلوكساسين أو حمض البيبيميديك).
- ليفوثيروكسين (لعلاج القصور الدرقي).
- ميتوكلوبراميد (لعلاج الغثيان والتقيؤات).
- أدوية لعلاج الصرع.
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم وقصور القلب.
- أدوية مدرّة للبول (لزيادة إنتاج البول وتقليل فائض السوائل).
- أدوية لعلاج النقرس (چاوت).
- وسائل منع الحمل التي تُعطى عن طريق الفم.
- زيدوفودين (لعلاج فيروس العوز المناعيّ البشري).
- أدوية لعلاج التفريغ المعديّ البطيء مثل پروبانثيلين.
- كلوزابين (لعلاج الفصام).
- أدوية محاكية للودي (لرفع ضغط الدم أو لعلاج احتقان الأنف).
- أدوية مضادة للحساسية (لعلاج أو تخفيف الأرجيات).
- ثيوفيلين (لعلاج الربو).
- تيربينافين (لعلاج التلوثات الفطرية).
- سيميبتيدين (لعلاج حرقة المعدة والقرحة الهضمية).
- ديسولفيرام (لعلاج التعلّق بالكحول).
- نيكوتين (للإقلاع عن التدخين).

## • كوليستيرامين (لعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة).

### 1 استعمال الدواء والطعام:

الجرعة الموصى بها لهذا الدواء تحتوي على كمّية من الكافيين مشابهة لتلك الموجودة في كأس قهوة. خلال فترة استعمال الدواء، حدّد استهلاك الأدوية، الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنّ استهلاك كمّية أكبر من اللازم من الكافيين قد يسبّب العصبية، انعدام الهدوء، الأرق، وأحيانًا دقات القلب السريعة.

### 2 استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

يجب الامتناع عن استهلاك الكحول خلال فترة استعمال الدواء. إذا كنت تستهلك ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر في كلّ يوم، فاسأل طبيبك إذا كان عليك استعمال هذا الدواء أو أدوية أخرى لتخفيف الألم/تخفيض الحرارة. قد يسبّب الباراسيتامول وحمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين) ضررًا للكبد ونزيفًا في المعدة.

### 3 الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنتِ حاملاً، تظنّين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فأخبري طبيبك ولا تستعملي إكسبيرين من الضروري تحديداً عدم استعمال إكسبيرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأنّ ذلك قد يضرّ الجنين أو يسبّب مشاكل عند الولادة.

لا يوصى باستعمال إكسبيرين خلال فترة الإرضاع.

استشيري الطبيب أو الصيدلي الخاصّ بك قبل استعمال أيّ دواء.

ينتمي إكسبيرين إلى فصيلة أدوية (NSAIDs) قد تخلّ بالخصوبة لدى النساء. هذا التأثير قابل للانعكاس عند إيقاف استعمال الدواء.

### 4 السياقة واستعمال الماكينات:

لا يوجد تأثير معلوم لاستعمال إكسبيرين على قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات. إذا لاحظت نشوء أعراض جانبية مثل الدوار أو النعاس، فعليك الامتناع عن السياقة واستعمال الماكينات. أخبر طبيبك في أسرع وقت ممكن.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية الاعتيادية عادةً هي:

### لعلاج الصداع المرتبط بالميجرينا:

البالغون: حسبولتان. إذا تم استعمال الدواء لعلاج الصداع النصفيّ (الميجرينا) ولم يطرأ تحسّن بعد تناول الجرعة الأولى، أو إذا طرأ تفاقم بعد تناول جرعة واحدة منه، فيجب استشارة الطبيب.

الأولاد الذين سنّهم دون الـ 18: يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء لأكثر من 48 ساعة للميجرينا.

**للصداع، للآلم والانزعاج الناجبين من الطمث، وللآلم المصحوب بالحمّى:** البالغون والأولاد الذين سنّهم فوق الـ 12: حسبولتان كلّ 6 ساعات.

قد يتمّ الشعور بتخفيف الآلم خلال 15 دقيقة من لحظة تناول الجرعة.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حسبولات خلال 24 ساعة.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

لا يجوز استعمال الدواء لفترة تزيد عن 5 أيام لعلاج الآلم أو تزيد عن 3 أيام لعلاج الآلم المصحوب بالحمّى دون استشارة الطبيب. المسنون:

ليست هنالك توصية لجرعة دوائية خاصة. إذا كان وزن جسمك منخفضًا، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يجب بلع الدواء كاملاً مع كأس مليئة بالماء.

الشطّر/ الهرس/ المضغ:

لا يجوز شطّر أو هرس الحببولة.

لا تتوفر معلومات بخصوص الشطّر/ الهرس/ المضغ.

لا يجوز الاستلقاء لمدة 15-30 دقيقة بعد تناول الدواء.

تحتوي حسبولات إكسبيرين على حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين)، الباراسيتامول والكافيين. لا يجوز استعمال جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية الموصى بها ولا يجوز استعمال أدوية أخرى قد تحتوي على هذه المركبات أو على مركبات أخرى تُستعمل لعلاج

الآلم، الالتهاب أو الحرارة المرتفعة (الأدوية المضادة للالتهاب الستيرويديّة) خلال فترة استعمال إكسبيرين.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إنّ العلاج الطيّّ الفوريّ أمر حاسم، نظرًا للخطر المحتمل لضرر غير قابل للانعكاس على الكبد بسبب الباراسيتامول. لا تنتظر حتى ظهور الأعراض، لأنّ فرط الجرعة قد لا يسبّب في البداية أعراضًا يمكن ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض لفرط الجرعة فقد تكون:

- بالنسبة لحمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين): الدوار، الطنين في الأذنين، الصمم، التعرّق، فرط التنفّس، الحرارة المرتفعة، الغثيان، التقيؤات، الصداع، الارتباك أو انعدام الراحة، هبوط الدورة الدموية، أو الفشل التنفّسي.
  - بالنسبة لباراسيتامول: الأعراض الأولى التي قد تظهر هي الغثيان، التقيؤات، انعدام الشهية، الشحوب، الميل إلى النوم، التعرّق وبعد ذلك الآلم في البطن.
  - بالنسبة للكافيين: القلق، العصبية، انعدام الراحة، الأرق، الانفعال، تقلص العضلات، الارتباك، الاختلاجات، فرط السكر في الدم، تسرّع القلب (نظم القلب السريع) أو الاضطرابات في نظم القلب.
- حتّى إذا لم تظهر هذه الأعراض أو إذا اختفت، فمن الضروريّ التوجّه لتلقّي المساعدة الطبيّة بشكل فوريّ.

#### إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول الدواء لحظة تذكرك لكن لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبوبلات خلال فترة 24 ساعة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال إيكسبيرين إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية.

قد لا تعاني من أي واحد منها.

**يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا شعرت بواحد أو أكثر من هذه الأعراض الجانبية الخطيرة:**

- رد فعل تحسسي مع انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة.
- قد يسبب ذلك صعوبة في البلع، أزيزاً عند التنفس، صعوبات في التنفس، وشعوراً بالضغط في الصدر (علامات الربو). قد يظهر لديك أيضاً طفح جلدي أو حكة، أو قد تصاب بالإغماء.
- طفح جلدي (يشمل الشرى، الحكة)، احمرار الجلد، حويصلات في الشفتين، العينين أو الفم، تقشر الجلد، جروح، تقرحات في الفم.
- نزيف في المعدة أو في الأمعاء، قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء، وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة بألم حاد في البطن، براز دموي أو أسود أو تقيؤ دموي. كما هو الحال عند العلاج بجميع مسكنات الألم وخافضات الحرارة، قد تنشأ هذه الأعراض في أي وقت خلال فترة العلاج، دون أن يكون لها سوابق وقد تكون فتاكة. هذا العرض الجانبي خطير لدى المسنين بالتحديد.
- اصفرار الجلد أو العينين (علامات على الفشل الكبدي).
- دوام (علامة على ضغط الدم المنخفض).
- نظم قلبي غير منتظم.

#### أعراض جانبية أخرى

تمّ التبليغ عن الأعراض الجانبية المذكورة أدناه في 16 دراسة سريرية تمّ إجراؤها باستعمال إيكسبيرين لدى ما يزيد عن 4800 متلقٍ للعلاج.

أخبر طبيبك إذا لاحظت حدوث أحد هذه الأعراض الجانبية:

**أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند مستعمل 1 كحدّ أقصى من بين 10:**

- عصبية، دوام
  - غثيان، انزعاج بطني
- أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند مستعمل 1 كحدّ أقصى من بين 100:**

- أرق، ارتجاف، شعور بالتمثيل، صداع
- طنين في الأذنين
- جفاف الفم، الإسهال، التقبؤات
- تعب، شعور بالعصبية
- ارتفاع في نظم القلب

**أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر عند مستعمل 1 كحدّ أقصى من بين 1000:**

- ألم في الحنجرة، صعوبات في البلع، شعور بالتمثيل أو الوخز حول الفم، فائض اللعاب
- انخفاض في الشهية، تغييرات في حاسة الذوق
- قلق، شَمَق، توتر
- اضطرابات في الإصغاء، فقدان الذاكرة، تغيير في التناسق الحركي
- شعور بالألم في الخدين والجبين
- ألم في العينين، اضطرابات في الرؤية
- هبات ساخنة، مشاكل في الأوعية الدموية المحيطية (مثلاً في الذراعين أو الرجلين)
- رُعاف، تنفس بطيء وسطحي، سيلان الأنف
- تجشؤات، انتفاخ (غازات)
- فرط التعرق، حكة، طفح جلدي مثير للحكة، ازدياد في حساسية الجلد
- تصلب العضلات، العظام أو المفاصل، ألم في الرقبة، ألم في الظهر، تقلص العضلات
- ضعف، انزعاج في الصدر

**أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتمّ تحديد مدى شيوعها بعد):**

تمّ التبليغ أيضاً عن الأعراض الجانبية الواردة أدناه منذ بداية تسويق إيكسبيرين. بشكل عامّ، لا يمكن تحديد مدى شيوعها بدقة خلال المتابعة في الفترة التي تلت التسويق، ولذلك ذُكر مدى شيوعها كـ "غير معروف":

- انعدام الراحة، شعور عام سيء أو غير سوي
- ميل إلى النوم، ميچرينا
- احمرار الجلد، طفح جلدي. تمّ التبليغ عن حالات نادرة جداً من ردود الفعل الجلدية الخطيرة.
- دقّات قلبية (خفقان)، ضيق التنفس، صعوبة مفاجئة في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع أزيز أو سعال (ربو)
- ألم في البطن، انزعاج بطني بعد الوجبات

- ارتفاع في إنزيمات الكبد
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:  
<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضّع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.

## 6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المركّبات الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على:  
Cellulose microcrystalline, Hydroxypropyl cellulose low substitution, Hypermellose, Stearic acid, Titanium dioxide, propylene glycol, Carnauba wax, Benzoic acid
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة  
حبسولة بيضاء مطوّلة، يبرز الحرف E على أحد جانبيها، دون خطّ للشطر. تمّت تعبئة الحبسولات في لويحات حوصلات وهي متاحة في علب من 8، 10، 16، 20، 30، 32 أو 50 حبسولة. قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.
- صاحب الامتياز وعنوانه: جي.إس.كبي كونسيومر هيلث كير إسرائيل م.ض.، شارع بازل رقم 25، بيتاح تيكفا.
- اسم المصنّع وعنوانه: جي.إس.كبي كونسيومر هيلث SA، نيون، سويسرا.
- هذه النشرة فُحصت وأقرّت من قِبل وزارة الصحة في شباط/فبراير 2014 وتمّ تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في آذار/مارس 2020.
- رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 114-82-31782
- من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.