



Канестен®

Крем

Активное вещество:

Клотримазол 1% (Clotrimazole 1%)

Список неактивных веществ препарата приводится в разделе 2 «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата» и разделе 6 «Дополнительная информация».

Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Необходимо применять данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки настоящей инструкции. Если Вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта. Если симптомы вашего заболевания усугубились или не улучшились в течение 4 недель, то вам следует обратиться к врачу.

1) Для чего принимают данный препарат?

Канестен® Крем предназначен для лечения инфекций кожи и слизистых оболочек, вызываемых различными видами грибка. Также предназначен для лечения кандидоза влагалища и кандидоза полового члена.

Терапевтическая группа: противогрибковый препарат местного применения из группы имидазолов.

2) Перед применением препарата

Не следует применять препарат:

- Если вы страдаете аллергией на активное вещество препарата или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате, включая цетостеариловый спирт (см. раздел 6 «Дополнительная информация»).
- Для лечения грибкового поражения ногтей или скальпа.

Особые предостережения в связи с приемом препарата:

Подобно другим кремам, Канестен® Крем может уменьшить эффективность резиновых контрацептивных средств, например кондома или диафрагмы. Если вы используете подобное средство на половом члене или во влагалище, то следует заменить их другими контрацептивными средствами в течение, по меньшей мере, пяти дней после применения данного препарата. Если ваше состояние не улучшилось в течение 4 недель, то вам следует обратиться к врачу.

Межлекарственные взаимодействия / реакции:

Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая витамины, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, необходимо сообщить об этом врачу или фармацевту.

Беременность и грудное вскармливание:

Не следует принимать препарат, не посоветовавшись с врачом или фармацевтом до начала лечения, если вы беременны, планируете беременность или кормите ребенка грудью.

Вождение автомашины и работа с механизмами:

Канестен® Крем не обладает каким-либо воздействием на способность водить автомашину или работать с механизмами, или его воздействие носит незначительный характер.

Важная информация о некоторых компонентах препарата:

Данный препарат содержит цетостеариловый спирт, который может вызывать местное раздражение кожи (сыпь, зуд или покраснение).

3) Как применять препарат?

Если вы не уверены в отношении дозировки и способа приема препарата, то нужно проконсультироваться об этом с врачом или фармацевтом. Если препарат был выписан вам врачом, вы должны следовать его указаниям. Если вы приобрели препарат без рецепта врача, то вы должны применять его в соответствии с указаниями, приведенными в данном пункте.

Общепринятая дозировка:

Применение от 2 до 3 раз в день.

Способ применения:

- Указание по открытию тубика – чтобы открыть тубик, следует перевернуть крышку и проколоть закрывающую тубик пластину, нажав на крышку.
- Для лечения грибкового поражения стопы: следует вымыть ступни и хорошо высушить их (в особенности, в промежутках между пальцами) до нанесения крема.
- Следует намазать тонкий однородный слой крема на пораженные участки от 2 до 3 раз в день и втереть крем в кожу.
- Обычно небольшого количества крема (1/2 см) хватает для обработки участка размером с ладонь руки.
- Продолжительность лечения грибковых поражений кожи зависит от типа инфекции. Как правило, продолжительность лечения составляет не менее двух недель. В некоторых случаях может потребоваться 4 недели лечения.
- Если вы страдаете грибковым поражением стопы, то рекомендуется использовать также противогрибковый порошок. Проконсультируйтесь об этом с врачом или фармацевтом.
- Облегчение симптомов инфекционного поражения кожи, в частности зуда и болей, ожидается в течение нескольких дней с начала лечения. Возможно, однако, что такие симптомы, как покраснение и шелушение кожи, исчезнут спустя более длительное время.
- Если улучшения не наступило в течение 4 недель, то вам следует обратиться к врачу.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

Предназначено только для наружного применения.

Не следует брать препарат в рот или глотать его.

- Если вы по ошибке проглотили препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой ближайшей больницы.
- Следует воздерживаться от контакта препарата с глазами или ротовой полостью. При попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу!
- **Если по ошибке вы приняли более высокую дозу препарата, чем требуется, если вы приняли слишком высокую дозу препарата, или если по ошибке препарат проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку от препарата.**
- **Если вы забыли намазать препарат в назначенное время**
 - o Намажьте его сразу же после того, как вспомнили об этом, а затем продолжайте лечение обычным образом.
- **Как вы можете помочь успеху лечения?**
 - o Хотя пораженный участок чешется, следует воздерживаться от его расчесывания. Расчесывание может нанести ущерб целостности кожного покрова и таким образом вызвать распространение инфекции.
 - o Следите за тем, чтобы пораженные участки были чистыми.
 - o Следует хорошо высушивать пораженный участок, но при этом воздерживаться от его чрезмерного растирания.
 - o Не используйте полотенца, коврики для ванны и т. д., которые также используют другие люди, так как инфекция может передаваться им.
 - o Мойте руки каждый раз после того, как вы используете крем, с тем чтобы предотвратить распространение инфекции.
- Если вы страдаете грибковым поражением стоп:
 - o Тщательно высушивайте кожу между пальцами.
 - o Тщательно стирайте носки и чулки в горячей воде, чтобы удалить отшелушившуюся кожу или споры грибов.
 - o При возможности, ежедневно меняйте обувь.
- Не следует применять препарат в темноте! Необходимо проверять этикетку препарата и его дозу при **каждом** применении препарата. Если вы пользуетесь очками, наденьте их перед применением препарата.
- Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4) Побочные явления:

Как и в случае с любым другим препаратом, применение крема Канестен® может вызывать побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

Как и в случае с любым другим препаратом, возможно, что у некоторых пациентов возникнет аллергия на этот крем. Если вы страдаете аллергией, то аллергическая реакция разовьется у вас вскоре после применения препарата. **Следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу или в приемный покой ближайшей больницы, если у вас развилась аллергическая реакция.** Среди признаков аллергической реакции могут быть:

- Сыпь
- Нарушения глотания и дыхания
- Отек губ, лица, гортани или языка
- Слабость, головокружения или обморок
- Тошнота

После применения препарата у вас, возможно, появятся следующие симптомы: зуд, сыпь, пузыри, жжение, неприятные ощущения, отек, раздражение, покраснение или шелушение кожи.

При возникновении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных явлениях лекарственного лечения», которая находится на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или перейдя по ссылке <https://sideeffects.health.gov.il>

5) Как хранить препарат?

- Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном для детей и (или) грудных детей (и вне поля их зрения). Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.
- Не следует принимать препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Сроком годности препарата является последний день указанного на упаковке месяца.
- Условия хранения:
 - o Храните препарат при температуре ниже 30°C.
 - o Не следует использовать препарат по прошествии 3 месяцев со дня открытия тубика.

6) Дополнительная информация

В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Purified water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate, benzyl alcohol, sorbitan stearate, polysorbate 60.

См. раздел «Особые предостережения в связи с приемом препарата» относительно вещества цетостеариловый спирт.

• Как выглядит Канестен® Крем и каково содержимое упаковки?

Канестен® Крем – это крем белого цвета, упакованный в тубиках, содержащих по 20 или 30 граммов препарата. Возможно, что в продаже находятся тубики не всех размеров.

• Владелец регистрации и его адрес: «Байер Исраэль ЛТД.», ул. Ха-Хореш 36, Ход Ха-Шарон 45240.

• Название и адрес производителя: «Керен Фарма С.Л.», Барселона, Испания.

• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в январе 2018 года и обновлена в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения в ноябре 2019 года.

• Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения: 149-44-33680-00.