

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- يفاقم العرض الجانبي: الألام العضلات.
- الحمل، الإصابة والخصوصية:
 - لا يجوز استعمال ليباتور إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل، مريضاً أو تخططين للرضاع، لأنك قد تنتقل كمية صغيرة من سيروبروفيرات إلى حليب الأم.
 - الأمامية واستعمال الماكينات:
 - يجب توخي الحذر عند الميافقة أو تشغيل الماكينات الخطيرة أثناء استعمال الدواء، إذا كنت تعاني من دوار، نعاس وألم في البطن.
 - معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:
 - يحتوي المستحضر على الالكترون. استشر الطبيب قبل البدء باستعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل سكريات معينة.
- كيف تستعمل الدواء؟
 - يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب.
 - عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكطة من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.
 - الجرعة المواتية وكيفية العلاج سيخذد هما الطبيب فقط. الجرعة المواتية الاعتيادية عادة هي: كبسولة واحدة في اليوم (يتوخى على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في وظيفة الكلىتين أن يقللوا من وتيرة تناول الكبسولات - يجب تناول كبسولة واحدة بالتناوب كل يومين).
 - يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
 - يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.
 - يمكن فتح الكبسولة وبلع كل محتواها.
 - إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد النوء خطأ، فتخرج فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عينة الدواء.
 - إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة.
 - تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد وتشترط الطبيب.

- كيف تستطيع المساعدة في تناول العلاج؟
- يجب الم關注ة على حفظ الدواء في المكان الذي يتميز ببرودة درجة الحرارة.
 - وتقليل الوزن بهدف حفظ مستويات الدهنيات في الدم.
 - يجب الم關注ة على العلاج حسب توصية الطبيب.
 - حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب، لأن مرضك قد يتفاقم.
 - لا يجوز تناول الأدوية في التغذية! رابع الملخص ولكن من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
 - إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

- ### 4. الأعراض الجانبية:
- مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال ليباتور إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية قد لا تعاني من أي واحد منها.
 - يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:
 - ظهرت مشاكل في العضلات مثل التقلصات، الألام أو الحساسية في العضلات. قد تؤدي هذه المشاكل إلى فشل كلوي.

- كنت متسلطاً (أرجو) للمادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (قائمة المواد غير الفعالة، انظر البند 6).
 - تتصل علامات رد فعل التحسس: ظهراً حالياً، مشاكل في البالغ أو في التنسج، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة وألوان اللسان.
 - كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مريضاً.
- كنت تعاني من حمل ثقيل في وظيفة الكلبة أو الكلب.
- كنت تستعمل دواء آخر من صنفية الفيرات (مثل: كلوفيرات، بيزاپيرات، فينوفيرات أو جيمفيفروزيل) لعلاج مستويات الدهنيات المرتفعة في الدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- قبل العلاج بليباتور، أخبر الطبيب إذا:
 - كنت تعاني من حساسية، ضعف أو ألام العضلات.
 - كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلية.
 - كنت تعاني من قصور الدريقية.
 - كنت فوق الـ 70 سنة من العمر.
- عانياً، أنت أو عانياً أحد أفراد عائلتك في الماضي من مشاكل في العضلات.

الخصوص والمتابعة:

- خلال فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوص لمستوى الدهنيات في الدم ولوظائف الكبد.

فحوص الدم

- قد يؤثر استعمال دواء يحتوي على المادة الفعالة سيروبروفيرات على فحوصات دم معينة. قد يُرجى لك الطبيب فحوص دم خلال فترة العلاج بهذا الدواء من أجل متابعة وظائف الكبد.
- إذا أجريت فحوص دم خلال فترة العلاج بالدواء، فمن الضروري أن تعلم الطبيب/الممرضة بأنه يمكنك استعمال ليباتور.

التفاعلات بين الأدوية:

- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- خاصةً إذا كنت تستعمل:

- السبيتاتين - أدوية أخرى لتخفيف مستويات الدهنيات في الدم مثل: سيمافاستاتين، أتورفاستاتين، برافاستاتين، فلوكاستاتين وروزفاستاتين.
- أدوية تنشيط الدم مثل وارفارين.
- أدوية لعلاج السكري مثل الإينسولين أو ميتغورمين.
- أدوية تختفي على الإستروجينات مثل جروب من الحمل والعلاجات الهرمونية البديلة.

استعمال الدواء والطعام:

- يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.
- استعمال الدواء واستهلاكه الكحولي:

◦ خلال فترة العلاج، يجب الحد من تناول الكحول. شرب الكثير من الكحول قد

حددت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص وأقر من قبلها

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة (مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ليباتور كبسولات

تحتوي كل كبسولة على: 100 ملغ سيروبروفيرات Ciprofibrate 100 mg.

العلبة الماء غير الفعالة ومسبيات الحساسية في المستحضر - انظر البند 6

والبند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بأكملها حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة

على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلنة إضافية، فراجع

الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أفالك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا

لك أن جاثتم الطبية مشابهة.

هذا الدواء غير مناسب للأطفال الرضيع والأولاد الذين سليم دون الـ 12.

1. لأى غرض مخصوص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصوص لتخفيف مستويات الكوليستيروл والدهنيات الثلاثية

(التروليسيبريدات) في الدم في حالة عدم نجاعة حمية غذائية مخصصة.

الفصيلة العلاجية: الفيرات.



يجب التوجّه إلى الطبيب باسرع وقت ممكن إذا:

- ظهر رد فعل تحسسيٌ تشمل العلامات: طفحًا جلديًّا (مصحوبًا بالحكة والتنفس)، حكةً وحساسيةٌ مفرطةٌ للشمسم.
- نشأ التهاب رئويٌ يسبِّب صعوباتٍ في التنفس، سعالًا وحمىً.
- وُجد تندُّبٌ في الرئتين مما يسبِّب ضيق التنفس.
- ظهرت مشكلاتٍ في الكبد، قد تسبِّب لونًا أصفرًا في الجلد وأو ملتحمة العين (اليرقان).
- ظهرت ألم شديدةٌ في البطن (في أعلى البطن الأيمن) قد تشيَّر إلى الطفيف وبصاحبها الغثيان، التقيؤات والحمىً. هذا العرض قد يسبِّب تشنج المراة أو الحصوات في كيس المراة.

اعراض جانبيّة شائعة (common) - اعراض تظهر عند 10-15%

- مستعملين من بين 100: تساقط الشعر، صلع.
- صداع، مشكلات في التوازن.
- دوران، تعب، ميل إلى النوم.
- غثيان، نفقات.
- إسهال، اضطرابات في الجهاز الهضمي، ألم في البطن.
- ألم في العضلات.

اعراض جانبيّة تشارها غير معروف:

- ظهور الكلمات أكثر من المعتاد، الحالة التي قد تترجم عن الاضطرابات في خلايا الدم (انخفاض عدد صفات الدم).
 - ضعف العضلات، تقلصات، تصاسب، تشنجات.
 - التهاب العضلات.
- إذا ظهر عرض جانبيٌ، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبيّة أو إذا عانت من عرض جانبيٍ لم يذكر في هذه الشفرة، فليطلب استشارة الطبيب.
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبيّة لوزارة الصحة بوسائله الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عن العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il والذي يوجه إلى الاستمرار المطلقة للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امْنِعِ التَّسْمِمَ! هذَا الدَّوَاءُ، وَكُلُّ دَوَاءٍ أَخْرَى، يَجِدُ حَفْظَهُ فِي مَكَانٍ مُعْلَقٍ بَعِيدًا عَنْ مَتَّهُولِي الْأَلَادَ وَأَوْ دَوَاءِ الْأَطْفَالِ الرَّضِيعِ وَمَحَالِ رَوَيْتِهِمْ، وَبِذَلِكَ سَتَعْنَمُ التَّسْمِمُ. لَا تَسْتَبِّبُ التَّقْوِيَّ بِدُونِ تَعْلِيمَاتٍ صَرِيحةٍ مِنَ الطَّبِيبِ.

لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الدَّوَاءِ بَعْدَ تَارِيخِ اِنْتِهَا الصَّالِحِيَّةِ (Exp) الْمُدَوَّنِ عَلَى الدَّوَاءِ. يَشِيرُ تَارِيخُ اِنْتِهَا الصَّالِحِيَّةِ إِلَى الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ نَفْسِ الشَّهْرِ.

لَا يَجُوزُ التَّخْزِينُ فِي درَجَةِ حرَارةٍ فَوْقَ 25°C. يَجِدُ التَّخْزِينُ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَجَافٍ.

خَزْنَةٌ فِي العِبُودَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

