

2. לפני השימוש בתרופה:

X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת החומרים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6). סימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון ו/או בלשון.
- הנך בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
- הנך סובל מליקוי חמור בתפקוד הכליה או הכבד.
- הנך נוטל תרופה אחרת ממשפחת הפיראטים (כגון: קלופיראט, בזאפיראט, פנופיראט או גמפיברזיל) לטיפול ברמות שומנים גבוהות בדם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני הטיפול בליפנור, ספר לרופא אם:**
 - הנך סובל מרגישות, חולשה או כאבי שרירים.
 - הנך סובל מבעיות בכבד או כלליה.
 - הנך סובל מתת פעילות של בלוטת התריס.
 - גילך מעל 70.
 - אתה או מישהו מבני משפחתך סבל בעבר מבעיות שרירים.

ל בדיקות ומעקב:

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות של רמות השומנים בדם ותפקודי הכבד.

ל בדיקות דם

נטילת תרופה המכילה את החומר הפעיל ציפרופיראט עלולה להשפיע על בדיקות דם מסוימות. ייתכן ובתקופת הטיפול בתרופה זו הרופא יערוך בדיקות דם לצורך מעקב אחרי תפקודי הכבד.

אם בתקופת הטיפול בתרופה עברת בדיקת דם, חשוב ליידע את הרופא/האחות שאתה נוטל ליפנור.

ל אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- סטטינים - תרופות נוספות להפחתת רמת שומנים בדם כגון: סימבסטטין, אטורבסטטין, פרבאסטטין, פלווסטטין ורוזוסטטין.
- תרופות לדילול דם כגון וורפרין.
- תרופות לטיפול בסוכרת כגון אינסולין או מטפורמין.
- תרופות המכילות אסטרוגנים כגון גלולות למניעת הריון, טיפולים הורמונליים חלופיים.

ל שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

ל שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

בתקופת הטיפול, יש להגביל את צריכת האלכוהול. שתייה מרובה של אלכוהול עלולה להגביר את תופעת הלוואי של כאבי שרירים.

ל הריון, הנקה ופוריות:

אין להשתמש בליפנור אם הנך בהריון, מתכננת להיכנס להריון, מניקה או מתכננת להניק, היות ויתכן שכמות קטנה של ציפרופיראט תועבר בחלב אם.

ל נהיגה ושימוש במכונית:

יש להיזהר מנהיגה או מהפעלת מכונית מסוכנות בזמן השימוש בתרופה, אם הנך סובל מסחרחורת, נמנום ו/או עייפות.

ל מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: התכשיר מכיל לקטוז. היוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה אם הנך סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך ליבדוק עם הרופא אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: כמוסה אחת ליום (לסובלים מבעיות בתפקוד הכליות, יש להפחית את תדירות נטילת הכמוסות - ליטול כמוסה אחת לסירוגין (יום כן, יום לא)).

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

ניתן לפתוח את הכמוסה ולבלוע את כל תכולתה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה.

קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

יש להקפיד על דיאטה דלת שומן בשילוב עם פעילות גופנית והפחתת משקל לצורך הורדת רמות השומנים בדם. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא היות ומחלתך עלולה להחריף.

אין לילול תרופות ברושן! בדיקת התוית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בליפנור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.

יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם:

• מופיעות בעיות בשרירים כגון התכווצויות, כאבים או רגישות בשרירים. אלה עלולים להוביל לכשל כללייתי.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:

- מופיעה תגובה אלרגית. הסימנים כוללים: פריחה (המלווה בגרד ובגבשושיות), גרד ורגישות יתר לשמש.
- מופיעה דלקת ריאות הגורמת לקשיי נשימה, שיעול וחום.
- יש הצטלקות של הריאות הגורמת לקוצר נשימה.
- מופיעות בעיות בכבד, העוללות לגרום לגוון צהוב בעור ו/או בלחמית העיניים (צהבת).
- מופיעים כאבי בטן עזים (ברום הבטן מצד ימין), העוללים להקרין לגב ולהיות מלווים בבחילות, הקאות וחום. תופעה זו עלולה להיגרם עקב עווית המרירה או אבנים בכיס המרה.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות

ב-10-14 משתמשים מתוך 100:

- נשירת שיער, התיקחות.
- כאבי ראש, בעיות בשינוי המשקל.
- סחרחורת, עייפות, ישנוניות.
- בחילות, הקאות.
- שלשול, הפרעות במערכת העיכול, כאבי בטן.
- כאבי שרירים.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

- אין אונות.
- הופעת חבורות מוגברת מהרגיל, עלולה להיגרם עקב הפרעות בתאי הדם (ירידה בטסיות הדם).
- חולשת שרירים, התכווצויות, נוקשות, עוויתות.
- דלקת שרירים.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה

או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C. יש לאחסן במקום קריר ויבש.

אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose, maize starch, gelatin, titanium dioxide, yellow iron oxide, black iron oxide

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

כל כמוסה של ליפנור מכילה אבקה בצבע לבן ובנויה מגוף בצבע שמנת אטום וראש בצבע ירוק אטום. כל אריזה מכילה 1, 2, 3, 6, 10 מגישות המכילות 10 כמוסות בכל מגשית. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, רח' הקדמה 3, קרית מלאכי.

פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך יוני 2017 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך מרץ 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד

הבריאות: 1055628758

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

