

تيندين جل

المادة الفعالة وكميتها بوحدة جرعة:

1 غرام جل يحتوي على 1 ملغ ديميدينين ماليات

1mg/gram dimetindene maleate

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر بحسب تعليمات بند الجرعة في هذه النشرة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب أن تتوجه إلى طبيب في حال تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7 أيام.

1. لم أعد هذا الدواء؟

للتفح الجلد، الحكمة، أمراض جلد غير التهابية، حروق، لدغات الحشرات، التهاب جلدي على خلفية حساسية وأكزيما.

المجموعة العلاجية: مضاد - الهيستامين

يُعيق ديميدينين ماليات عمل الهستامين، إحدى المواد التي تتحرر أثناء ردود فعل تحسسية.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء:

- إذا وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة ديميدينين ماليات أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.
- في حالات معروفة من الحساسية للدغات الحشرات.
- على جروح مفتوحة أو ملتهبة، على اضطرابات في الجلد كالإفراوات، على انسجة مخاطية أو بجانب العينين (خاصة لدى الأطفال والأولاد الصغار).

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

تجنب الاستخدام على مساحات واسعة من الجلد، خاصة لدى الأطفال والأولاد الصغار. تجنب من تعريض المناطق التي تم علاجها لأشعة الشمس لفترة طويلة. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حكة خطيرة جداً أو آفات جلدية تؤثر على مساحات كبيرة.

يحتوي تيندين جل على بروبيلين جليكول ولذلك ممكن أن يؤدي إلى حالات تهيج جلدية موضعية.

استشر الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من سبعة أيام.

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أي مرض آخر، إذا كنت تعاني من حساسية، وخاصة من أدوية أخرى، إذا كنت قد بدأت في تناول أو استعمال أدوية أخرى عن طريق الفم أو دهون.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أدوية للاستعمال الخارجي، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
يجب عليك اتخاذ الحذر عند استعمال تيندين جل خلال الحمل والإرضاع، وعدم دهنه على مساحات جلدية واسعة، وعلى جلد مُصاب أو ملتهب. لا تستعملي الجل على الحملات أثناء فترة الإرضاع.

السيارة واستعمال الماكينات

يوجد للدواء تأثير ضئيل أو لا يوجد تأثير إطلاقاً على قدرة القيادة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي تيندين جل على بروبيلين جليكول ولذلك ممكن أن يُسبب تهيجًا موضعيًا في الجلد.

يحتوي تيندين جل أيضًا على بنز الكونيوم كلوريد الذي ممكن أن يُسبب هو أيضًا تهيجًا موضعيًا. يُمنع دهن هذا الدواء على الثديين في فترة الإرضاع لأنه يمكن للطفل أن يبلعه مع الحليب الذي يرضعه.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المُتبعَة عادة هي:

بالغون وأطفال:

يجب دهن 2 - 4 مرّات في اليوم، على المنطقة المُصابة أو بحسب الحاجة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

احرص على تناول الجرعة المذكورة في النشرة للمستهلك أو بحسب تعليمات الطبيب. إذا كنت تعتقد بأن تأثير الدواء ضعيف جدًا أو قوي جدًا، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال تيندين جل أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أوقف العلاج بتيندين جل واستشر الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت أحد الأعراض التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000: جفاف في الجلد أو شعور بالحرق.

أعراض جانبية نادرة جدًا (very rare) - تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: ردود فعل جلدية تحسسية، بما في ذلك طفح جلدي وحكة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأضرار الجانبية

من الممكن التبليغ عن أضرار جانبية عن أضرار جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أضرار جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأضرار الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

يمكن أيضًا التبليغ عن الأضرار الجانبية بواسطة البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il

5. كيف يخزن الدواء؟

• تحبّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

• يجب خزن الدواء في مكان بارد بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضًا:

Propylene glycol, carbomer homopolymer type B, disodium edetate, benzalkonium chloride, sodium hydroxide, purified water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

جل متجانس عديم اللون، صاف ولامع قليلًا.

تحتوي كل زرمة على 30 غرام أو 100 غرام.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

تريما، منتجات طبية إسرائيلية معباروت م.ض.، معباروت 4023000، إسرائيل

اسم المُنتج وعنوانه:

تريما، منتجات طبية إسرائيلية معباروت م.ض.، معباروت 4023000، إسرائيل

تمّ تحديد صيغة هذه النشرة وفحص مضمونها والتصديق عليه من قِبل وزارة الصحة في تموز 2018

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

160-62-34854-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المنكر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.