

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بأسيكلوفي، أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك مشاكل في الكلى.
- كان عمرك أكثر من 65 عاماً.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ذلك ينطبق عليك، فكلّم الصيدلي أو طبيبك قبل استعمال أسيكلوفي.

من المهم أن تشرب الماء بكثرة خلال فترة استعمال أسيكلوفي.

⚠ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

- بروبينيسيد، يُستعمل لعلاج الفرس.
- سيميثينين، يُستعمل لعلاج تقرحات المعدة.
- ميكوفينولات موفيتيل، يُستعمل لمنع جسمك من رفض الأعضاء المزروعة.

⚠ الحمل، الإرضاع والحساسية:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فتأنيّن أنك حامل أو تحطّطين للحمل، فليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

⚠ السيفلة واستعمال المكائنت:

قد تتلّأ أعراض جانبية معينة مثل الشعور بالنعاس أو الميل إلى النوم في أوقات غير فرتك على التركيز وردّ الفعل. عليك التأكّد من أنك لا تتأثر بهذه الأعراض قبل أن تقود السيارة، تشغل المكائنت أو تقوم بأي نشاط يستلزم اليقظة.

⚠ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الفرض فذلك يُعتبر خالياً من الصوديوم.

يحتوي أسيكلوفي 200 على اللاكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنّ لديك عدم تحمل لسكرات معينة، فراجع طبيبك قبل استعمال هذا المستحضر الطّي.

⚠ كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. ستعلّق الجرعة التي يتوجّب عليك تناولها بالسبب الذي من أجله تمّ إعطائك أسيكلوفي. سيحدّثك طبيبك بهذا الشأن.

قد يلزمك ذلك طبيبك جرعة أسيكلوفي الدوائية إذا:

- كان مخصّصًا لولد.
- كان عمرك أكثر من 65 عاماً.
- كانت لديك مشاكل في الكلى.
- حدّث طبيبك قبل استعمال أسيكلوفي إذا كان أحد هذه الأمور ينطبق عليك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول

• يجب تناول هذا الدواء عن طريق الفم.

• ابلع الدواء كاملاً مع القليل من الماء.

• يجب البدء باستعمال أسيكلوفي بأسرع وقت ممكن.

الهرس/ الشطر / المضغ:

• لا يجوز المضغ. القرص مخصّص للبلع.

• لا يجوز الشطر بهدف تناول جرعة أقل لأن الجرعة الدوائية في كلّ نصف قرص غير متساوية. إذا دعت الحاجة، فيمكن شطر أو هرس القرص من أجل تسهيل البلع ويجب بلع جميع الأجزاء فوراً مع الماء.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر

عادة، لا يسبب أسيكلوفي الضرر، إلا إذا استعملته بشكل مفرط طوال عدّة أيّام.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد فيجب عليك تناوله لحظة تذكرك. لكن، إذا تذكّرت ذلك قريباً من موعد تناول الجرعة القادمة، فخطّ الجرعة الفائتة.

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كلّ مرّة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات

الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقّفت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كلّ دواء، قد يؤدي استعمال أسيكلوفي إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

ردود فعل تحسّسية (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كلّ 1,000 شخص)

إذا ظهر لديك رد فعل تحسّسي، فتوقّف عن استعمال أسيكلوفي وتوجه فوراً إلى الطبيب. قد تشمل العلامات:

- طفحاً جلدياً، حكة أو شرى (توتوات مثيرة للحكة) على جلدك.
- انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من جسمك.
- ضيق التنفس، الأزيز أو صعوبات في التنفّس.
- الانهيار.

أعراض جانبية أخرى

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100

• صداع.

• شعور بالذوار.

• غثيان أو قيؤ.

• إسهال.

• آلام في البطن.

• طعم جلدّي.

• رد فعل جلدي بعد التعرّض للضوء (حساسية مفرطة للضوء).

نشرة طبّية للمستهك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986

يُوسق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

أسيكلوفي 200 ملغ أقراص

أسيكلوفي 400 ملغ أقراص

أسيكلوفي 200 - يحتوي كلّ قرص على 200 ملغ أسيكلوفير (acyclovir).

أسيكلوفي 400 - يحتوي كلّ قرص على 400 ملغ أسيكلوفير (acyclovir 400 mg).

قائمة المركبات الإضافية مفصّلة في البند 6 والبنّد "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

يحتوي هذه النشرة على معلومات مخصّصة عن الدواء. إذا توقّفت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

وصّف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للأخرين. قد يضرّهم

الدواء حتّى لو بدا لك أنّ أصلتهم الطيّبة مشابهة.

1. لأيّ عرض مخصّص هذا الدواء؟

يحتوي أسيكلوفي على الدواء المسمّى أسيكلوفير. يعمل الدواء على قتل الفيروسات أو إيقاف نموّها.

يمكن استعمال أسيكلوفي لـ:

• علاج جري الماء والهربس النطاقي.

• علاج فرحات البرد، هريس الأعضاء التناسليّة وتلوثات

الهربس البسيط الأخرى.

منع تكرار تلوثات الهربس البسيط لدى المرضى ذوي الإداء السوي لجهاز المناعة.

منع تلوثات الهربس البسيط عند الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظيفة جهاز المناعة، أي أنّ جسمهم يستضعف محاربة التلوثات.

الفصيلة العلاجية: مضادات الفيروسات.

2. قبل استعمال الدواء

⊗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كانت لديك حساسية (أرجية) لأسيكلوفير أو للألأسيكلوفير أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (المفصّلة في البند 6).

• لا تستعمل أسيكلوفي إذا كان ذلك ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، فراجع الصيدلي أو طبيبك قبل استعمال أسيكلوفي.

• حكة.

- شعور بالتعب.
- حمى مجهولة السبب (درجة حرارة مرتفعة) وشعور بالإغماء خاصةً عند الوقوف.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض

تظهر عند 10-11 مستعملين من بين 1.000

- طفح جلدي مثير للحكة وشبيه بالشرى.
- تساقط الشعر.

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر عند

10-11 مستعملين من بين 10.000

- التأثير على بعض فحوص الدم والبول.
- ارتفاع في مستوى الإنزيمات الفاعلة في الكبد.
- أعراض جانبية نادرة جدًا (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000
- انخفاض في عد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).
- انخفاض في عد خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء).

- انخفاض في عدد الصفيحات الدموية (الخلايا المساعدة في تخثر الدم) (قلة الصفيحات).
- شعور بالضعف.

- شعور بعدم الهدوء أو بالارتباك.

- ارتجافات.

- هذيان (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة).

- اختلاجات.

- شعور بالنعاس أو ميل غير اعتيادي إلى النوم.

- انعدام التوازن عند المشي وانعدام التنسيق الحركي.

- صعوبة في التكلم.

- انعدام القدرة على التفكير أو اتخاذ القرارات بوضوح.

- فقدان الوعي (غيبوبة).

- شلل في جزء من جسمك أو في كل جسمك.

- اضطرابات سلوكية واضطرابات في التكلم وحركات العين.

- تصلب في الرقبة وحساسية للضوء.

- التهاب في الكبد (هيباتيتيس).

- اصفرار في جلدك وفي بياض عينيك (يرقان).

- مشاكل في الكلية تجعلك قليل التبول أو لا تتبول إطلاقاً.

- آلام في ظهرك السفلي، في منطقة الظهر التي تتواجد فيها كليتك أو فوق الحوض (آلم كلوي).

- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية

- أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة،

- فطلي استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة

بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية

عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع

وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه

إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن

طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(EXP) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على: أسيكلو-في 200:

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

أسيكلو-في 400:

Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أسيكلو-في 200: الأقرص بيضاء، محدبة من كلا الجانبين.

أسيكلو-في 400: الأقرص بيضاء، محدبة من كلا الجانبين مع خطٍ للشطر.

يتمّ التوريد بالأقرص في عبوة كرتونية تحتوي على 2، 10، 20، 25، 30، 60، 70 أو 100 قرص في شرائط حويصلات.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

المنتج/صاحب الامتياز: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض.، قريات مألخ

صيغت هذه النشرة في تاريخ 05/2020 مثلما حدّدت

وزارة الصحة ومحتواها مطابق لنشرة المستحضر

الأصلي، التي فحصت وأقرّت من قبل وزارة الصحة في 01/2017.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

أسيكلو-في 200: 1186228104

أسيكلو-في 400: 1186328105

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصص لكلا الجنسين.

