

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשמ"ו 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אציקלו-וי 200 מ"ג טבליות

אציקלו-וי 400 מ"ג טבליות

אציקלו-וי 200 - כל טבליה מכילה 200 מ"ג אציקלוביר (acyclovir 200 mg).

אציקלו-וי 400 - כל טבליה מכילה 400 מ"ג אציקלוביר (acyclovir 400 mg).

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6 וסעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אציקלו-וי מכילה תרופה הנקראת אציקלוביר. היא פועלת על ידי קטיילה או עצירת הגדילה של נגיפים.

אציקלו-וי יכולה לשמש ל:

- טיפול באבעבועות רוח ובשלבקת חוגרת.
- טיפול בפצע קור, בהרפס של איבר המין ובזיהומים אחרים של הרפס סימפלקס.
- מניעת חזרה של זיהומי הרפס סימפלקס בחולים עם מערכת חיסונית תקינה.
- מניעת זיהומי הרפס סימפלקס באנשים שהמערכת החיסונית שלהם מתפקדת פחות טוב, כלומר הגוף שלהם פחות מסוגל להילחם בזיהומים.

קבוצה תרפויטית: אנטי ויראליים.

2. לפני שימוש בתרופה

✘ **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לאציקלוביר או לואלאציקלוביר או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

אל תיקח **אציקלו-וי** אם זה חל עליך. אם אינך בטוח, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת **אציקלו-וי**.

✘ **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:** לפני הטיפול באציקלו-וי, **ספר לרופא אם:**

- יש לך בעיות ליה.
- אתה מעל גיל 65 שנים.

אם אינך בטוח אם אלה חלים עליך, דבר עם הרוקח או הרופא שלך לפני נטילת **אציקלו-וי**. חשוב שתשתה הרבה מים בזמן נטילת **אציקלו-וי**.

✘ **אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות:**

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,

תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- פרובנצידי, משמשת לטיפול בשיגדון.
- סימטידין, משמשת לטיפול בכיבי קיבה.
- מיקופנולאט מופטיל, משמשת למנוע מגופך לדחות איברים מושתלים.

✘ **הריון, הנקה ופוריות:**

אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

✘ **נהיגה ושימוש במכוונת:**

תופעות לוואי מסוימות כמו תחושת נמנום או ישנוניות עלולות לפגוע ביכולת שלך להתרכז ולהגיב. עליך לוודא שאינך מושפע מתופעות אלה לפני שאתה נוהג, מפעיל מכוונת ובכל פעילות המחייבת ערנות.

✘ **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ועל כן נחשבת נטולת נתרן.

אציקלו-וי 200 מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תכשיר רפואי זה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המנה שאתה צריך לקחת תהיה תלויה בסיבה שלשמה **אציקלו-וי** ניתנת לך. הרופא שלך ישוחח איתך על זה.

יתכן שהרופא שלך יתאים עבורך את מינון האציקלו-וי אם:

- היא מיועדת לילד.
- אתה מעל גיל 65 שנים.

יש לך בעיות כליה.

דבר עם הרופא שלך לפני נטילת **אציקלו-וי** אם אחד מעלה לך עליך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש לקחת תרופה זו דרך הפה.
- בלע את התרופה בשלמותה עם מעט מים.
- יש להתחיל לקחת **אציקלו-וי** בהקדם האפשרי.

כתישה/חצייה/לעיסה:

- אין ללעוס. הטבליה מיועדת לבלעיה.
- אסור לחצות על מנת ליטול מנה מופחתת כיוון שהמינון אינו שווה בכל חצי טבליה. במידת הצורך, ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה על מנת להקל על הבליעה ויש לבלוע מיד את כל החלקים עם מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אציקלו-וי אינה מזיקה בדרך כלל, אלא אם לקחת יותר מדי במשך מספר ימים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול ברגע שאתה נזכר. אולם, אם נזכרת קרוב למועד לקחת המנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה.

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

אין להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

יש לקחת תרופות בחושך! בדוק התוויות

והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש ב**אציקלו-וי** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל

תיבהל למקרא תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות אלרגיות (עשויות להופיע בעד 1 מכל 1,000 אנשים)

או יש לך תגובה אלרגית, **הפסק לקחת אציקלו-**

וי ופנה מיד לרופא. הסימנים עשויים לכלול:

- פריחה, גרד או חרלת (גבשושיות מגרדות) על העור שלך.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים של הגוף שלך.

- קוצר נשימה, צפצפונים או קשיי נשימה.
- התמוטטות.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10 1 משתמשים מתוך 100

- כאב ראש.
- תחושת סחרחורת.
- בחילה או הקאה.
- שלשול.
- כאבי בטן.

- פריחה.

- תגובה עורית לאחר חשיפה לאור (רגישות יתר לאור).
- גרד.
- תחושת עייפות.
- חום לא מוסבר (טמפרטורה גבוהה) ותחושת לעפון, במיוחד כאשר נעמדים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10 1 משתמשים מתוך 1,000

- פריחה מגדרת דמוית חרלת.
- נשירת שיער.

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10 1 משתמשים מתוך 10,000

- השפעות על בדיקות דם ושתן מסוימות.
- עלייה באנזימים הפועלים בכבד.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות בכוחות ממשמש 1 מתוך 10,000

- ירידה בספירת תאי הדם האדומים (אנמיה).
- ירידה בספירת תאי הדם הלבנים (לויקופניה).
- ירידה ממספר החסיות (תאים העוזרים לדם להקשר) (טרומבוציטופניה).
- תחושת חולשה.
- תחושת אי שקט או בלבול.
- רעידות.

- הזיות (ראיה או שמיעה של דברים שאינם קיימים).
- פרכוסים.
- תחושת נמנום או ישנוניות לא רגילה.
- חוסר יציבות בעת הליכה וחוסר קואורדינציה.
- קושי בדיבור.
- חוסר יכולת לחשוב או לשפוט בבהירות.
- אובדן הכרה (תרדמת).

- שיתוק של חלק או של כל גופך.
- הפרעות בהתנהגות, בדיבור ובתנועות העין.
- קשיון בצוואר ורגישות לאור.
- דלקת בכבד (הפטטיס).
- הצהבה של עורך והחלק הלבן של עיניך (צהבת).
- בעיות כליה בהן אתה נותן מעט שתן או בכלל לא.

- כאבים בגבך התחתון, באזור הגב שבו ממוקמת הכליה שלך או מעל אתה הירכים שלך (כאב כלייתי).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

מ-25°C

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: **אציקלו-וי 200:**

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

אציקלו-וי 400:

Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אציקלו-וי 200: טבליות לבנות, קמורות משני הצדדים.

אציקלו-וי 400: טבליות לבנות, קמורות משני הצדדים עם קו חציה.

הטבליות מסופקות באריזת קרטון המכילה 2, 10, 20, 25, 30, 60, 70 או 100 טבליות באריזת בליסטר.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

קרית מלאכי **היצרן/בלעל הישום:** כצט תעשיות כימיות בע"מ,

עלון זה מתאריך 05/2020 הינו פורמט שנקבע ע"י משרד הבריאות וותוכנו תואם לעלון תכשיר המקור שנבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך 01/2017.



LFL 014 05/20

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: **אציקלו-וי 200:** 1186228104 **אציקלו-וי 400:** 1186328105
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.