

פונגיניל

לק טיפול בציפורניים

כל 1 גרם מכיל: 80 מ"ג ציקלופירוקס (Ciclopirox).
חומרים בלתי פעילים ואולרגנים ראה בתרופה - ראה טעף 6 בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה.

היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
שמור על עלון זה, ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בזיהומים פטרייתיים של הציפורניים.

קבוצה תרפויטית: תרופה אנטימיקוטית (אנטי פטרייתית) מקבוצת ההידרוקספירידון.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל ציקלופירוקס או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טעף 6 בעלון).
- אם הנך בהריון או מניקה.
- בילדים מתחת לגיל 12.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בפונגיניל ספר לרופא אם:

- הנך רגיש למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי.
- יש לך סוכרת ואתה מטופל באינסולין.
- יש לך ניוורפיית סוכרתית או שיש לך בעיות נימול באבצעות הרגליים או הידיים.
- הנך סובל או סבלת בעבר מדיכוי מערכת החיסון (לדוגמה אם עברת השתלה).
- הנך נוטל תרופות לאפילפסיה.
- הנך משתמש בקורטיקוסטרואידים לשימוש טופיקלי באופן קבוע (על בסיס חודשי).
- הנך משתמש באופן קבוע במשאפים המכילים סטרואידים.

התרופה מיועדת למריחה על הציפורניים ועל העור הסמוך אליהן בלבד. התרופה אינה מיועדת לשימוש בעיניים או בפה, לשימוש תוך-נרתיקי או למריחה על גבי העור (מלבד העור שסביב הציפורן הגנועה).

• הזרות דומי, קדי, יש לשמור מפני אש. אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התרופה.

יש להימנע ממגע התרופה עם העיניים והרקמות הריריות. במקרה של מגע עם העיניים, יש לטשוף היטב עם מים לזמן ממושך. אין למרוח לק או מוצרים קוסמטיים אחרים על הציפורן הגנועה במהלך השימוש בתרופה.

יש להימנע ממגע התרופה עם עור, פרט לעור הסמוך לציפורן. אם הנך סוכרתי או סובל מניורפיית סוכרתית, עליך לידע את הצוות הרפואי בכדי להחליט כיצד להסיר ו/או לגזור את הציפורן הגנועה.

אינטראקציות ותגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אין למרוח לק או מוצרים קוסמטיים אחרים על הציפורן הגנועה במהלך השימוש בתרופה.

ללא מומלץ להשתמש בו זמנית בפונגיניל ובתרופות אנטי פטרייתיות לטיפול מערכת.

הריון והנקה

אין להשתמש בתרופה אם הנך בהריון או מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבלוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל הוא:

יש למרוח שכבה אחידה עם המברשת פעם ביום, רצוי בערב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים והרקמות הריריות. במקרה של מגע עם העיניים, יש לטשוף היטב עם מים לזמן ממושך. אין למרוח לק או מוצרים קוסמטיים אחרים על הציפורן הגנועה במהלך השימוש בתרופה.

יש להימנע ממגע התרופה עם עור, פרט לעור הסמוך לציפורן.

אופן השימוש:

לפני התחילת הטיפול עם התרופה, יש לגזור עם מספרים ככל שניתן את הציפורן הגנועה ולשייף בעזרת פצירה חד פעמית.

יש למרוח שכבה אחידה על שטח הציפורן ועל העור הסמוך לציפורן (5 מ"מילימטר).

במידת האפשר, יש למרוח על העור שמתחת לציפורן ומתחת לשטח הציפורן. מגע עם העור שמסביב עלול לגרום לגריון ו/או אדמומיות קלים.

להשתג התועלת המריבת מהטיפול, יש צורך להסיר את החלקים הגנועים בציפורן פעם בחודש על ידי איש צוות רפואי.

במשך כל תקופת הטיפול יש למרוח על השכבה הקודמת ולהסיר את שכבות הלק פעם בשבוע בעזרת תכשיר קוסמטי להסרת לק,

כגון אצטון, על מנת לאפשר חדירה של החומר הפעיל, ולשייף את שטח הציפורן עם פצירה חד פעמית. אין להסיר את הלק על בסיס יומיומי. אין להשתמש בלק קוסמטי.

- משך הטיפול בתרופה תלוי בחומרת הזיהום ובאזור הגנוע.
- לציפורני הידיים משך 3 חודשים. לציפורני הרגליים משך 6 חודשים. אין להמשיך טיפול מעבר ל- 6 חודשים.

האשמה בטעות במינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

כיצד תוכל לסייע בלחצות הטיפול

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הגנוע.

יש לרחוץ את האזור הגנוע לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול בלק, ניתן להשתמש באבקה נגד פטריות כדי לייבש את המקום.

אם הטיפול בציפורני הרגליים - יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש במיוחד בין הבוהנות. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה; יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה).

בעונות המתיאמות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפונגיניל עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבהר למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול משיא אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם מתפתחת תגובת רגישות או גריון כימי לתרופה או אם אתה סובל מתגובה חריפה של העור באזור השימוש, כגון: אדמומיות, תחושת צריבה, עקצוץ, היצורצות שלפוחיות, התנפחות, פריחה או קילוף (נדיר) (תופעות מתרחשות ביותר מ- 1 מתוך 10,000 מטופלים ובפחות מ- 1 מתוך 1,000 מטופלים).

יש לפנות לרופא במקרים של: גירוד או הפרשה באזור השימוש. תופעות לוואי נדירה נוספת: תגובה אלרגית המתבטאת בדלקת עורית באזור השימוש.

תופעות לוואי נדירות מאוד (מתרחשות בפחות מ- 1 מכל 10,000 מטופלים): אדמומיות והתקלפות העור סביב הציפורניים, אם התרופה באה במגע עם העור שמסביב לציפורן.

תופעות לוואי נוספות: פריחה המתבטאת באדמומיות מתונה וחולפת מסביב לציפורן או אדמומיות בקפל העור שמסביב לציפורן. כמו כן, ייתכנה הפרעת בציפורן הכוללות: שינוי בצבע ובצורת הציפורן וציפורן חודרנית.

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות חמישה דרכי הקישור: "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה:
www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה ותוית הבקבוקון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן באריזה המקורית, במקום קריר וחסוך תפוגה ל- 25°C.

• לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.

• יש לסגור היטב כדי למנוע חדירת אור ורטיבות.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Isopropyl alcohol, Ethylacetate, Gantrez ES-435

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוקון המכיל 6.6 מ"ל נוזל ומברשת למריחה.

• בעל הישום ותכונותיו: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רח"ת קפ" 1, שוהם.

• שם היצרן: חברת פריגו, אלגאן, מיישיגן, ארה"ב.

• מייצר עבור: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: פברואר 2016.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 14690.33500

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.