

מיקוניל

לק לטיפול בциיפוריוניים

כל 1 גרם מכיל: 80 מ"ג ציקלופiroוקס (Ciclopirox).

חוורמים בלתי פעילים ואלרגניים בתורופה – ראה סעיף 6 לעיל.

קרא בעין את העלון עד סוף בטוטם תשתמש בתורופה עליון זה מייל מידע תفصיל על התורופה. אם יש לך שאלות מוסיפות, פה אל הרופא או אל הרוקח.

הטורופה עצמה כבנה. מיעוטם לילדים מוחתת לגיל 12. עליון לשימוש בתורופה עצמה כבנה.

הוועץ ברוקח אם הנר דזק למיעוד נסוב.

שמור על עילון זה, יתוך ווצטרר לקלרא בו שוב.

1. מה מיעוטת התורופה?

הטורופה מיועדת לטיפול ביוחומים פטריטיים של הציפורניים.

קבוצה טיפולית: תורופה אנטימיקוטית (אנטי פטריטית) מקבוצת החוירוקספידיון.

2. לפניו שימוש בתורופה

א אין לשימוש בתורופה:

- אם אתה או רגש (אלרגיה) לחומר הפעיל ציקלופiroוקס או כל 6 בלבול).
- אם הנר בהריון או מניקה.
- וילדים מתחת לגיל 12.

א אין לשימוש בתורופה לשימוש בתורופה:

- **לפני הטיפול במיקוניל ספר לרופא אם:** הרופא רשאי לשלוח או לתורופה להשלחה.
- **יש לך סוכרת ואתה מטופל באינסולין:** יש לך סוכרתית או אשי לש בעית נימול באכבות.
- **הנر סובל או סבלת בעבר מודמי מרכיב החיסון (לדוגמא אם עברת השחללה).**
- **הנר נועל תרופות לאפירופסיה:** הנר משתמש בקורטיקוסטרואידים לשימוש טופיקלי באפונים (על בסיס חודשי).
- **הנר משותם באפונים קבועים בעיניים או פה, לשימושם או פה, תרין-נרטיקי או למוראה על גבי העור (מלבד העור שסביר החיפוש הנגעה).**

א אין לשימוש בתורופה לאירוע דליק סיגרי:

- ש להימנע מגע התורופה עם העיניים והרקמות הריריות במכרה של מעון לך או מוציאים קוסמטיים אחרים על הציפורן הנגעה במהלך השימוש בתורופה.
- ש להימנע מגע התורופה עם עוו, פרט לעור הסמור לפיצוף.

א או ליחשך לאש עד ליבוש מוחלט של התורופה:

- אם תריר או מוציאים קוסמטיים אחרים על העור הסמור לפיצוף.
- אם הנר סוכרת או סובל מנירופטיה סוכרתית, עליך לדעת את הוראות הרפואין בכדי להחליט כיצד להסרה או לא לגורו את הציפורן הנגעה.

א אנטרקטזיות/הגבות בין תרופות:

- אם אתה או מושך קולחת לאחורה, תרופות אחרות כל-תורופות לאושם וטוטפי חזה, ספר ערך לרופא או לוקת.
- און לרופא לך או מוציאים קוסמטיים אחרים על הציפורן הנגעה במלרק השם בתורופה.
- לא מומלץ לשימושם במקוניל ובתרופות אנטי פטריטיות לטיפול מערצתן.

ג הרין והגינה

אין לשימוש בתורופה אם הנר בהריון או מניקה.

3. כיצד תשתמש בתורופה?

עליך לדנקו או הרופא או הרוקח אם אין בוטה.

הימון המקביל הוא:

יש למרוח שכבה אחורית עם המברשת פעם ביום, רצוי בערב.

אין לעבו על המנה הממלצת.

אין לבלוע, לשימוש חיצונו בלבד.

ש להימנע מגע התורופה עם עוו, פרט לעור הסמור לפיצוף, עם העיניים, יש לשטוף העין עם מים לפחות ממושך. אין למרוח כל שמן או מוציאים קוסמטיים אחרים על הציפורן הנגעה במהלך השימוש בתורופה.

ש להימנע מגע התורופה עם העור שמתחת לפיצוף ומוחתת בשעת ח齊ות, מגע עם העור שמסביב לעול לרגום ליגרוי או אנטומוניות קלים.

להשגת התוצאות המירובית מהטיפול, יש כורך להסיר את החלקים הגיגיים ביציפוריים עם בחושך על ידי אישוש רופאי.

במשך כל התקופת הטיפול יש לרוח על השכבה והקומות והסtier את שכבות הלק פעם בשבעה בעדרת תכשיר קוסטמי להסרת לין,

כגון אצטון, על מנת לאפשר חדירה של החומר הפעיל, ולשי"ר את שטח הציפורן עם צירריה חד פעמי. אין להסיר את הלק על בסיס יומיומי. אין להשרותם בלק קוסטמי.

- משורט הטיפול בתורופה תליי בחומרה היהום ובאזור הגנגז.
- ציפוריוניים רבים ירוי לשימושם במשך 3 חודשים. לסייעו הרגליים רצוי להשרותם במשך 6 חודשים. אין להמשר טיפול מעבר ל- 6 חודשים.

אם השתמשת בטוטם במינון גבוה יותר או אם בטוטם בעל יכולת אחריה נזקן הגנגז ובאזור הגנגז, אין שמשרתו של בית החולים והבא את אירוסת התורופה אתך.

כיצד תוכל לשיער האצלחת הטיפול?

לחותה מוגדרת כתיקת אציתות הפטרויל, لكن יש לשמור על יובש מקום הגנגז. יש לרוח את האצור הנזקן לפני מליחת התורופה. בין טיפות טוליפול, נילק, ניתן לשימושם בากנה וכן פוריות כדי ליבש את המקלם.

אם הטיפול בציפוריוניים – יש להקפיד על רוחצה יבש וbos במינון דבון הבהירונות. רצוי לשימושם בගברים מוכתנה; ש להמנע מגירבים מצער או מוחרים סיטטיטים. רצוי להקלילם מספר פעומים ביום (לפ"ט כמות חוץ).

בעונת המזג האוויר מומלץ לשלול סנדלים ללא גרבים. אין לטלוט תרופות בחולן בזקן בזקן בזקן. שחקן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר דזק להם. אם יש לך שאלות מסוימות בעונת שימוש בתורופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, קיומו במיקוניל עלול לגרום לתופעות לוואי. בתחום המשתרע מילויו של העור באור שמיושם, כגון: אדמומיות, חותשת צריבה, עקצוץ, יוויזורות שלפוחיות, התנפחות, פריחה או קוליף (דר'ן) (תופעות מתהברחות בבורר מ- 1 מטרו 10,000 טופלים) ובכוחות מ- 1,000,000 טופלים).

יש לנפנוט לרופא במקרה של: גירוד או הפרשה באזורי השימושים. תופעות לוואי הרווחה ונוספת: תוגובה אלרגיות המתבטאת בדלקת עורית באזורי השימושים.

10,000 תופעות לוואי ידירות מודע (מתהברחות בפחות מ- 1 מילון טופלים) ולו אידירות מודע (מתהברחות בעקבות העור סכיב ציפוריוניים, אם התורופה באהגה עם העור שמסביב לציפוריון). תופעות לוואי נסובט: פריחה המתבטאת באדמניות מוגנה וחולפת מסביב לציפוריון או אדמומיות בקפל העור שמסביב לציפוריון. כמו כן, תינוקת הרכעות ציפוריון: שני בצעב ובצורת הציפורן ציפוריון חרודין לוואי.

אם חוויה נזקנית לוואי, אם אתה מטופעת הלוואי, מוחירה, אז כאשר אתה שולח לרופא ומציין תופעות הלוואי, עליון להתייעץ עם הרופא.

5. דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לוויות על תופעות לוואי למשדר הבריאות באמצעות לחיצה על הקושוק "דיז'ו" על תופעות לוואי עוקב טיפול תרופת" (il) www.health.gov.il: המפנה לאוטו;

המקון לדווח על תופעות לוואי, או ע"י כopic להקלושו:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בגונס, ניתן לדוחו לחברה פריגו באמצעות התגובה הבאה:

www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התורופה?

מן הרלוונטי הרופאים זה ולו תרופה אחרת שי לשמרם במקומם סוגר מוחץ לשאול ראיות והשיידם של לילום / או תינוקת ועל ידי קר תמען הרעליה. אל תגרום להקלאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין לשימוש בתורופה אחר תאריך התופה (exp. date) המכונף על גב האריה ותוקית הבקבוקן. תאריך התופה מחייב למשך החזרה של אותו חודש.

אחסן באירוע המוקורי, במקום קירור וחושך מוחתת - 25°C. לא לאחר פירטה הדרישה להשרותם במשך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התופה.

יש לסגור היבט כדי למנוע חירית אויר ורטיבות.

6. מידע נוספים

נסף על החומר הפעיל התורופה מכילה גם: Isopropyl alcohol, Ethylacetate, Gantrez ES-435

כיצד לנأتي התורופה ונוהת תונן האיזה: בקבוקן המכיל 6.6 מ"ל מ"ל ועוד וברשות מרורה.

בעל היישום והתגובה: פריגו ישראלי סוכניות בע"מ ר"ה ר' רקפת, 1, שוחם.

שם יצרן: עליון זה נדקך ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: פברואר 2016.

מספר רישום התורופה בנקס התרופות הממלכתי במסדר הבריאות: 14171.31856

לשפט הפשטות ולהקלת הקירניה, עלון זה נוסח בלשון זכר. אף זאת, התורופה מיועדת לשני המינים.