

الحمل، الرضاع والخصوصية:
لا تستعمل الدواء إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو إذا كنت مرضعاً، إلا إذا استشرت طبيبك بخصوص الخطر المغلوط المفهوم الذي يستعمال هذا الدواء.

استعمال الأدوية التي تتمنى إلى هذه الفصيلة (مضادات الاكتئاب) قد يؤثر على الرضاعة العلامة لطفلك الرضيع
إذا كنت تلتقين العلاج بالدواء وتحافظين للحمل أو كنت حاملاً، فلا توافق العلاج على ثبات نفسك بل استشيري الطبيب.
قد توفر الأدوية مثل باروبتين على المدى، قد تقل الحصوية لدى بعض الرجال خلال فترة استعمال الدواء.
في الاحاث التي أجريت، شوهد ارتفاع في العوب المفهوم والتحميم
العيوب الطبيعية، عندما استعمل الدواء خلال أشهر المولود النموي
بالإضافة إلى ذلك، شوهدت صاصفة فطام يرتبط بالحمل.
المستعمال لدى المراهقين المولود من استعمال النساء الحوامل لـ SSRI's (ما في ذلك باروبتين)، كذلك في الحالات التي استعمل فيها النساء خلال فترة الحمل، تم اثنيلج عن حالات ولادة مركبة، على الرغم من أنه ليس معروفاً ما إذا كان الأمر ينبع من استعمال الدواء.

إذا استعمل النساء خلال فترة الحمل كلها حتى الولادة فقد تنشأ الاعراض الجانبية التالية لدى المولود، على الرغم من أنه ليس معلوماً ما إذا كانت هذه الاعراض ناجمة من استعمال الدواء:
صعوبات في النوم، كدأ متواصل، عدم اليقوع، صعوبات في الاطعام، ميل مفترط إلى التبول، ارتعاش، تعرّق، متلازمة متخفض للسكر في النساء، صعوبات في التتفق، توفر لون الجلد إلى الأزرق/ البنفسجي، تشنحات، فرط أو نفس التوتر المضلي، صعوبات في ضبط درجة حرارة الجسم، هذه الاعراض عابرة، إذا زرت طفال الرضيع بهذه الاعراض، فيجب استشارة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن.

متلازمة السرور وتوين، وهي مرتفعة، عصبية، تعرق، تزداد المعنكبات، ارتفاع نظم القلب، عدم الهدوء، ارتياح ارتجاع أو تقصص شديد في العضلات، توفر جفوناً إلى الطبيب.
السيافة واستعمال الماكولات:
استعمال هذا الدواء قد يقلل النفحة والذائق يتوجب الحصول عند قيادة السيارة، تشتيت الماكولات الخطرة، وتدن القيام بأي شأني يطلب النفحة.

بالنسبة للأولاد، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقارب من الشارع وما شابه ذلك.

3. كف تسعيف باروبتين
يجب استعمال باروبتين دواماً بموجب تعليمات الطبيب، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متancock من المعرفة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية:
الجرعة الدوائية تحسب تعليمات الطبيب فقط، يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
هذا الدواء غير مخصوص عادة للأولاد والأطفال الرضع، كما تحد من قبل الطبيب المعالج.

كيفية التناول: يجب ابتلاع الدواء مع التلقيح من الماء، يفضل تناول الدواء مع وجة الأطفال.
(بروس/ الشفارة/ المضخة)
عند الحاجة، يمكن هرس القرص وبلعه فرماً مع الماء.
يذكر شطر الدواء.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوفر جفوناً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأعطيه الماء.
إذا تناولت هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب عليك تناول الجرعة صباح الغد. لا يجوز بتاتاً تناول جرعتين معاً.

يجب عليك إبلاغ طبيبك إذا ظهرت بعض الأعراض الجانبية المفتعلة أو إذا تفاقمت.
لا توفر معلومات بخصوص التأثيرات الطويلة الأمد على النمو والتطور، المولود، السلوك المعرفي والتطور السلوكي في هذه الفترة المبكرة.

الفوتوغرافية والمتانعة:

يوصي باستعمال مثقب العلاج وأفراد عائلاتهم المتغيرات السلوكية مثل، تقايق الانحرافية، الأفكار الانتحارية، العداية والبغضاء وذلك إذا طرت تغيرات كهذه في برنامج العلاج بالغير.
يجب الحصول على أيدي العلاج المقتنعين الذين تناولوا أمراضاً مماثلة، مثل المعلومات المنسقة من الجراح المولود، أن يتحققوا من جمع الأفقيين الذين تناولوا أمراضاً مماثلة، مثل العلاج بالغير، خاصة أولئك الذين يعيشون على مداري الأكتئاب، قد يكونون أكثر عرضة لخطر تطور السلوكي الانتحاري (تشمل محوارات الانتقام) عندما تلقون العلاج بالدواء.
معظم محوارات الانتقام، التي شوهدت في تناول العلاج عن الأكتئاب، كانت لدى المرضى الذين تناولوا علاج مماثل بين 18 و30 سنة.

شوهت ازياز في تشويف الأعراض الجانبية مثل: محاولة الانتحار، الأفكار الانتحارية والعداية لدى المراهقين والبالغين الذين يعيشون أو يبدون، ومنع عورتها من جيد. علاج أمراض رهاب المكان أو المواقف (OCD - Obsessive Compulsive Disorders) وكذلك اضطرابات المكان مع رهاب المكان أو المواقف (Social phobia)، حالات اضطراب الكرب التالي للرضاخ (Post traumatic stress disorder)، Generalised anxiety disorders).

الاعراض المصاحبة للدواء:

إذا كنت تتناول الدواء، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية يبون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخير الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة إذا كنت تتناول:
أدوية توفر حرجة الجهاز الهضمي المركزي (مثل: أدوية مهدئة، ملونة، أدوية علاج الباركنسون - مثل بروسبكتاين وآدوية

علاج المرض:

أدوية مضادة للذهان
أدوية مضادة لتوتر الدم
أدوية مضادة للاكتئاب
ترامادول
St. John's wort
لينيون

تربيوفان - حمض أسيتيك يتوارد في الأمعاء، محاليل التسرير

العنيفة والاضطرابات العصبية

أدوية مساندة لتخفيف الداء

أدوية مساندة للاكتئاب

ترامادول

أدوية مساندة لـ St. John's wort

أدوية للسيپريدين من فصيلة الـ tricyclics مثل سوماتريبتان

تربيوفان - حمض أسيتيك يتوارد في الأمعاء، محاليل التسرير

أدوية مساندة لتخفيف الداء

أدوية مساندة لـ St. John's wort

أقرأ النشرة على ياعانتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من الحاكم، لا تطهه الآخرين. قد يضر بهم الدواء حتى لو بدا لك أن حاتمهم المائية مشابهة.

تزيد الأدوية المضادة للأكتئاب والقلق من خطر حدوث تصرفات أو أفكار انتحارية لدى الأولاد، المراهقين والبالغين الذين شوهدوا لا تزيد عن 25 سنة.
عند الذهاب بالدواء، يجب على مثلك العلاج من جميع الأعمار وأفرادهم أن يتبعوا التغيرات السلوكية مثل: تناقص الأفكار الانتحارية، العداية وما شابه ذلك.
إذا حدث تغيرات كهذه، فيجب التوجيه فرواً إلى الطبيب.

لای عرض مخصوص هذا الدواء؟

الدواء مخصوص لعلاج أعراض الأكتئاب على جميع أنواعه، بما في ذلك الأكتئاب المصحوب بالقلق، ولمنع عودة الأضطرابات.

OCD - Obsessive Compulsive Disorders (أكتئاب انتظامي)
الحالات التي لا يزيد عمرهم عن 24 سنة، الذين استعملوا أدوية مضادة لـ OCD.

الاعراض المصاحبة للدواء:
الاعراض المصاحبة للدواء أو الداء المترافق معه:
أدوية توفر حرجة الجهاز الهضمي المركزي (مثل: أدوية مهدئة، ملونة، أدوية علاج الباركنسون - مثل بروسبكتاين وآدوية

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• وجدت حساسية مفرطة معلومة لـ أحد مركبات الدواء أو إذا حدث لديك رد فعل تحسسي على أحد مركباته.
• كنت تلتقي للاجأ مترافقاً معاً بأدوية من فصيلة مثبطات موتو أوكسيكسيدار (الأكتئاب) أو أنهيت العلاج بها قبل أقل من 14 يوماً، أو بمحض حظي اسمه زيفوكسيد (بيفوكسوليد).
• كنت تلتقي للاجأ مترافقاً معاً ببيموزيد.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

لا يجوز التوقف عن استعمال هذا الدواء بشكل جhani دون استشارة الطبيب!
هذا خطر أكبر لحدث كسور في العظام لدى مثلك العلاج الذين يستعملون أدوية من هذا النوع. يزداد هذا الخطر في المراحل المبكرة من العلاج.

قبل العلاج باروبتين، أخير الطبيب إذا:

• كنت تعاني أو عانت من خلل في وظيفة القلب وأو

• كنت تعاني من الصداع، الكلايد، الجهاز البولي، الكبد.

• كنت تعاني من الآلام الممهورة أو حالت تنفس التي تتشابه بسهولة

أو إذا كنت تستعمل دواء يفاقم التنفس المتمدد.

• تم تشخيص مرض القصام لديك وتلتقي علاجاً دوائياً له.

• كنت تحسيني إذاعة ما أو لـ الداء ما.

3. الأدواء والمعارف عنها:

هذا الدواء غير مخصوص عادة لـ الأولاد والراهقين دون سن 18.

شوهت ازياز في تشويف الأعراض الجانبية مثل العلاج بالغير.

دون سن 18، الذين استعملوا هذا الدواء، على الرغم من ذلك في صالحهم.

إذا وصف لك الطبيب هذا الدواء وكانت ترغب بالحديث معه - فراجع الطبيب مجدداً.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة المساعدة

1986 (مستحضرات)

يسوؤى هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط
المادة الفعالة وشكل وعياره:
كتيري كل قرص من باروبتين 20 ملجم أقراص

(كبيرولوكوريد) 20 ملجم على: باروبتين 20 ملجم

Paroxetine (as Hydrochloride) 20 mg
المواد غير الفعالة ومساويبات الحساسية (انظر البند (6))

CDS

LFL 002 05/20

6- معلومات اضافية
 يحتوي الدواء بالإضافة إلى المركب الفعال أيضًا على:
 Calcium hydrogen phosphate dihydrate,
 povidone, starch, magnesium stearate, white
 opadry, macrogol.

كيف يبدو الدواه:
 قرص مستدير مع خط للشطر في جانب واحد، أبيض اللون.
 10، 15، 20، 30، 50 أو 60 قرصاً في العبوة. قد لا تنسو
جميع أحجام العبوات.
الجهة المصنعة وصاحب الامتياز: كـ صن للصناعات الكيميائية
 م.ض.، ص.ب.، 385، كريات ملادخي.
 صممت هذه النشرة في أيار/مايو 2010
 حتىتها وزارة الصحة ومحوّلها طابق لنشرة المستحضر الأصلي،
 التي فحستها وأقرت من قبل وزارة الصحة في
 كانون الثاني/يناير 2010.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
 133-48-31068-00
 من أجل التبسيط والسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة
 المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكلاجينيين.

إذا توقفت عن تناول الدواء
حتى لو رأي تحسن على حالي الصحية، فلا يجوز التوقف عن
الدواء بالدواء بشكل فجائي دون استشارة الطبيب.
لا يجوز تناول الأدوية في المفاجأة! راجع الملخص وتأكد من الجرعة
في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت
تحاجة لها.

4. الأعراض الجانبية

كذلك مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال باروتين إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لافتًا عند فراء قائمة الأعراض الجانبية:

- عدم الانتباه من أي واحد منها.
- ارتعاش، نفقات، غثيان، تقيؤات، ارتعاش، عدم التوازن (shaky)،
- الصداع، امساك، رؤية مغلوطة (الغثة، الدفت المدبر)، إسهال، مول إلى النوم،
- ارهاق، امساك، رؤية مغلوطة، تعرق، دوران، انعدام الشهية، عدم القدرة على النوم،
- ارتفاع مستوي الكوليستيرول في الدم، ارتفاع الوزن، صداع، توسيع الحدقين.

الأعراض الجانبية التي تستوجب اهتمامًا خاصًا:

أعراض نادرة - راجح الطيب

حصطط مترمع داخل العين (الزرق)، رغبة غير قابلة للسيطرة في تحريك الرجلين (Restless legs syndrome)، صعوبات في النوم، الشعور بأورام دموية أو نزيف في المخ، الشعور بآلام متلازمة السيرور وتونين (التي تتمثل أعراضها عصبية، ارتباك، تعرق، هلوسة، تزاييد المعنكفات، تشنّجات العضلات، ارتجافات وترابيد نظم القلب)، حرّكات لازادئية، هياج عاطفي (Fits)، ارتباك، رودو فعل فوسنية (مثل الهياج العاطفي)، انتفاخ الشفاط والسلوك غير المنضبط، انتاج حليب الأُم في الوقت غير المأثم، تركيز منخفظ للصوديوم في الدم، الذين يبلغون أكثر من 65 عاماً - قد يستبَب انخفاضاً في تركيز الصوديوم في الدم ونتيجةً لذلك يستبَب أعراضًا مثل الضفَع، التعب والميل إلى النوم، الذي يستبَب احتباس السوائل، تغير في مستوى اتزيمات الكبد ومشاكل خطيرة في الكبد (غثيان، تقيؤ، انتفاخ، الشهية، شعور عام سُبي، حمى، اصفرار الجلد والعينين، بول غامق).

رويد فعل تجسسية تشمل: طفخاً جلانياً، حكماً، شري، انتقاماً بالوجه الشقين، القه أو اللسان، صعوبات في البلع أو في التنفس. في هذه الحالات يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب!
الدوار والغiddiness الشعور بالإغماء عند الوقوف بشكل فجائي (يتناسب عن انخفاض ضغط الدم).

انتفاخ البدين والرجلين، حساسية الجلد ضوء الشمس، هلوسة،
نزيف دموي في المعدة، انفراط في عدد صفات الماء.
اذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا
عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة
الطبيب.

يمكنكم التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن اعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستنارة المطلقة للتبايلغ عن اعراض جانبية، او عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

٥. كِيف يَجْب تَخْزِين الدَّوَاء؟

امعن التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضيع ومحال رؤيتهم، وبذلك ستنمّ التسمم. لا تسبب التفقي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

(exp. date) لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير

