

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### רוזובסטטין טבע 10 מ"ג טבליות

#### הרכב:

כל טבליה מכילה:  
Rosuvastatin (as calcium) 10 mg  
רוזובסטטין (כקלציום) 10 מ"ג

### רוזובסטטין טבע 5 מ"ג טבליות

#### הרכב:

כל טבליה מכילה:  
Rosuvastatin (as calcium) 5 mg  
רוזובסטטין (כקלציום) 5 מ"ג

### רוזובסטטין טבע 40 מ"ג טבליות

#### הרכב:

כל טבליה מכילה:  
Rosuvastatin (as calcium) 40 mg  
רוזובסטטין (כקלציום) 40 מ"ג

### רוזובסטטין טבע 20 מ"ג טבליות

#### הרכב:

כל טבליה מכילה:  
Rosuvastatin (as calcium) 20 mg  
רוזובסטטין (כקלציום) 20 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. **רוזובסטטין טבע אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.**

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הנך חש בתופעת לוואי שאינה מוזכרת כאן, אנא פנה לרופא שלך מיד.

## 1. למה מיועדת התרופה?

רוזובסטטין טבע מיועדת לטיפול בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (מסוג IIa כולל היפרכולסטרולמיה משפחתית הטרזיגוטית - מצבים בהם יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) או בדיסליפידמיה מעורבת (מסוג IIb - הפרעה ברמות השומנים השונים בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה במצבים בהם התגובה לדיאטה ולטיפולים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת. רוזובסטטין טבע מיועדת לטיפול בהיפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון סילוק שומנים LDL apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

#### קבוצה תרופוטית

מעכבאנזים HMG-CoA Reductase.

רוזובסטטין טבע שייכת לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, הפועלת להורדת רמת השומנים בדם שהנפוץ ביותר נקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם, "כולסטרול רע" ו"כולסטרול טוב". רוזובסטטין טבע פועלת ומסייעת לגוף לחסום את ייצור ה"כולסטרול הרע" ובפינויו מהגוף ומסייעת להעלות את רמות ה"כולסטרול הטוב".

## 2. לפני השימוש בתרופה

### X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- את בהריון או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין טבע, הפסיקי ליטול רוזובסטטין טבע מיידית וידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים. אתה סובל ממחלת כבד. אתה סובל מבעיות כליה חמורות.
- אתה סובל ממיחושים או כאבי שרירים מתמידים או בלתי מוסברים.
- אתה נוטל ציקלוספורין (בשימוש, למשל, לאחר השתלת איברים). אנא פנה לרופא שלך.

### בנוסף, אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:

- אתה סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה ויש ספק, אנא פנה לרופא).
- אתה סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תירואיד).
- אתה סובל ממיחושים או מכאבים בלתי מוסברים בשרירים, אם יש היסטוריה אישית או משפחתית של בעיות בשרירים או סבלת בעבר מבעיות בשרירים בעת נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.
- אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול.
- אתה ממוצא אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, וייטנאמי, יפני).
- אתה נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיבראטים.
- אתה מתחת לגיל 18 שנים.
- פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע אליך.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברוזובסטטין טבע ספר לרופא אם:

- אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול.
- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליה או בלוטת התריס (תירואיד).
- אתה נוטל תרופות להורדת כולסטרול הנקראות פיבראטים. אנא קרא עלון זה בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- אתה נוטל תרופות המיועדות לטיפול בוורוס הכשל החיסוני האנושי (כגון ריטונביר עם לופינביר ו/או אטאזאנאביר). אנא פנה לסעיף "תגובות בין תרופתיות".
- אתה נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב- 7 הימים האחרונים (לטיפול בזיהום חיידקי בבליעה או בהזרקה). השילוב של חומצה פוסידית ורוזובסטטין טבע עלול לגרום לבעיות שריר חמורות (רבדומיליזיס). אנא פנה לסעיף "תגובות בין תרופתיות".
- אתה סובל מכשל נשימתי חמור.
- אתה סובל ממיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשרירים, או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשרירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשרירים בעת לקיחת תכשירים להורדת כולסטרול. יש ליידע את הרופא המטפל אם מופיע כאב או חולשת שרירים במיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית לא טובה או בחום. יש ליידע את הרופא גם במידה ואתה סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- אתה ממוצא אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, וייטנאמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין טבע המתאים לך.
- אתה מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין טבע המתאים לך).

אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אינך בטוח):

אל תיטול רוזובסטטין טבע 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) ובדוק עם הרופא או עם הרוקח שלך לפני תחילת השימוש ברוזובסטטין טבע בכל מינון.

### בדיקות ומעקב

במספר קטן של מטופלים סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המזוהה בבדיקת דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול ברוזובסטטין טבע.

בזמן שאתה מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אחר כך אם יש לך סוכרת או אם אתה בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שאתה בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם שלך, יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

#### **ילדים ומתבגרים!**

**רוזובסטטין טבע אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.**

#### **תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:**

- תרופות לדילול דם (כגון, וורפרין או קלופידוגרל),
- ציקלוספירין (ניתן לאחר השתלות איברים),
- פיבראטים (כגון, גמפיברוזיל, פנופיבראט) או תרופות אחרות להורדת כולסטרול (כגון, אזטימיב),
- סותר חומצה,
- אריתרומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה למטה וכן בפרק האזהרות),
- גלולות למניעת הריון,
- רגורפיב (לטיפול בסרטן),
- טיפול הורמונלי תחליפי,
- תרופות לטיפול בזיהומים ויראליים, כולל תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס C), לבד או בשילוב (נא ראה פרק האזהרות): ריטונביר, לופינביר, אטאזאנאביר, אומביטסביר, פריטפרביר, דסבוביר, ולפטסביר, גרזופרביר, אלבסביר, גלקפרביר, פיברנטסביר,

**חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) -** אם עליך ליטול חומצה פוסידית במתן פומי לטיפול בזיהום חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול ברוזובסטטין טבע. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור ליטול את התרופה. נטילת רוזובסטטין טבע עם חומצה פוסידית עלולה לגרום, לעתים נדירות, לחולשת שרירים, רגישות או כאב (רבדומיוליזיס). ראה גם "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

ההשפעה של תרופות אילו עלולה להשתנות על ידי שימוש בו זמנית עם רוזובסטטין טבע או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של רוזובסטטין טבע.

#### **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול רוזובסטטין טבע ללא קשר למזון.

#### **הריון והנקה**

אין להשתמש ברוזובסטטין טבע אם את בהריון או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין טבע **הפסיקי ליטול רוזובסטטין טבע מיידית** וידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בתקופת הטיפול בתרופה זו.

#### **נהיגה ושימוש במכונות**

מרבית המטופלים יכולים לנהוג ברכב ולתפעל מכונות בזמן השימוש ברוזובסטטין טבע – התרופה לא תפגום בכשירותם לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש ברוזובסטטין טבע. במידה ואתה חש סחרחורת עליך לפנות לרופא בטרם הפעלת מכונות או נהיגה ברכב.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

- הטבליות מכילות לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- טבליות רוזובסטטין טבע 5 מ"ג מכילות FD&C yellow #6 שעלול לגרום לתגובה אלרגית.
- טבליות רוזובסטטין טבע 10 מ"ג, 20 מ"ג, 40 מ"ג מכילות Carmoisine שעלול לגרום לתגובה אלרגית.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- הטיפול עם רוזובסטטין טבע יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במינון ההתחלתי תהיה תלויה ב:
  - רמת הכולסטרול.
  - רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או שבץ מוחי.
  - מידת הסבירות כי תהיה רגיש יותר לתופעת לוואי אפשרית.
- ייתכן כי הרופא יחליט לתת את המינון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:
  - מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
  - הנך בן 70 ומעלה.
  - הנך סובל מתפקוד כלייתי לקוי ברמה בינונית.
  - הנך בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).
- העלאת המינון ומינון יומי מירבי ייתכן והרופא יחליט להעלות את המינון שהנך נוטל על מנת שיתאים עבורך. במידה והתחלת עם מינון של רוזובסטטין טבע 5 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון לרוזובסטטין טבע 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל - 40 מ"ג. במידה והתחלת עם מינון של רוזובסטטין טבע 10 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון ל- 20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל - 40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.
- המינון המקסימלי היומי הינו 40 מ"ג וניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או שבץ מוחי. כאשר רמות הכולסטרול אינן יורדות מספיק עם 20 מ"ג.

#### אין לעבור על המנה המומלצת.

- יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם מים.
- ניתן ליטול את התרופה בכל שעות היום עם או בלי אוכל. מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה.
- אם נוטלים סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את הרוזובסטטין טבע לפחות שעתיים לפני נטילה של סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.
- יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת.
- אין מידע לגבי כתישה, חצייה או לעיסה של הטבליה.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.**

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד לפצות על זו שנשכחה.**

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.  
**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הכולסטרול שלך עשויות לעלות שוב.**

**אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזובסטטין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת, הפסק את הטיפול ברוזובסטטין טבע ופנה לרופא מיד אם :**

- יש לך אחת מתגובות רגישות היתר (אלרגיה) הבאות:
  - קושי נשימתי, עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
  - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעלולים לגרום לקשיי בליעה.
  - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).

- כאבי שרירים ומיחושים לא מוסברים או כאבי שרירים ממושכים. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשרירים ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים, פוגעת בשרירים וידועה בשם rhabdomyolysis.
- יש לך קרע בשריר.
- יש לך תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) - כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

#### תופעות לוואי נוספות

#### תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100

- עצירות, כאבי בטן,
- כאבי ראש, סחרחורת,
- הרגשת חולי, חולשה,
- כאב שרירים
- עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל חוזר לנורמה ללא צורך בהפסקת הטיפול בתכשיר (רק עבור רוזובסטטין טבע 40 מ"ג).
- סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם הנך בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

#### תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000

- פריחה בעור, גרד, ותגובות עוריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל חוזר לנורמה ללא צורך בהפסקת הטיפול בתכשיר (עבור רוזובסטטין טבע 5 מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).

#### תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000

- תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבליעה ונשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם הנך חושב שיש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת רוזובסטטין טבע ופנה מיד לעזרה רפואית.
- פגיעה בשריר במבוגרים – ליתר ביטחון, הפסק לקחת רוזובסטטין טבע ודבר עם הרופא שלך מיד אם הנך חש במיחושים או בכאבי שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהרגיל.
- כאב בטן חמור (דלקת בלבלב).
- עלייה באנזימי כבד בדם.
- דימום או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
- תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) - כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

#### תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) -- תופעות שמופיעות בכחות ממשמש אחד מתוך 10,000

- צהבת (הצהבת העור והעיניים),
- הפטיטיס (דלקת של הכבד),
- עקבות דם בשתן,
- כאבי פרקים,
- נזק לעצבים בזרועות וברגליים (כגון, חוסר תחושה או תחושת נימול),
- אובדן זיכרון,
- הגדלת השדיים בגברים (gynaecomastia).

#### תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

- שלשול,
- סינדרום סטיבנס-ג'ונסון (הופעת שלפוחיות בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין),
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים),
- הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וחלומות בלהה,
- בעיות בתפקוד המיני,
- דיכאון,
- קוצר נשימה,
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קושי בנשימה או חום
- חולשת שרירים קבועה
- שיעול,

- פציעה בגיד.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25 °C.**

### **6. מידע נוסף**

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם :

Lactose anhydrous, microcrystalline cellulose, crospovidone, povidone, sodium stearyl fumarate, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350, talc, iron oxide yellow.

- Present only in 5 mg tablet: FD&C yellow #6, iron oxide black.

- Present only in 10 mg, 20 mg & 40 mg tablets: iron oxide red, carmoisine aluminium lake, FD&C blue #2.

כל טבליה של 5 מ"ג מכילה: 55 מ"ג לקטוז, 0.2 מ"ג נתרן.

כל טבליה של 10 מ"ג מכילה: 52.4 מ"ג לקטוז, 0.2 מ"ג נתרן.

כל טבליה של 20 מ"ג מכילה: 104.7 מ"ג לקטוז, 0.4 מ"ג נתרן.

כל טבליה של 40 מ"ג מכילה: 94.3 מ"ג לקטוז, 0.4 מ"ג נתרן.

#### **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?**

- רוזובסטטין טבע 5 מ"ג – כל אריזה מכילה 30 טבליות עגולות בצבע כתום שבצד אחד מוטבעת האות N ובצד השני מוטבעת הספרה 5.
- רוזובסטטין טבע 10 מ"ג – כל אריזה מכילה 30 טבליות עגולות בצבע ורוד שבצד אחד מוטבעת האות N ובצד השני מוטבע המספר 10.
- רוזובסטטין טבע 20 מ"ג – כל אריזה מכילה 30 טבליות עגולות בצבע ורוד שבצד אחד מוטבעת האות N ובצד השני מוטבע המספר 20.
- רוזובסטטין טבע 40 מ"ג – כל אריזה מכילה 30 טבליות אליפטיות בצבע ורוד שבצד אחד מוטבעת האות N ובצד השני מוטבע המספר 40.

**היצרן, בעל הרישום וכתובתו :** טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד. 3190, פתח תקווה

עלון זה נערך בתאריך מאי 2020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רוזובסטטין טבע 5 מ"ג : 144.36.31959

רוזובסטטין טבע 10 מ"ג: 144.37.31960

רוזובסטטין טבע 20 מ"ג: 144.38.31961

רוזובסטטין טבע 40 מ"ג: 144.39.33139

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.