

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סביעור®

קרם

הרכב

צטרימיד 0.5% w/w
כלורהקסידין הידרוכלוריד 0.1% w/w
(Cetrimide 0.5%)
(Chlorhexidine Hydrochloride 0.1%)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה ?

לשימוש כעזרה ראשונה בחיטוי חיצוני של פציעות קלות, פצעים וכוויות.

קבוצה תרפויטית:

חומרי חיטוי (אנטיספטים)

כלורהקסידין הינו חומר מחטא בעל פעילות רחבת טווח נגד מיקרואורגניזמים ביניהם בקטריות, פטריות ווירוסים. צטרימיד בעל תכונות מחטאות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לכל אחד ממרכיבי התרופה, במיוחד לכלורהקסידין העלול לגרום לתגובה אלרגית. צטוסטאריל אלכוהול עלול לגרום לתגובה מקומית בעור.
- אין להשתמש בתכשיר זה באיזור הפה והעיניים.
- אין להשתמש בתכשיר באוזן התיכונה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ב סביעור®:

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה
- אין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- במקרים שבהם מתפתחת נפיחות בפצע, או הפצע מלווה בחום, יש להיוועץ ברופא.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. יש להמנע משימוש בסבון וחומרים אניונים אחרים. חומרי הלבנה, המכילים היפוכלוריד, עלולים לגרום להופעת כתמים חומים באריגים, שבאו קודם לכן במגע עם סביעור.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
Cetostearyl alcohol עלול לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר

אופן השימוש:

לשימוש חיצוני בלבד. לא לבלוע!
יש למרוח את הקרם בשכבה דקה על האזור הנגוע.
יש למנוע מגע התרופה עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף אותן היטב במים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין להשתמש בתרופה בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך משתמש בתרופה, הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסביעור® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:

הינך חש באחת מהתופעות האלרגיות הנדירות מאד, הבאות:
קשיי נשימה, התנפחות של הפנים, הלשון או הגרון. סחרחורת, גירוי בעור או פריחה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן תרופה זו מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם
Purified water, Cetostearyl alcohol, mineral oil (paraffin oil).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
שפורפרת אלומיניום המכילה קרם לבן, חלק, בעל מרקם אחיד ללא גושים.
משווק בשפורפרת של 10 גרם.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
ת"ד 3190, פתח-תקוה

פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בתאריך
מרץ 2008 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך מרץ 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
126-25-21373-00

**לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני
שני המינים.**