

*פורטנו עלון זה נקבע על ע"י משרד הבריאות*

*והמונח נבדק ואושר על ידו במאי 2019*

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקמים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

**התרופה משויקת על פי מרשם רופא בלבד**

## אמנדין 100 טבליות מצופות

**חומר פעיל:**

Amantadine – hemisulphate 100 mg אמנדטין המיוסלפט 100 מ"ג

לרשימת הרכיבים המלאה ראה: סעיף 6 'מידע נוסף'.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע מותאם על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לטיפול אם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בתסמיני מחלת הפרקינסון כגון: נוקשות שרירים, רעדיות, הפחתה בתנועת או חוסר תנועתיות.

קבוצה תרפויטית: נוגדת פרקינסון.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אמנדטין המיוסלפט ותרמובותיו, לקטוז, (E 110) Orange Lake S או לכל אחד מהמרכיבים הנספחים אשר מכילה התרופה, (אנא ראה סעיף 6 'מידע נוסף').
- הינך סובל מאי ספיקת לב חמורה (שאינה מצופה).
- הינך סובל מבעיות בשריר הלב, כגון: *myocarditis*, *myocarditis*.
- הינך סובל מבעיות בהולכה העצבית של שריר הלב (חסימה בהולכה בין העליות לחדרי הלב בדרגת חומרה 2-3).
- הינך סובל מקצב לב נמוך (מתחת ל- 55 פעימות לדקה).
- הינך סובל ממאפיינים לא רגילים בבדיקת א.ק.ג. (הארכת מקטע **QT**, גלי U הניתנים לזיהוי).
- יש לך קורב משפחה מדרגה ראשונה עם מחלת לב מולדת (תסמונת **QT**).
- סבלת בעבר מבעיות מורוות בנקב הלב (הפרעות קצב חדריות כולל הפרעה בשם **torsade de pointes**).
- הינך סובל מרמות נמוכות של אשלגן או מגנזיום בדם.
- הינך נוטל תרופה בשם בודיפין (**Budipine**) או תרופות אחרות הולכות להאריך את מקטע **QT** (ראה סעיף 'אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות').

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני ובמהלך הטיפול בטבליות אמנדטין 100, ספר לרופא אם:**

- היך סובל מהגדלת של בלוטת הפרוסטטה.
- הינך סובל מלחץ תן עיני מוגבר כגון גלאוקומה צרת זוויית.
- הינך סובל מאי ספיקת כליות (ברמות חומרה שונות, אנא ראה פירוט בסעיף 3, 'כיצד תשתמש בתרופה').
- הינך סובל ממזעבים של אי שקט (אינטים) ובלבול.
- הינך סובל מסינדרום של הזיות (**Delirious syndromes**) או מפסיכזה (הפרעות נפשיות חמורות).
- הינך מטופל בתרופות המכילות את החומר הפעיל ממנטיין (*memantine*), יש לנקוט משנה זהירות במטופלים אלו (ראה סעיף 'אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות').

#### מידע נוסף חשוב

אצל חולים עם קוצבי לב אשר לא ניתן לקבוע אצלם את מקטע **QT** באופן מדויק, הרופא (קרדיולוג) המטפל יפעיל שיקול דעת האם ניתן לטפל בטבליות אמנדטין 100.

אצל מטופלים הסובלים מתפקודי כליה לקויים, ייתכן עלייה ברמת החומר הפעיל בגוף העקבות פניו לקוי מהכליות. דבר זה עלול לגרום לסימפטומים זהים לאלו הנגרמים במצב של מינון יתר. לכן, הרופא המטפל יטטרך לעקוב ולבדוק את המינון, ואת קצב הפינוי הגלומרולרי (*glomerular filtration rate*) במהלך הטיפול בטבליות **אמנדין 100** (ראה סעיף 3 'כיצד תשתמש בתרופה?').

אצל מטופלים הסובלים ממחלת מוח אורגנית או מעוינות ונטלים טבליות **אמנדין 100**, צריך לנקוט בלבד, כגון זהירות כיוון שעלולה לחול ההדרדרות במצבם.

אם אתה חווה דיפקות לב חזקות, סחרחורת או איבוד הכרה קצר, הפסק מיידי את השימוש בטבליות **אמנדין 100** והתייעץ עם הרופא כדי שזה יבדוק את קצב הלב שלך. במידה והאין הפרעות קצב, תתכן חזרה לטיפול בטבליות **אמנדין 100** בהתאם להתיוות הנגד ולאינטראקציות הבין תרופתיות, (ראה סעיף 4, 'תופעות לוואי').

אל תפסיק בפתאומיות את השימוש בטבליות **אמנדין 100**, מאחר ובחולי פרקינסון זה עלול לגרום להתדרדרות ביכולת התנועה, ובמקרה הגרוע יותר, לאיבוד יכולת התנועה.

מטופלים אשר נוטלים טבליות **אמנדין 100** ביחד עם תרופות ניורולפטיות לטיפול בהפרעות נפשיות, עלולים לפתח מצב מסכן חיים (*malignant neuroleptic syndrome*) אם הטיפול בטבליות **אמנדין 100** מופסק בפתאומיות. מצב זה מאופיין בעלייה בתאומית של חום הגוף, קישיון שרירים והפרעות במערכת העצבים האוטונומית.

סימפטומים כמו לחץ דם נמוך, ריוח, הצפה, עלייה בחום הגוף, תחושת חום, איבוד נזלים ודיכאון נוצעים לעיתים קרובות בחולי פרקינסון. יש לטפל בהם תוך התחשבות בתופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופתיות אפשריות עם טבליות **אמנדין 100** (ראה סעיף 4 'תופעות לוואי').

התייעץ עם הרופא, במקרה שיש לך בעיות במתן שתן.

הודע לרופא שלך אם אתה, בני משפחתך או מטפלים שלך, מבחינים שאתה מפתח תדחים או יצר להתנהג בצורה שאינה רגילה עבורך, או שאינך יכול להתנגד לרץ, לעיר או לפיתוי לעשות פעולות מסוימות שעלולות לפגוע בך או באחרים. תופעות אלה נקראות הפרעות שליטה בדחף (*Impulse Control Disorders*) ועלולות ללול תופעות כגון התמרות להימורים, אכילת יתר, כבודז סכס, יצר מני גבוה באופן בלתי רגיל או עלייה בתדירות מחשבות ורגשות מיניים. במקרה זה ייתכן שהרופא שלך יתיאם לך מינון אחר של התרופה או פסיק את השימוש בה לגמרי.

במידה ויש לך הפרעות בראייה (כגון ראייה מטושטשת), עלך לפנות לרופא עיניים באופן מיידי.

#### ילדים

אין מספיק מידע לגבי השימוש בטבליות **אמנדין 100** בילדים.

#### קשישים

יש לנקוט משנה זהירות בעת נטילת התרופה, במיוחד בקרב הסובלים מאי שקט, בלבול או מסינדרומים של הזיות (*delirious syndromes*).

#### בדיקות ומעקב

הרופא שלך יבצע לך בדיקת א.ק.ג. (50 mm/s):

- לפני הטיפול, ובשבוע הראשון והשלישי מתחילתו.
- לפני העלאת מינון ושבועיים לאחר לחר מכן.

באופן שגרתי, לפחות פעם בשנה.

מטופלים אשר יש להם נטייה לסבול מהתקפים (עוינות ופרכוסים) או סבלו בעבר מבעיות מוסטילים, כמו כן מטופלים עם הפרעות ולכי וכלי דם, חייבים לעבור בדיקות תקופתיות אצל הרופא במהלך הטיפול בטבליות **אמנדין 100**.

#### אינטראקציות / תגובות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח או לוקחת לאחורנה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם וטופסי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד

יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- אין ליטול את טבליות **אמנדין 100** יחד עם תרופות אחרות אשר ידוע כי הן מאריכות את מקטע **QT** כגון:
  - תרופות לטיפול בהפרעות קצב לבביות, תרופות מסוג Class IA: קווינידין, דיספיראמיד, פרוקאינמיד. **תרופות מסוג Class III:** אמידארון וסוטלוול.
  - תרופות אנטי פסיכיות לטיפול בהזיות כגון: תיאורידין, כלורפרומזן, הלופרידול ופימוזיד.
  - תרופות מסימות לטיפול בדיאנון, נוגדי דיכאון טריציקליים או סטרציקליים כגון: אסטמיפילין.
  - תרופות מסימות לטיפול בקדחת השחת, תרופות אנטיהיסטימיני כגון: אסטמיזול, טרפנאדין.
  - תרופות מסימות לטיפול בדימומים חייקיים ופסרייטיים, אנטיביוטיקות ממשפחת המקרולידים כגון: אריתרומיצין וקלריתרומיצין.
  - תרופות מסימות לטיפול בדימומים חייקיים, מעכבי האנזים גיראז, כגון ספארפלוקסין.
  - תרופות מסימות לטיפול בדימומים פסרייטיים כגון תרופות ממשפחת האזולים (*azole antimycotics*).
  - תרופות נוספות כגון: בודיפין, הלופנטין, קוסריומוקסוזול, סימטידין, סימפריד או פרידיל.
- רשימה זו אינה מכילה את כל האינטראקציות האפשריות. לפני השימוש בטבליות **אמנדין 100** במקביל לשימוש עם תרופה נוספת הרופא שלך יודא כי אין אינטראקציות נוספות על רקע הארכת מקטע **QT**.
- יש ליטול טבליות **אמנדין 100** ביחד עם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון (אין מתקדים ספציפיים עם האינטראקציות ביניהן):
  - בלבדופן, במומקוריפטין, טריהקספרידיל או תרופות לטובת כאלגן: אמנדטין כגון ממנטין. כדי להימנע מתופעות לוואי (כגון תגובות נפשיות) ייתכן ויהיה צורך להתאים את המינון של התרופות. (ראה סעיף 4, 'תופעות לוואי').
- תרופות התרופות הבאות ביחד עם טבליות **אמנדין 100** עלול לגרום לאינטראקציות הבאות:
  - תרופות אנטיכולרגיות: התגברות תופעות הלוואי של תרופות אנטיכולינרגיות (כגון בלבול או הזיות) בשימוש עם תרופות נוספות כגון: טריהקספנידיל, במטרופין, סקופולאמין, ביפרידן, אורפנדרין ועוד.
  - תרופות המזרות את מערכת העצבים המוספטטית **אמנדין 100** עקף, יגרמו להעצמה של האפקט של טבליות **אמנדין 100** על מערכת העצבים המרכזית.
  - לבדופין (תרופה לטיפול בפרקינסון) - התרופות מגבירות את האפקט הטיפול המשותף.
  - ממנטיין (תרופה לטיפול באלצהיימר) - טבליות להגביר את האפקט הטיפול ואת תופעות הלוואי של טבליות **אמנדין 100** כגון: במקביל עם תרופות משמנות כגון הידרוכלורתיאזיד או טרימרטין (*trimterene*) עלול להקטי'ן את הפרשת החומר הפעיל אמנדטין המיוסלפט ולגרום לרמה עילה בדם הגורמת להפרעה תנועתית, פרכוסים ובלבול. לכן, יש להימנע משימוש בתרופות מסוג זה ביחד עם טבליות **אמנדין 100**.
  - לתשומת לבך, מידע זה עלול להיות רלוונטי גם לתרופות בהן השתמשת לאחורנה.

#### נטילת התרופה ומזון

אין מידע

#### שימוש בתרופה וצריכת אלקוהול

אין לצרוך אלקוהול בזמן הטיפול בטבליות **אמנדין 100**, כיוון שהן מורידות את הסבילות לאלכוהול.

#### הריון והנקה

**הריון**

**אין מספיק מידע לגבי השימוש בטבליות אמנדין 100 בהריון. דווח מקרים על ילדים בריאים לאמהות שנטלו את התרופה אך ידוע גם מקרים על סיבוכים בלידה ומומים.** במקרהיך על בעלי חיים החומר הפעיל בטבליות **אמנדין 100**, אמנדטין המיוסלפט, גרם נזק לצאצאי החיות. פוטנציאל הסיכון לבני אדם לא ידוע.

השימוש בתרופה זו במהלך ההריון יתאפשר רק לאחר שהרופא קבע כי זה חיוני.

אם את נוטלת תרופה זו במהלך שלוש החודשים הראשונים להריון הרופא שלך ימליץ על בדיקת אולטרסאונד.

אם הינך מתכננת הריון או חושדת שהינך בהריון, הודיעי לרופא מיד על מנת שיקבע האם להמשיך בטיפול, להפסיקו או להחליפו בתרופה אחרת.

הנקה

החומר הפעיל, אמנדטין המיוסלפט, עובר בחלב האם. אם הרופא החליט כי הטיפול בתרופה נחוץ במהלך ההנקה, צריך לבצע בדיקות מעקב לטיפול בגלל הסיכון לתופעות לוואי כגון פריחה בעור, אי מתן שתן, הקאות. ייתכן והרופא יורה שתפסיקי להניק.

#### נהיגה והפעלת מכונות

לא ניתן לשלול השפעה על הריכוז, הערנות ויכולת העין להתמקד ביחס לתרופה, זאת בנוסף לאמפיינים נוספים בטיפול בסינדרום פרקינסון. במקרים, (בנוסף למוגבלויות המאפיינות את המחלה), ייתכן כי תהיה ירידה ביכולת לנהוג ולהפעיל מכונות. ייתכן כי לא תוכל להגיב במהירות וביעילות מספקת לאירועים לא צפויים או פתאומיים.

ען כן אין לנהוג במכונית או בכל כלי רכב אחר או להפעיל מכונות ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא.

יש לשים לב כי צריכתה אלקוהול מורידה עוד יותר את היכולת לנהוג.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
תרופה זו מכילה **Orange Lake S (E110)** העלול לגרום לתגובות אלרגיות.

תרופה זו מכילה לקטוז. אם הרופא שלך אמר לך שהינך סובל מחוסר סבילות לטוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל טבליות **אמנדין 100**.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה וינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

**אין להחליף בין טבליות של אמנדטין המיוסלפט לבין טבליות של אמנדטין ולקטורלרזי.**

אופן המתן: יש לוקות טבליות **אמנדין 100** עם מעט נוזלים, עדיף בשעות הבוקר ואחר הצהריים. אין ללקחת את המנה האחרונה לאותו יום אחרי שעל ארבע שפר הצהריים. תקופת הטיפול יתקבע על ידי הרופא המטפל ונקבעת על פי מוצר מחלתך וכיצד אתה מגיב לטיפול. אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא. ניתן לצעות את הטבליה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל: במהלך 4-7 ימים ראשונים לטיפול: טבליה אחת ביום של 100 מ"ג, ולאחר מכן עלייה למינון ב-100 מ"ג (טבליה אחת) פעם בשבוע עד למינון אחזקתי. בדרך כלל המינון הפאקטיבי נע בין 1-3 טבליות פעמיים ביום (מינון שנוע בין 600-200 מ"ג אמנדטין המיוסלפט ליום).

מבוגרים: במיוחד כאלו הסובלים מאי שקט, בלבול או הזיות, יש להחליח את הטיפול מינון נמוך יותר.

אם נוטלים את טבליות **אמנדין 100** ביחד עם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון, הרופא יתיאם עבורך את המינון בהתאם.

אם טופלת בעבר בפק-מורץ אינפוזיה, ייתכן והרופא יתחיל את הטיפול בטבליות **אמנדין 100** במינון גבוה יותר.

#### מטופלים עם אי ספיקת כליות:

הרופא יתיאם את מינון טבליות **אמנדין 100** טבליות בהתאם לערכי ה-GFR שלך. ה-GFR הינו ערך המודד את קצב סינון נוזלי הדם בגופך דרך הכליות.

#### האם לגבור על המנה המומלצת.

אם הינך שר בסימפטומים של הרעלה חמורה כגון: בחילה, הקאות, עירור יתר, רעדיות, **חוסר שיווי משקל ובחוסר שליטה על תנועות במרחב (ataxia)**, ארטיה מטושטשת, שינויות זיכרון, דיכאון, בעיות בדיבור, התקפים יש לפנות לרופא או למיין.

דווח מקרה אחד של בעית קצב לב הנקראת *malignant cardiac arrhythmia* הזדווחה אצל מטופלים שנוטלים טבליות **אמנדין 100** ותרופות נוספות לטיפול בפרקינסון.

לטבליות **אמנדין 100** אין תרופות נגד (אנטידוט) ולכן במקרה של הרעלה, ייתכן כי יבועו ביחד המינון שטיפת קיבה או יעודדו הקאה. אין הדם (המודיאליז) חומר מומלץ במקרה כזה.

מקרים של הרעלה מסכנת חיים דורשים אמצעים אינטנסיביים למעקב רפואי. ייתכן כי הפעולות הבאות ינקטו: אספקת נוזלים, החמצת השתן לצורך פינוי מהיר יותר של התרופה מהגוף, מתן תרופות הרגעה, תרופות לטיפול בעוינות ופרכוסים, תרופות לבעיות בקצב הלב (לידוקאין במתן תוך ורידי), פיזוסטיגמיין במתן תוך ורידי לטיפול בסימפטומים של רעילות עצבית.

במקרה הצורך, רופא יבצע לך בדיקות א.ק.ג. ויבצע מעקב אחר מצבים שיכולים לעודד בעיות בקצב הלב, כגון חוסר אשלגן במחלים בדם (אשלגן) או מגנזיום) או קצב לב איטי.

**אם נטלת מנת יתר או אם טופלת בלע ילד מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית החולים והבא את ארזית התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה** בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ע"י הרופא.

אם אינך מגלה סבילות לתרופה וגם אם חל שיפור במצב בריאותך, **אין להפסיק את הטיפול בתרופה** או לשנות את המינון ללא התייעצות עם הרופא כיוון שזה עלול לגרום להתדרדרות במצבך ולתסמיני גמלה.

**אין ליטול תרופות בחושיך בדוק הותיות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקן אינו היך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בטבליות **אמנדין 100** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ואל תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא במידה ואתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

**תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)**

- הפרעות שינה.
- אי שקט מוטרי או מנטלי.
- אצירת שתן בחולים הסובלים מהגדלת בלוטת התרמונית.
- הזיות ואשליות פרוזאודיות (הפרעות תפיסה ובהתנהגות), במיוחד במטופלים מבוגרים עם נטייה להזיות.

תדירות תופעות לוואי אלו עלולה לגדול במטופלים הנוטלים בנוסף לטבליות **אמנדין 100**, גם תרופות נוספות לטיפול בפרקינסון (כגון לבדופין, ברומוקרפטיט) או לטיפול באלצהיימר (ממנטיין).

**תופעות לוואי שכיחות נוספות (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)**

- תגובות עור אופיינית ל**אמנדין 100** הנקראת ציור רישתי עורקי (**LIVEDO RETICULARIS**), לעיתים מלווה בבצקת בחלק התחתון של הרגליים ובקרסוליים.

- בחילה.

- סחרחרות.

- יושב בפה.

- שינויים בוויסות זרימת הדם בזמן עמידה או קימה.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000).**

- ראייה מטושטשת.

**תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000)**

- איבוד זמני של חדות הראייה וראייה מטושטשת בעקבות בצקת בקרנית - במקרה שזכה הטיפול בטבליות **אמנדין 100** צריך להפסק ועליך לפנות לרופא עיניים מיד עם הופעת סימפטומים. פגיעת בקרנית.

- נפיחות בקרנית (בצקת בקרנית).

- ירידה בחדות הראייה.

**תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בכחות ממשתמש אחד מתוך 10,000)**

- שינויים בדם (מולטוליגים) כגון ליקופניה (מספר נמוך מאוד של תאי דם לבנים) וטרומבוציטופניה (ירידה במספר תסיות הדם).
- הפרעות בקצב הדם כגון טריקרידה חדרית, פרפור חדרים, **torsade de pointes** והאררכת מקטע **QT**. פרבור מקרים אלה היו ברקע אחד ממומים אלו: מינון יתר, מתן משולב עם תרופות אחרות או גורמי סיכון להפרעות בקצב הלב (ראה סעיף 'אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה').

עלייה ברגישות לאור, הפרעות קצב לבביות עם עלייה בקצב הלב.

התקפים אפילפטיים (לרוב אצל מטופלים אשר נטלו מינון גבוה יותר מזה המומלץ על ע"י הרופא).

עוינות בשרירים והפרעה בתחושת הגפיים.

נסינות התאבדות דווחו בחולים שטופלו בטבליות **אמנדין 100** להתוותות אחרות.

- תגובה אלרגית כתואם מהמרכיב Orange Lake S (E 110) הבלתי פעיל שבתרופה.

#### תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה

רצון להתנהג באופן בלתי רגיל - דחף חזק להתנהגות מוגזמת, דחף מני שונח או מוגבר, רעיונות קניזות ובזבוז כספים באופן מוגזם וללא אכילת לישלוט בדחף לכך, אכילת כמויות גדולות של אוכל במטע עז או אכילה באופן כפיתי (אכילה יתר על המידה גם לאחר תחושת שובע).

**אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי של האזהרה בעלון,** עלך להתייעץ עם הרופא.

#### דייווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על" כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

### 5 איך לראות את התרופה?

מגור הרעלה/ תרופה זו ונטול ראייה שרית של ילדים /או לשימור בעולם סגור מחוץ להישג יד וטוח ראייתם של ילדים /או לשימור ועקם ידי כך מנמנע הרעלה. אל תגרסם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

### 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל Amantadine – hemisulphate, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone (K 28/32), croscarmellose sodium, maize starch, talc, magnesium stearate (Ph. Eur.), polyacrylate dispersion