

فوسيتاميك قطرات لزجة للعينين، 1%

تعليمات لاستعمال فوسيتاميك
هذا الدواء مخصوص الاستعمال في العينين فقط
لا يجوز بلع القرطars. لا يجوز تغیر القرطars
إلى داخل الجسم أو إلى الآذنين.
يجب دائمًا غسل اليدين قبل استعمال
فوسيتاميك لا تستعمل الدواء إذا كان عداء
الأنفية موجودًا.
يوضح الرسم الإيضاحي التالي كيفية استعمال
الدواء. باستطاعة استعمال المرأة المساعدة.



يجب إزالة غباء الأنفية فقط بالقرب من
استعمال الدواء.
من بين المسببات تماش طرف الأنفية مع العين.
فيما يليه رأسك إلى الوراء. اسحب الخنف
الضفلي ببطء إلى الأعلى.
العنف الضفلي ينزل إلى الأعلى.
سوف تكون القرطاء لزجة لكن سوف تصيب أكثر
سوية العينين أو من أصوات العين وقت ما لات من
المفترض أن تزني بوضوح.
بعد استعمال الدواء قد تزني مسحوق أبيض
حول عينك. قد يحصل هذا عندما تخف
القرطاء. هذا طبيعي ولا يجب أن يقلقك.

تكوني حاملًا أو تخطي الدخول في حمل
هذا الدواء. استثنى الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال

السيارة واستعمال الآلات:
قد تكون الرؤية ضبابية لفترة قصيرة بعد
استعمال الدواء. لا يجوز السياقة أو استعمال
الآلات حتى تتحسن رؤوتك. استشر الطبيب
إذا كنت تشعر ببعض جانبي أي كان الذي قد
يمنعك من السياقة أو استعمال الآلات.

معلومات مهمة عن جرعة من مرطبات الدواء
يحتوي فوسيتاميك على 0.11 ملليلتر من كلوريد
البتريلوكتون في كل غرام من الدواء.
قد يمتص كوليديون كربونات الكالسيوم من قبل
الاحتضار (الحمل الخطر) لمقاومة الحرارة
الحادي الحارق، وذلك بتناول العدسات اللاصقة
حال العلاج بفوسيتاميك. انظر بند تحذيرات
أصلية متصلة باستعمال العدسات اللاصقة من أي
نوع. اثناء استعمال الدواء، ينصح فوسيتاميك
على ثيارات مجهزة التي يمكنها حفظ
العدسات اللاصقة أو الفنية إذا تم استعمال
العدسات اللاصقة.

يجب دائمًا استعمال العدسات اللاصقة من أي
نوع ثانية استعمال الدواء، ينصح فوسيتاميك
على ثيارات مجهزة التي يمكنها حفظ
العدسات اللاصقة أو الفنية إذا تم استعمال
العدسات اللاصقة.

يجب دائمًا استعمال الدواء استثرب الطبيب
على العين، خاصة إذا كنت تعاني من حفاف
الشفافة في العين أو من اضطرابات العين.
إذا كنت تعانى من مقدمة الرؤية،
باحساس عالي على العين، وفرج، أو الم
رجاء استثرب الطبيب إذا كنت تقلي شاشاً أي

واحد من المركيبات في هذه الدواء.
3. كيف يستعمل الدواء؟
يجب دائمًا استعمال الدواء وفقاً لتعليمات
الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي
إذا لم يكن متاحاً بخصوص الجرعة وطريق
العلاج بالدواء.

كت مساماً (ارجلاً) المادة الفعلة (جمض
فوسيتاميك) أو واحد من المركيبات
الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر
بند 6).

تحذيرات خاصة متصلة باستعمال الدواء
• لا يجوز استعمال فوسيتاميك لوقت طويل
وذلك لأن الاستعمال المطول قد يزيد من
الاحتضار (الحمل الخطر) لمقاومة الحرارة
الحادي الحارق، وذلك بتناول العدسات اللاصقة
حال العلاج بفوسيتاميك. انظر بند تحذيرات
أصلية متصلة باستعمال العدسات اللاصقة من أي
نوع ثانية استعمال الدواء، ينصح فوسيتاميك
على ثيارات مجهزة التي يمكنها حفظ
العدسات اللاصقة أو الفنية إذا تم استعمال
العدسات اللاصقة.

• يجب دائمًا استعمال فوسيتاميك لفترة زمنية
على العين، خاصة إذا كنت تعاني من حفاف
الشفافة في العين أو من اضطرابات العين.
إذا كنت تعانى من مقدمة الرؤية،
باحساس عالي على العين، وفرج، أو الم
رجاء استثرب الطبيب أو الصيدلي إذا
كانت خدشة من قبل الطبيب.

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

• إذا كنت تتأخر أو اخذت في الأونة الأخيرة، أو
إذا كان من الممكن أن تتأخر، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية
أخرى، على العين، أو يأكل بعد استعمال الدواء
الجرعة وطريقة الاستعمال

**٠ شروط التخزين: خزن دون 25 درجة مئوية.
يجب إغلاق الأنفية جيدًا يجوز استعمال لمدة
28 يومًا فقط المفعول الذي يحتوي على الماء.**

١. معلومات إضافية
بالاضافة للمركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا
على:

Water for injection, mannitol, carboner,
disodium edetate, benzalkonium
chloride, sodium hydroxide.

كيف يبني الدواء وما هو محتوى العبوة: أنفية
تحتوي على 5 غرام سائل لزج بلون أبيض.

اسم المنتج وعوانه: ليوبراتوريس الـB.T.
دي. بيلز، إيرلندا.

تم تقييمها في إطار 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي
في وزارة الصحة: 057 82 26772 00.

ال�示يف وتسهيل القراءة: تمت صياغة هذه
النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء

مخصص لكل الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسيل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عكا
3060000، إسرائيل

حكة، أو حفاف في العين الشعيرية
• ضبابية الرؤية في العين المعالجة

• اعراض جانبيه غير شائعة (اعراض تهيج)
لدى 10-11 مستخدمين من بين 10,000:

• عيون حساسة أو يكلع بعد استعمال الدواء
• تفاقم الحفاف
• مطف

• اعراض جانبيه شديدة (اعراض تهيج لدى
1-10 مستخدمين من بين 10,000):

• شرى العين
• تفاقم الالتهاب الشعيرية العين

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض
الجانبية أو عندما تتعالى من عرض جانبي لم يتم
لذلك في الشفارة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التخلص من الأعراض الجانبيه لوزارة
الصحة بواسطة الضغط على الرابط
"لا" لـ "نعم" لـ "لا" www.moh.gov.il ثم "نعم" ثم "نعم".

الصحة ([www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)) التي يجب الاتصال بها:

إلى الاستمارنة التي تتبع التنشيط عن الأعراض
الجانبية، أو طرق تخول الأعراض.

5. كيف تختزن الدواء؟
• يجب ملء العلبة بقطف هذا الدواء وكل يوم

آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول اليد
ومجل رؤية الأطفال وألوه الرهندة وبذلك تمنع
التشم. ثم تسبس قبور تقويم عن تعليمات صرحة
من قبل الطبيب.

صاحب التسجيل: دكسيل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عكا
3060000، إسرائيل

يمكث مسح المسحوق بقطف.
عند الاستعمال لدى الأطفال، يمكن تقطيف فورًا إلى الطبيب أو إلى الطبيب المواري في المختبرات العين أثناء اليوم أو الاستثناء، إذا كان المستشفى، وأربع ساعات بعد استعمال الدواء.

إذا كنت استعملت الدواء في الوقت المحدد،
إذا كنت تغير العين، تفتق العين،
الدرع، تذكر ذلك، بعد ذلك استمر بالاستعمال
الدواء في الوقت المحدد.

إذا يجوز تناول الدواء في اليوم، من أجل
تذكرة، فنفك بالاستعمال الدواء، قد ساعدك إذا
استعملته أثناء تناوله، تفتق العين، يومي آخر على
سبيل المثال تفتق العين، الأسان.

البالغون، المستenos والآباء:
الجرعة العادي تختلف عاماً في، قطرة واحدة
في العين مرتين في اليوم، في الصباح وفي

المساء، لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
إذا لم يطرأ تحسن على وضعك في غضون عدة
أيام يجب التوجه إلى الطبيب.

6. إكمال العلاج بفوسيتاميك
من المهم جدًا إكمال العلاج بموجب ما أوصى به
من قبل الطبيب، يجب استمراره في العلاج 48 ساعه
عاصيًا الأقل بعد شعورك بالتحسن وعودة
العين لوضعها الطبيعي مع اجل من عودة
الثبوت في العين.

إذا استعملت فوسيتاميك بأكثر مما أنت
بحاجة إليه،
إذا قتعي شعور بحرقة أو وخز في العين،
الذي لا يذهب.

إذا قتعي شعور بحرقة أو وخز في حمل
الخطا في العين، أو إذا بلغت
نفقة من القرطارات عن طريق الخطأ، من
غير المرجح أن يتسبس ضرر، إذا تلقت كمية

أكبر من القرطارات عن طريق الخطأ، أو إذا كانت
فلا، توجه للطبيب، المصيلاني أو غرغوة الطوارئ