

ديسيفيرا 0.5 غرام

مسحوق لمحلول للحقن داخل العضل .M.I.
مسحوق لمحلول للتسرير الوريدي .I.V.
وتحت الجلد .S.C.

التركيب: كل قبضة تحتوي على:
المادة الفعالة: لا يوجد.

الفصيلة الملاجية: cheelating agent -.

عامل إستخلال:

تأثيرات المواد الطيبة:

علاج فائض الحديد المزمن

علاج فائض الألومنيوم المزمن لدى مرضى لديهم قصور كلوي والمعالجين

بالدبلية:

علاج سسم الحديد الحاد

اختصار تشخيص الفائض من الحديد.

يتنقطع ديسيفيرا فائض الحديد أو الألومنيوم، وعندها يطرح في البول والبراز.

يمكن إستعمال ديسيفيرا لعلاج الكبار، المراهقين والأطفال.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر:

إذا وجدت لديك حساسية (حساسية زائدة) لـ ديسيفيرا (ديفروكسامين) عدا حالة نسخ فيها إزالة التحسس للعلاج بـ إستعمال ديسيفيرا.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل استشارة الطبيب مقدمًا:

إذا كنت في فترة الحمل، تحملين للحمل أو في فترة الرضاعة، بصورة عامة.

لا يجوز إستعمال ديسيفيرا أثناء الحمل أو أثناء فترة الرضاعة، إلا أوصاف الطبيب بالعلاج بـ ديسيفالشل الطيب بخصوص الخطوة الممكنة عند إستعمال ديسيفيرا

أثناء الحمل، لا يوصى بالإعراض أثناء العلاج - ديسيفيرا.

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني/ين إذا كنت تعاني/ين بذلك ميساسا-لة - ديسيفيرا.

أو كنت تجري/ علاجات المبكرة.

إذا كنت شعرت عانيني/ أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب، الجهاز العصبي أو من مشكلات في جهاز البول.

إذا كنت شعرت عانيني/ أو من فطر شطاط نظائر الدرق أو من التلاسيمي.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

ديسيفيرا يمكن أن يضر بالرؤية أو بالسمع. يسبب الدوار أو إضطرابات أخرى في الجهاز العصبي.

إذا كنت شعرت عانيني/ بهذه الأعراض، عليك الامتناع عن قيادة المركبات وتشغيل أدوات

خطورة ومركبات نقلية حتى تعرف/ كي يغير تأثير الدواء عليك. يجب تجنب الطفل /ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المزروع وما شابه.

تحذيرات:

إن إستعمال هذا الدواء قد يسبب تشوشًا في الرؤية أو مشكل في السمع.

يجرب إجراء فحوص الرؤية والسمع لأن ديسيفيرا يمكن أن يؤثر على الرؤية والسمع

لديك يتم إجراء هذه الفحوص كل 3 أشهر.

يجب إجراء فحوص الدم والبول قبل العلاج - ديسيفيرا وخلال

تقاس نسب الحديد (فريتين) في الجسم لدى مرض مع فائض من الحديد وذلك

لمعرفة لأي مدى ديسيفيرا يعدل.

إذا كنت تطورت عانيني/ تلوث، يمكن أن تؤثر على

النوى. كذلك يجب مراعاة النمو وزن الجسم بمواصل تسخينه زينة ثانية كل

3 أشهر). يأخذ الطبيب بعين الاعتبار الشخص عندما يقرر بخصوص المقدار الدوائي

الأكثر للأمانة للدورة كل من ديسيفيرا.

إذا كنت تتناول فيتامين C أثناء العلاج - ديسيفيرا على الطبيب أن يجري متانة

لوقاينات القلب أثناء العلاج مشترك كهذا.

لا يجوز إضافة فيتاينامين C للعلاج لدى مرض لديهم قصور قلب.

إن التسريب بسرعة زائدة - ديسيفيرا للوريدي يمكن أن يسبب إنتفاخ في ضغط الدم وارتفاع ضمة (مثل توقيت، نظم قلب سريع، شرى، إيهرا).

إذا خرطت لك أسلحة بخصوص كافية عمل ديسيفيرا أو سبب وصف هذا الدواء لك.

عليك أن تأسأله بخصوص كافية عمل ديسيفيرا أو سبب وصف هذا الدواء لك.

مشكل في وظائف القلب مثل توقيت، نظم قلب سريع، إنتفاخ في الضيق في الأذنين.

مرضى يستعملون ديسيفيرا للوريدي يمكن أن يسبب إنتفاخ في الضيق في الأذنين.

لك الطبيب فيتاينامين C. يجب تناول فيتاينامين C إذا وصف

لفترة شهر على الأقل قبل بدء تناول فيتاينامين C.

يجب تناول فيتاينامين C فقط

بجرعة حدود من قبل الطبيب. لا يجوز تجاوز جرعة قدرها 200 ملغم في اليوم

عام 50 ملغم في اليوم، وللأطفال فوق عمر 10 سنوات - تلك المقدار الذي ينفع

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تلاحظ/ين بـ لأن لطفلك/ تلك المعالجة - بـ ديسيفيرا نمو

أبطأ من المعتاد.

إن مقدار علية على ديسيفيرا لدى مرض مصابون بإضطرابات في الأذنين.

ما يبيو نتيجة زيارة أداء الأذن الوظيفي ونوابه، على

علاج الفائض من الألومنيوم يمكن أن يؤدي إلى إنتفاخ الكالسيوم في الدم وتتفاقم

فرط نشاط ظاظان الدرق، إن المعالجين الذين يرون حقن ذاتياً للمستحضر يجذبون

تجوبيها صارماً بـ تناوله حول آلية المحن.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لـ ديسيفيرا أو عقاقير قبل إستعمالك

للدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطي/ إن تناوله حالة ثالث الأداء الوظيفي العصبي ونوابه إلى نوابه، على

الألومينيوم، يمكن أن تتأثر حساسية زيارة أداء الأذن الوظيفي في الدورة الدموية.

علاج الفائض من الألومنيوم يمكن أن يؤدي إلى إنتفاخ الكالسيوم في الدم وتتفاقم

فرط نشاط ظاظان الدرق، إن المعالجين الذين يرون حقن ذاتياً للمستحضر يجذبون

تجوبيها صارماً بـ تناوله حول آلية المحن.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لـ ديسيفيرا أو عقاقير قبل إستعمالك

للدواء.

غذائية، إذا أنهيت العلاج لأن دواء آخر ف يجب إعلام الطبيب المعالج وذلك لتناول

الأطعمة التي تحتوي على المكونات التي تدخل في إنتاجه.


إلى المجموعات المائية، بـ يوكولوربريزين (من مشتقات فيتاينامين C)

(جمعة أعلى من 200 ملغم في اليوم أثناء العلاج - ديسيفيرا). لا يجوز تناول أكثر


من 200 ملغم في اليوم من فيتاينامين C (أنظر/ي «تحذيرات»)، جاليم - 67. دواء

يعطى قبل فحص الموضع ويستعمل لتشخيص أمراض معينة.

من الحالات التي تحتاج الأمر تغيير الجرعة أو إيقاف العلاج بأحد الأدوية.



1




2



3



4



5



6



7



8



9

عندهما يعطي ديسيفيرا بالحقن تحت الجلد
ديسيفيرا مخصوص للإستعمال ك محلول ضمن ماء للحقن
يجب إعطاء مسحوق ديسيفيرا في ماء مخصوص ضمن ماء للحقن تم إعطاء ذلك من قبل
الصيبي، بالتركيز الموصى به وقدره 95 ملغم/ملل وذلك يحب الخص بتصوره
جديدة، المحلول الجاهز يكون ماء المحلول (أي الماء الذي يعطيه الماء) و ما يليه
يجب أن يكون المحلول رائق. لا يجوز إستعمال محلول عكر
قيمة واحدة هي أحدي الإستعمال. بعد خلط المستحضر يجب إستعماله حالاً (أي
البدء بالعلاج خلال 3 ساعات).

علاج فائض الحديد المزمن:
يتم إعطاء ديسيفيرا عن طريق التسريب البطيء، تحت الجلد (حقنة تحت الجلد)
يمكن إعطاء ديسيفيرا عن طريق التسريب البطيء، داخل الوريد أو بالحقن داخل العضلة.
يمكن للطبيب أو الممرضة أن يحضرها الحقن من أجلك، أو يعلمك كيفية عمل ذلك
بنفسك.

للعلاج المطول يعطى ديسيفيرا من المريض بصورة خاصة إعطاء ديسيفيرا ببطء تحت
الجلد لفترة 8 - 12 ساعة (مثلاً أثناء الليل). عن طريق إستعمال مسحوق ديسيفيرا
متقلقة. يستعمل عادة ديسيفيرا بالمضخة 5 - 7 مرات في الأسبوع.

وتيرة غير معروفة - لا يمكن تحديد وتيرة الأعراض الجانبية بصورة موثقة.
أعراض جانبية يمكن أن تحدث بشيء معين يعرف كالتالي:

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أكثر من 10 معالجين لكل 100
معالج.
أعراض جانبية شائعة يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 100
معالج.
أعراض جانبية غير شائعة يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 10,000 معالج.
أعراض جانبية نادرة يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين كل 10,000 معالج.
أعراض جانبية نادرة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 100 معالج.
أعراض جانبية شائعة يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 100 معالج.
أعراض جانبية غير شائعة يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على بين معالج واحد إلى 10 معالجين لكل 10,000 معالج.
أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

أعراض جانبية شائعة جداً يمكن أن تؤثر على أقل من معالج واحد لكل 10,000 معالج.

رقم سجل الدواء: 107 07 21532

المصنع: Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH

فارما آبي جي، بازل، سويسرا.

صاحب المنشأ: بوغاريتس إسرايل م. هن.. ص. ب. 7126، تل أبيب.

تم إعداده بـ حزيران 2020