

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) **1986**

بِسوقِ الدواء حسب وصفة طبيب فقط

لوپريسور ديفيتابيس 200 ملغ

أقراص مطلية ذات تحرير بطيء

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على: ميتوبرولول تارترا 200 ملغ
Metoprolol tartrate 200 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

إفرا النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. احفظ هذه النشرة. من الجائز أن تحتاج إلى قرانها ثانية. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك

1) لا ي غرض مخصص للدواء؟

الدواء مخصص لعلاج إرتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية (angina pectoris)، وعدم انتظام نظم القلب. لمنع الشقيقة ولمنع تكرر حادث إحتشاء عضلة القلب.

يوسف لوپريسور ديفيتابيس الأوعية الدموية وبذلك يخفض من ضغط الدم.

الفصيلة العلاجية: من حاجيات المستقبل بيتا.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (ألرجي) لـ (ميتوبرولول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» أو لأي دواء آخر من فصيلة حاجيات المستقبل بيتا. بعض أعراض رد الفعل التحسسي قد تشمل طفح حكة أو شرى في الجلد؛ إنتفاخ في الوجه. في الشفتين، في اللسان أو في أجزاء أخرى من الجسم؛ ضيق في التنفس، صفير أو مشاكل في التنفس.

- وجدت لديك إحدى الحالات الطبية التالية:

• ربو صفي في التنفس، صعوبات في التنفس أو مشاكل خطيرة أخرى في الرئتين. في أو إذا وجدت لديك هذه المشاكل في السابق.

• نظم قلب بطيء جداً، أقل من 50-45 نبضة في الدقيقة.

• إنخفاض ضغط الدم.

• اضطراب خطير في الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى جريان ضعيف للدلم في الأطراف (الأذراعين والرجلين).

• ورم نادر في الغدة الكظرية غير المعالج بأدوية أخرى (ورم خلايا الكروماتين الفاتمة).

• مشاكل أخرى معينة في القلب.

إذا لم تكن وثافاً فيما إذا كانت إحدى الحالات الطبية المذكورة أعلاه تنطبق عليك، إستوضح عن ذلك من الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل أن تبدأ إستعمال لوپريسور ديفيتابيس، إحك للطبيب إذا كنت حساساً لـ:

• أدوية أخرى، طعام، ملونات أو مواد حافظة.

• لوبه النحل أو الدبابير.

يرغب الطبيب في معرفة إذا كان لديك ميل لحدوث تحسس. إن فصيلة الأدوية من نوع حاجيات المستقبل بيتا قد تفاعلم رد الفعل التحسسي.

إحك للطبيب إذا وجدت لديك إحدى المشاكل الطبية التالية:

• مشاكل في القلب

• إرتفاع نسبة السكر في الدم (سكري)

• فرط نشاط الغدة الدرقية

• مشاكل في الكبد

- أنواع معينة من الذبحة الصدرية تشمل: Prinmetal angina أو Variant angina (الأم في الصدر أثناء الراحة)
- جريان ضعيف للدم في الأطراف (مثلاً برودة شديدة وشحوب في راحتي اليدين أو راحتي القدمين. أو آلام في عضلات الرجلين أثناء المشي)
- ورم في لب الغدتين الكظريتين (pheochromocytoma) - يتطلب الأمر العلاج بالإضافة لـ لوپريسور ديفيتابيس
- في حال إجتيارك لعملية جراحية بالتخدير خلال فترة العلاج بـ لوپريسور ديفيتابيس
- أمراض تنفسية مثل الربو
- متلازمة خطيرة تدعى oculomucocutaneous syndrome حيث أن أعراضها تشمل إتهاب شديد في ملتزمة العين، طفح في الجلد وإتهاب الأبتين

إحك للطبيب إذا لاحظت أو قاسيت إحدى الحالات التالية. خلال فترة العلاج بـ لوپريسور ديفيتابيس.

- زرف أو ظهور كدمات بشكل عفوي
- نبض بطيء جداً أو نبض غير منتظم
- إصفرار الجلد والعينين، غثيان، قلة الشهية للطعام وبول داكن
- ضيق في التنفس، صعوبة التنفس أثناء الإستلقاء، إنتفاخ في راحتي القدمين أو الرجلين
- غثيان

إذا وجد لديك واحد أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه يجب إبلاغ الطبيب حالاً.

من الجائز أن يرغب طبيبك في إتخاذ وسائل حذر خاصة إذا وجدت لديك إحدى الأعراض المذكورة أعلاه

إذا قاسيت من رد فعل تحسسي لطعام، دواء آخر أو لبس الحشرات خلال فترة العلاج بـ لوپريسور ديفيتابيس، راجع الطبيب فوراً، قد يفاعلم لوپريسور ديفيتابيس رد الفعل التحسسي أو يتسبب من عوارضه.

إذا كنت تشعر بدهار أو بإغماء عند نهوضك من الفراش أو عند الانتقال إلى وضعية الوقوف، إذهب إلى الطبيب.

من الجائز أن تشعر بدهار في بداية العلاج، ناجم عن هبوط مفاجئ في ضغط الدم. إذا لم تزول المشكلة من تلقاء ذاتها، إستشر الطبيب.

لتجنب أعراض إنخفاض ضغط الدم، فيما يلي عدة إشارات التي قد تساعذك:

- قف ببطء للسماح لجسمك التعود على التغير في وضعية الجسم، وضغط الدم.
- إذا شعرت بدهار، إجلس أو إستلقي إلى أن تشعر بشكل أفضل.
- إذا كنت تتغير بلبانك توشك على الإغماء، إستنشق وعمق وإنحني للأمام بحيث يكون رأسك بين ركبتيك.

• إنتبه خاصة عندما تمارس الرياضة البدنية، تقود أو تقف لفترة زمنية طويلة. خاصة في الطقس الحار. إشرّب الكثير من السوائل، خاصة إذا كنت تعرق كثيراً.

إذا كنت تتعالم لوجود مرض السكري لديك، إحرص على فحص نسب السكر لديك بشكل دائم وبلغ طبيبك عن أي مشكلة. قد يؤثر لوپريسور ديفيتابيس على موازنة مرض السكري لديك. من الجائز ألا تظهر العلامات التحذيرية التي تدل على إنخفاض نسب السكر، مثل ضربات قلب سريعة، والفترة الزمنية لإخفاض نسبة السكر في الدم قد تكون أطول. من الجائز أن يحتاج الأمر إلى تغيير المقدم، الدوائي للأدوية السكري الخاصة بك.

إذا كنت تخطط لإجتيار عملية جراحية وتطلب الأمر إستعمال مواد تخدير، بلغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول لوپريسور ديفيتابيس. هذه المعلومات تساعد الطبيب على تجنب حدوث أعراض جانبية غير مرغوبة مثل إنخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

إحرص على أن ترتدي ملابس دافئة في الطقس البارد، خاصة إذا كنت ستمكث لفترة طويلة في الخارج. وبالضمان للأدوية الأخرى من فصيلة حاجيات بيتا، فإن لوپريسور ديفيتابيس قد يسبب لك فرط حساسية لدرجات الحرارة المنخفضة.

خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في جريان الدم. إن أدوية من هذه الفصيلة لديها قابلية للتقليل من تدفق الدم إلى الجلد، إلى أصابع اليدين والقدمين.

قبل بدء إستعمال أدوية جديدة، بلغ الطبيب والصيدلي بأنك تتناول لوپريسور ديفيتابيس، بلغ أي طبيب آخر، طبيب الأسنان أو الصيدلي الذين يعالجونك بأنك تتناول لوپريسور ديفيتابيس.

الأطفال والمرافقون:

الدواء غير مخصص للأطفال، لا تتوفر معلومات كافية عن إستعمال الدواء لدى الأطفال

الفحوص والمتابعة:

- إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، من الجائز أن يجري الطبيب فحص دم ويراقب الأداء الوظيفي لقلبك.

- إذا كنت تعاني من إرتفاع نسب السكر في الدم (سكري)، من الجائز أن يفحص الطبيب نسبة السكر في الدم بشكل دائم.

- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، من الجائز أن يفحص الطبيب وظائف الغدة الدرقية والقلب وليك بشكل دائم.

- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، فمن الجائز أن يجري الطبيب فحوص دم معينة ويراقب الأداء الوظيفي لقلبك.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

• أدوية أخرى من فصيلة حاجيات بيتا بما في ذلك فطارات للعينين

• أدوية أخرى تستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم مثل حاجيات قنوات الكالسيوم وكوليستيرين

• أدوية مضادة للإكتئاب من فصيلة منبجطات منونامين أوكسيداز (MAOI)

• أدوية أخرى تستعمل لعلاج عدم إنتظام نبض القلب (اللانظمية)

• إندومييتاسين، دواء يستعمل لتسكين آلام المفاصل (arthritis) أو الإتهاب

• سيميتيدين، دواء لقرحة المعدة

• مواد التخدير الموضعي أو العام المستعملة في العمليات الجراحية

• أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل: فلوأوكسيتين، پاروكسيتين أو بوبروبيون)

• أدوية مضادة للذهان (مثل: ثيوريدارين)

• أدوية لعلاج HIV/إيدز (مثل: زيتونافير)

• أدوية لعلاج الحساسية/حمى العلف (مثل: ديفينهيدرامين)

• أدوية لعلاج الملاريا (مثل: هيدروكسي كلوروكوين أو كينيدين)

• أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل: تريبنافين)

• قلويدات الأيونوغ، فصيلة أدوية تستعمل لمنع وعلاج الشقيقة

• ديبيريدامول - دواء يستعمل لتقليل الخطورة لحدوث خثرات دموية

• أدوية أخرى التي قد تؤدي إلى إنخفاض في نظم القلب (مثل: فينجلومبول)

• دواء يستعمل لعلاج التسلب المتعدد

• أدوية أخرى التي قد تؤدي إلى إنخفاض في ضغط الدم (مثل: ألتيسلوكوين، دواء يستعمل لعلاج سرطان الكلى)

من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقادير الدوائية للأدوية أو تغيير الأدوية ذاتها.

إستعمال الدواء وطعام:

يمكنك تناول لوپريسور ديفيتابيس مع أو بدون طعام، وفقاً لتوصية الطبيب.

الحمل، الإرضاع والحساسية:

إحكي للطبيب إذا كنت في فترة الحمل

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء. من شأن لوپريسور ديفيتابيس أن يؤثر على طفلك، خاصة إذا تناولت الدواء في الأيام الأخيرة قبل الولادة.

يناقشك الطبيب حول المخاطر المحتملة والفوائد من تناول لوپريسور ديفيتابيس خلال فترة الحمل.

إحكي للطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين الرضاعة

إذا كنت في فترة الرضاعة، أو تخططين للإرضاع توجهي إلى الطبيب للإستشارة. المادة الفعالة في لوپريسور ديفيتابيس تنتقل إلى حليب الأم وهناك إمكانية لتأثر رضيعك من ذلك.

السيفاية وإستعمال الماكناط:

توخى الحذر عند إستعمال السيفاية فتشغيل الماكناط أو عند القيام بنشاطات تتطلب منك أن تكون قطعاً خالراً فترة تناول لوپريسيور ديفيتابيس إلى أن تكون مدركا لكيفية تأثيره عليك المشابهة لأدوية أخرى من فصيلة حاجيات بيتا. قد يؤدي لوپريسيور ديفيتابيس إلى حدوث دوام أو صداع طفيف أو ذهني في اليفظة لدى بعض الأشخاص. إذا وجدت لديك إحدى هذه الأعراض. فلا تقم بالسيفاية أو تنفيذ نشاط آخر قد يعرضك للخطر.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالحد من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة 100 حتى 200 ملغ في اليوم. من الجائز أن يقرح الطبيب مقدار دوائي أكبر أو أخفض وفقاً لإستجابتك للعلاج. يجب تناول لوپريسيور ديفيتابيس مرة واحدة في اليوم. في الصباح. إذا دعت الحاجة ووفقاً لتوصيات الطبيب مرة إضافية في المساء.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

كيفية الإستعمال:

يجب بلع القرص دون مضغ. مع كأس من الماء بالإمكان تناول لوپريسيور ديفيتابيس مع أو بدون طعام. إذا دعت الحاجة ووفقاً لتوصيات الطبيب. بالإمكان شطط القرص على طول خط الشطر ومن ثم بلع نصف القرص بأكمله. من دون مضغه. مع كأس من الماء.

فترة العلاج:

واصل تناول الدواء لظالماً ويوصيك الطبيب بذلك. سيأخذ لوپريسيور ديفيتابيس إلى السيطرة على الأعراض لكنه لا يشفي بمراسك. يخصص الطبيب بتردد لمتأكد من أن الدواء يعمل ويفر كم ستكون فترة العلاج. إذا لم تكن واثقاً تحدث مع الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

أعراض لفرط المقدار الدوائي من شأنها أن تشمل: الشعور بغثيان وتقيؤ وإزراق الجلد والأظافر نبض بطيء أو نبض غير منتظم؛ ضغط دم منخفض جداً؛ ضيق في التنفس؛ صعوبة التنفس أثناء وضعية الإستلقاء؛ إنتفاخ راحتي القدمين؛ إغماء؛ نسيجات؛ غثيان؛ تقيؤ؛ تغير لون الشفتين. اللسان والجلد إلى اللون الأزرق؛ إحتلاجات. فقدان الوعي؛ مثل ضاغط ومضاجن في الصدر ووهافة وإذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء. توجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى أو وأحضر عليه الدواء معك. من الجائز أن يتطلب الأمر علاجاً طبياً.

إذا نسيبت تناول الدواء

إذا حان تقريباً موعد الجرعة الدوائية التالية (مثلاً بعد حوالي 2-3 ساعات). قوّت المقدار الدوائي المنسي وتناول المقدار الدوائي التالي وفقاً لنظام العلاج الإعتيادي. في حالة أخرى. تناول المقدار الدوائي للفترة تذكرك بذلك. ومن ثم أعيد تناول الدواء وفقاً لنظام العلاج الإعتيادي.

إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. هذا الأمر قد يزيد من إحتماية مضاسات من أعراض جانبية غير مرغوبة. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب. حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية إذا توقفت عن تناول الدواء:

من الجائز أن يرغب الطبيب في خفض المقدار الدوائي بالتدرج قبل التوقف عن العلاج. هذا الأمر يساعد في تقليل إحتماية تفاقم حالتك أو ظهور مشاكل غير مرغوبة في القلب.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشتر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

إحتل للطبيب أو للصيدلي بأسرع ما يمكن إذا شعرت بسوءه خلال فترة إستعمال الدواء. كما بكل دواء. إن إستعمال لوپريسيور ديفيتابيس قد يسبب

أعراضاً جانبية بعد بعض المستعملين. لا تنتهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها

معالجون فوق عمر 65 سنة لديهم إحتمال أكبر للمقاساة من أعراض جانبية. إذا توفّر لديك أي سؤال توجه للطبيب أو للصيدلي.

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تكون خطيرة ومن الجائز أن تحتاج لعلاج طبي؛ يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى الأقرب إذا لاحظت إحدى الحالات التالية:

- علامات حساسية مثل إنتفاخ في الوجه. الشفتين أو اللسان الذي قد يشكل مشكلة في البلع أو التنفس
- ضغط في الصدر. صعوبات في التنفس
- ضيق في التنفس. أحياناً يترافق بإرهاق. ضعف أو تراجع في القدرة على القيام بنشاطات بدنية
- إنتفاخ في القدمين أو الرجلين جراء تراكم السوائل
- الشعور بالبرد. حرقة أو الألم في الذراعين والرجلين
- الآم في الصدر

تغيرات في نظم القلب (بطيء سريع غير منتظم)

- إصفرار الجلد أو العينين (يرقان) يترافق أحياناً بالألم في البطن
- أعراض تترافق بالشعور بوهكة دائمة (قشعريرة) سخونة. ألم في الحنجرة.

ألم في المفاصل. إنتفاخ الغدد. إرهاق أو قلة حيوية

- نزف شاذ أو ظهور كدمات

• دود فعل جلدية (طفح حكة. تفاقم الصدفية)

- أعراض حرقوق الشمس (إحمرار حرق. إنتفاخ ظهور حويصلات) التي تظهر أسرع بكثير من المعتاد

• سخونة في التفكير أو هذيان (وهبة أو سماع أشياء غير حقيقية)

- صعوبة التنفس. صعوبة التنفس خلال وضعية الإستلقاء. إنتفاخ القدمين أو الرجلين. أعراض لإضطرابات في القلب

• برودة وخدر في أصابع القدمين أو أصابع اليدين. علامات محتملة لمتلازمة رينو (Raynaud's syndrome)

الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه قد تكون جدية. من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي.

أعراض جانبية إضافية

راجع الطبيب في حال شعورك بواحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية

وكانت تعسك:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- دوار الرأس أو إغماء
- صداع
- غثيان أو تقيؤات
- ألم في البطن
- إرهاق

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000:

- تقلصات عضلية
- كوابيس ليلية
- إكتئاب أو تغيرات أخرى في المزاج
- إسهال أو إمسك
- صعوبة في التنفس تترافق بصغير أو سعال
- إنتفاخ
- ضربات قلب
- ذهني اليفظة. ميل للنوم أو أرق (مشاكل في النوم)
- خدر. وخز في الأطراف. علامات لتشل (paresthesia)

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- حفاظ أو تهيج في العينين. تشوش الرؤية
- أزيز أو طنين في الأذنين
- صعوبة في السمع

- حفاظ في الفم
- تعرق زائد
- سعال الألف
- زيادة في الوزن
- نساظ الشعير
- عدم سلامة نتائج فحص وظائف الكبد
- نخر لدى متعالمين لديهم إضطرابات شديدة قائمة في الدورة الدموية
- الحويصلة

• تفاقم في المناطق السميكة للجلد الأحمر/فضي - علامات لتفاقم الصدفة

• ألم وتصلب في المفاصل. علامات للإنتهاب في المفاصل

- مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي
- تغيرات في القدرة على تحقيق إنتصاب العضو الذكري أو الحفاظ على إنتصاب العضو الذكري

• ألم أسفل الظهر. إضطراب كلوي. إرتفاخ ضغط الدم. خثرات دموية - هي علامات ممكنة لنمو نسيج ليفي في منطقة بالجسم (تسمى retroperitoneum) الحاسوبية اللازمة للكليتين الشريان الأبر. الجهاز الكلوي وأعضاء إضافية أخرى

أعراض جانبية شديدة غير معروفة:

- إرتباك
 - قيم غير سليمة للشعوم الثلاثية في الدم
 - قيم غير سليمة للكولسترول في الدم
- إذا ظهر عرض جانبي. إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية. أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة. عليك إستشارة الطبيب

بالمكان التبعي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن الأعراض الجانبية علاج جاف دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى النموذج المتاحر للتبليغ عن أعراض جانبية. أو عن طريق التبليغ الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au/>

5 كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع. وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تنسب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. بتشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً Magnesium stearate; silica, colloidal anhydrous; calcium hydroxy phosphate dihydrate; cellulose, microcrystalline; hydrogen phosfatetearate; hypromellose; eudragit NE 30 D; iron oxide yellow, polysorbate 80; titanium dioxide; talc.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي على شكل كبسولة. لونه أصفر فاتح. محدد ومع خط للشطر عميق من كلا الجانبين. تم طباعة CG/CG في جانب واحد. وطباعة CDC/CDC في الجانب الثاني. في كل عبوة يوجد 14 قرصاً.

صاحب الإمتياز وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م. ص. ب. 7126. تل أبيب

اسم المنتج وعنوانه: نوفارتيس ساجليك. جيتا في تاريم أو روتلير. سان في تيك. إ. إس. تركيا. من أجل نوفارتيس فارما إبي جي. سويسرا.

تم إعدادها في نيسان 2020

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 23224 045 04

من أجل سهولة وتسهيل القراءة. تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر على الرغم من ذلك. فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.