

עלון לצרכן לפי תקנות הרחמים (הכשרים) התשמ"ו -1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

לופרסור דיויטבס 200 מ"ג טבליות מצופות בשחרור איטי

החומר הפעיל:

לל טבליה מכילה: מטופרולול טרטראט 200 מ"ג Metoprolol tartrate 200 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קריא בעיון את העלון עד סופו בטרים ששתמש בתרופה.
עלון זה הופק למידע ומצטיין על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל המכיל או אל הרוקח.
שמור עלון זה.
ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך.
אל תעביר אותה לאחרים.
היא אינה רגללית.

1. למה ליהיה תרופה התרופה?
התרופה מועדת לטיפול ביתר לחץ דם, באנגינה פקטוריס (תעוקת חזה), וקוצב לב לא סדיר, למניעת מגרנה ולמניעת אירוע חוזר של אוטם שריר הלב.
לופרסור דיויטבס מרחיב כלי דם וכך מפחית את לחץ הדם.

קבוצת תרופטים: חוסמי יציגפוט בטא.

2. לפני השימוש בתרופה

א. את השתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) למטופרולול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף") או לכל תרופה אחרת ממשפחת חוסמי יציגפוט בטא.
חלק מההסתמנים של תגובה אלרגית עלולים לקבול פריחה, גרד או סרפדת בעור; נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בחלקים אחרים של הגוף; קוצר נשימה, צפצופים או בעיות מבנישמי.
יש לך אחד מהמצבים הרפואיים הבאים:

• אסתמה, צפצופים מבניים, קושי נשימה או בעיות חמורות אחרות בריאות, או אם היו לך בעות אלו בעבר.

קצב לב איטי מאוד, נמוך מי- 45-50 פעימות בדקה.

הפרעת כלי ידם חמורה הגורמת לזרימת דם חלשה בגפיים (ירעות ורגליים).

גידול דיר שגיטנו מטופל על-ידי תרופות אחרות בבלוטת האדרנל (pheochromocytoma).

אם אינך בטוח אם אחד מהמצבים הרפואיים המצוינים מעלה תקף לעובר, בדוק זאת עם הרופא.

אהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפי שאתה מתחיל להשתמש בלופרסור דיויטבס, ספר לרופא אם אתה אלרגי ל:

- תרופות אחרות, מוון, צבעים או חומרים משמרים.
- עקיצות דברים או צרעות.
- הרופא ירצה לדעת אם יש לך נטייה לאלרגיות. קבוצת התרופות מסוג חוסמי יציגפוט בטא עלולות להחמיר תגובה אלרגית. ספר לרופאי אם יש לך אחת מהבעיות התרופאיות הבאות:

- בעיות בלב
- רמת סוכר גבוהה בדם (סוכרת)
- פעולות יתר של בלוטת התריס
- בעיות כבד

- סוגים מסוימים של אנגיה כולל: angina Prinzmetal או angina Variant (כאבים בחזה בזמן מנוחה)
- זרימת דם חלשה בגפיים (לדוגמה, כפות ידים או כפות רגליים קרות מאוד וחיוורות, או כאבים בשרירי הרגליים בזמן הליכה)

- גידול במדולה של בלוטות האדרנל (pheochromocytoma) - יהיה צורך בשטפול, בנוסף לופרסור דיויטבס
- אם הינך עובר ניתוח בהדרכת המנהלך הטיפול בלופרסור דיויטבס

- מחלות נשימה כגון אסתמה
- הסתגות חמורה כולם שהסימנם שלה כוללים דלקת חמורה בלחמית העין, פריחה בעור וזלקת אזניים

ספר לרופא אם הבנתו או חווית באחד מהמצבים הבאים, במהלך הטיפול בלופרסור דיויטבס:

- דימום או הפוגעת בתכרות באופן ספונטני
- דופק איטי מאוד או זיבור לא סדיר
- עור ועינים צהובים, בחילה, חוסר תאבון ושתן כהה
- קוצר נשימה, קושי לנשום בזמן שכיבה, נפיחות של כפות הרגליים או הרגליים
- הזיות

אם יש לך אחד או יותר מהסתמנים שצינונו מעלה יש ליידע את הרופא מייד.

ייתכן שהרופא שלך ירצה לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים אם יש לך אחד מהסתמנים שצינונו מעלה.

אם אתה חווה תגובה אלרגית למזון, תרופה אחרת או עקיצת חרק במהלך השימוש בלופרסור דיויטבס, פנה לרופא באופן מייד.
לופרסור דיויטבס עלולה להחמיר את התגובה האלרגית או להקשות על הטיפול בה.

אם אינך חש בסחרחורת או עילפון כאשר אתה קם מהמיטה או עובר למצב עמידה, עשה זאת באיטיות.

ייתכן שתרגיש סחרחורת עם תחילת הטיפול, הנגרמת בשל צניחה פתאומית בלחץ הדם. אם הבעיה אינה חולפת מעצמה, היוועץ ברופא.

כבדי להמנע מהסתמנים של לחץ דם נמוך, להלן כמה רמזים העשויים לסייע לך:

• קום לאט כדי לתת לגופך להתרגל לשינוי במנה הגוף ובלחץ הדם.

- אם אתה מרגיש סחרחורת, שב או שכב עד שתחוש טוב יותר.
- אם אתה מרגיש שאתה עומד להתעלף, נשום עמוק והתכוּפך קדימה עד שהראש בין הברכיים.

- שים לב במיוחד כשאתה מתעמל, נוהג או עומד למשך זמן ממושך, במיוחד במזג אויר חם. שתה הרבה נוזלים, ביחוד אם אתה מזיע הרבה.

אם הינך מטופל לסוכרת, הקפד לבדוק את רמות הסוכר שלך בקביעות ודונון על לב בעיה לרופא שלך.
לופרסור דיויטבס עלולה להשפיע על איזון הסוכרת שלך. ייתכן שסימני האזהרה המצביעים על רמות סוכר נמוכות, כמו דיפקות לב מהירות, לא יופיעו ומשך הזמן בו רמות סוכר נמוכות בדם עלול להיות ארוך יותר. ייתכן שיהיה צורך בשינוי מנתן התרופות שלך לסוכרת.

אם אתה מתכנן לעבור ניתוח יהיה צורך בשימוש בחומרי הדדמה, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל לופרסור דיויטבס.
המידע יסייע לרופא למנוע תופעות לוואי בלתי רצויות כגון ירידה פתאומית בלחץ הדם.

הקפד להתלבש בבגדים חמים במזג-אוויר קר, במיוחד אם תשהה בחוץ לזמן ממושך.
בדומה לתרופות אחרות ממשפחת חוסמי בטא, לופרסור דיויטבס עלולה לגרום לך רגישות יתר לטמפרטורות נמוכות, במיוחד אם אתה סובל מבעיות בזרימת הדם. התרופות ממשפחה זו נוטות להפחית את זרימת הדם לעור, לאצבעות הידיים והרגליים.

לפני התחלת שימוש בתרופות חדשות, ספר לרופא ולרוקח שאתה נוטל לופרסור דיויטבס.

ספר לכל רופא אחר, רופא שיניים או רוקח שמטפלים בך

ילדים ומתבגרים:

התרופה אינה מיועדת לילדים. אין מפקיך מידע על השימוש בתרופה בילדים.

בידוק ומעקב:

- אם הינך סובל מבעיות בלב, ייתכן שהרופא יבצע בדיקת דם ינטר את הפקוד הלב שלך.

- אם הינך סובל מרמת סוכר גבוהה בדם (סוכרת), ייתכן שהרופא יבדוק את רמת הסוכר בדם שלך באופן קבוע.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
המינון המקובל בדרך כלל הוא 100 עד 200 מ"ג ביום.
בהתאם לתגובתך לטיפול, ייתכן שהרופא יציע מינון גבוה יותר או נמוך יותר. יש לטובל לופרסור דיויטבס פעם אחת ביום, בבוקר.
במידת הצורך ובהתאם להמלצות הרופא פעם נוספת בערב.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חוונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד אם אתה לוקח:
תרופות אחרות ממשפחת חוסמי בטא כולל טיפות עיניים
תרופות אחרות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם כגון חוסמי תעלות סידן וקלונידין

תרופות נגדות דיכאון ממשפחת מעכבי מנואמיין אוקסידז (MAOI)
תרופות אחרות המשמשות לטיפול בדופק לא סדיר (אריתמיות)

תרופות אנדומטרל
תרופה המשמשת לשיכוך כאבי פרקים (אריתמיות) או דלקת
סטימדיין, תרופה לכיב קיבה
חומרי הדדמה מסוימית לך עלולות בשמוש בזמן ניתוח תרופות לטיפול בדיכאון (כגון: פלואוקסטין, פארוקסטין או בורפרוזין)
תרופות אנטי-פסיוכטיות (כגון: תיורידאזין)
תרופות לטיפול ב-HIV/איידס (כגון: ריטונאוויר)

תרופות לטיפול באלרגיה/קדחת השבת (כגון: דיפנהידראמיין)

תרופות לטיפול באלרגיה מבלריה (כגון: דינוקסיכולורוקוין או קווינידין)
תרופות לטיפול בדיהימון פטרל (כגון: טרובנאפוין)
אלקולואידים של ארגוט - קבוצת תרופות המשמשות למניעה וטיפול במיגרנות
דיפירידמול - תרופה המשמשת להפחתת הסיכון לקרישי דם

תרופות אחרות העלולות לגרום לירידה בקצב לב (כגון: פינגולמוד, תרופה המשמשת לטיפול בטרשת נפוצה)
תרופות אחרות העלולות לגרום לירידה בלחץ דם (כגון: אלדולוקוין, תרופה המשמשת לטיפול בסרטן כליה)

ייתכן שתצטרך לשנות את המינונים של התרופות או את השימוש בתרופה מזון:

אתה יוכל לטובל לופרסור דיויטבס עם או ללא מזון, בהתאם להמלצת הרופא.

הריון, הנקה ופוריון:

ספרי לרופא אם את בהריון
אם הינך בהריון או מניקה יש היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

לופרסור דיויטבס עשויה להשפיע על התינוק שלך, במיוחד אם הנטי לא תתרופה בימים האחרונים לפני הלידה.

הרופא ידון עמך בסיכונים המ אפשריים והיתרונות שבנטילת לופרסור דיויטבס בזמן הריון.

ספרי לרופא אם הינך מניקה או מתכננת להניק
אם את מניקה, או מתכננת להניק פני לרופא לייעוץ.

החומר הפעיל בלופרסור דיויטבס עובר לחלב האם ויש סיכוי שהתינוק שלך ישפיע.

נהיגה ושימוש בכוחנית:

היזהר בנהיגה, בהפעלת כוחנית או בשאבו פעולות הדורשות את רענותך במהלך נטילת לופרסור דיויטבס עד שתדע כיצד היא משיפעה עליך.
כמו תרופות אחרות ממשפחת חוסמי בטא, לופרסור דיויטבס

עלולה לגרום לסחרחורת, כאב ראש קל או לירידה בערנות בחלק מהאנשים. אם יש לך אחד מהסתמנים אלו, אל תנהג או תבצע פעולה אחרת העלולה להיות מסוכנת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
המינון המקובל בדרך כלל הוא 100 עד 200 מ"ג ביום.
בהתאם לתגובתך לטיפול, ייתכן שהרופא יציע מינון גבוה יותר או נמוך יותר. יש לטובל לופרסור דיויטבס פעם אחת ביום, בבוקר.
במידת הצורך ובהתאם להמלצות הרופא פעם נוספת בערב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:

יש לבלוע את הטבליה מבלי ללעוץ עם כוס מים.

ניתן לטובל לופרסור דיויטבס עם או ללא אוכל.

במידת הצורך בהתאם להמלצות הרופא, ניתן לחצות את הטבליה לארוך קו החציהה ואז יש לבלוע את חצי הטבליה בשלמותה, מבלי ללעוץ, עם כוס מים.

משך הטיפול:

המשך לטובל של התרופה כל עוד הרופא מורה לך.

לופרסור דיויטבס מסייעת לך לשלוט בתסמינים אך היא אינה מרפאת את מחלתך. הרופא יבדוק את התקדמותך כדי לוודא שהתרופה פועלת ויחליט מה יהיה משך הטיפול. אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

הסתמנים של מינון יתר עשויים לכלול:
תחושת בחילה והקאה, הכחלה של העור והציפורניים, דופק איטי או דופק לא סדיר;
לחץ דם נמוך מאוד;
קוצר נשימה;
קושי לנשום בזמן שכיבה;
נפיחות של כפות הרגליים;
עולפון;
עוויתות;
בחילה;
הקאה;
שינוי בבע עשתיים, הלושין והעור לכהול;
פרוכסוים, איבוד הכרה;
כאב מעיק ופנואמינו בחזה ומוות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא אריות התרופה איתך. ייתכן כי יידרש טיפול רפואי.

אם שכתח לטובל את התרופה

אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה (לדוגמה בעוד כ- 2-3 שעות), דלל על המנה שנשכחה וקח את המנה הבאה בהתאם לשגרת הטיפול הרגילה.

במקרה אחר, קח את המנה ברגע שזוכרת, ולאחר מכן חזור לטובל את התרופה בהתאם לשגרת הטיפול הרגילה.

אם שכתח לטובל תרופה זו בזמן המיועד, אין לטובל מנה כפולה.
זה עלול לגביר את הסיכוי שתחושה תופעות לוואי בלתי רצויות.

קח את המנה הבאה בזמן הרגיל היוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מופסיק את נטילת התרופה:

ייתכן כי הרופא ירצה להפחית את המינון בהדרגה לפני הפסקת הטיפול.

זה יעזור להפחית את הסיכוי להחמרה במצבך או להופעת בעיות לב לא רצויות.

אין לטובל תרופות בחושך!
בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

ספר לרופא או לרוקח בהקדם האפשרי אם אינך חש בטוב במהלך השימוש בתרופה.

כמו בכל תרופה, השימוש בלופרסור דיויטבס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל ללקרוא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

מטופלים מעל גיל 65 לרוב בעלי סיכוי מוגבר לחוות תופעות לוואי.

פנה אל הרופא אם הינך חש שאלה שיש לך.

תופעות לוואי מסוימות עשויות להיות חמורות וייתכן שחדדק לטיפול רפואי:

יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון בבית החולים הקרוב ביותר אם אתה מבחין באחד מהמצבים הבאים:

• סימני אלרגיה כמו נפיחות בפנים, בשפתיים או בלשון שעלולים ליצור בלביעה ובנשימה
• לחץ בחזה, צפצופים, קושי נשימה
• קוצר נשימה, לעיתים מלווה בעייפות, חולשה או ירידה ביכולת לבצע פעולות גופנית

נפיחות בכפות הרגליים או הרגליים עקב צבירת נוזלים
תחושת קור, צריבה, חוסר תחושה או כאבים בורעות וברגליים
כאבים בחזה
שינויים בקצב הלב (איטי, מהיר, לא סדיר)
הצטבה של העור או העיניים (צהבת)
לעיתים מלווה בכאב בטן
הסתמנים של כוחות חולי תמדת(צמממות, חום, כאב גרון, מפרקים כואבים, בלוטות נפוחות, עייפות או חוסר אנרגיה)

דימום חריג או הפוגעת חבורות
תגובות עוריות (פריחה, גרד, החמרה של פסוריאזיס)

הסתמנים של צנזופם (אדמומיות, גרד, נפיחות, הפוגעת שלפוחיות)
המופיעים הרבה יותר מהר מרגיל

חשיבה חריגה או הזיות (ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים)

קוצר נשימה, קושי לנשום בזמן שכיבה, נפיחות של כפות הרגליים או הרגליים, סימנים להפרעות בלב
בהגות באצבעות קרות או חסרות תחושה, סימנים אפשריים להסתמנים רייטי (Raynaud’s syndrome)

תופעות לוואי שהזכרתי מעלה עלולות להיות רציניות, ייתכן שתצטרך

טיפול רפואי.

תופעות לוואי נוספות

פנה לרופא במקרה שאתה מרגיש אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות וזמן מטרידות אותך:

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:

- סחרחורת
- ראש-סחרחור או עילפון
- כאב ראש
- בחילות או הקאות
- כאב בטן
- עייפות

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000:

- התכווציות שרירים
- סיטוי לילה

דיכאון או שינויים אחרים במצב הרוח

שלשול או עצירות

קושי לנשום עם מסקפיים או שעיעול

נפיחות

דפקות לב

ניידה בערנות, ישנוניות או נודדי שינה (בעיות שינה)

חוסר תחושה, עקצוץ בגפיים, סימנים של נמלול (paresthesia)

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שמופיעות בכפות ממשפתם אחד מתוך 10,000:

- עיניים יציות או מגורות, ראייה מטושטשת
- מזוזם או יצלצול באוזניים
- קושי בשמיעה
- יובש בפה

- הזעה מוגברת
- אף נוזל
- עלייה במשקל
- גישרת שיער

• תוצאות לא תקינות בבדיקת תפקודי כבד
• תוצאות לא תקינות מטופלים עם הפרעות חמורות קיימות של מחזור דם הקיפוי

• החמרה באזורים מעובים של עור אדום/כוסף - סימנים של החמרה בפסוריאזיס

- כאב ומוקשות מפרקים, סימנים יש דלקת פרקים
- בעיות בתפקוד המיני
- שינויים ביכולת להגיע לזיקפה או לשמר זיקפה
- כאב בגב התחתון, הפרעה ללחיימה, עלייה בלחץ הדם, קרישי דם - הנים סימנים אפשריים לשמשו מהיר של ריקמת סחית באזור בגוף (הנקרא retroperitoneum) המכיל את הכליות, אבי העורקים, המערכת הליכתית ואיברי נוספים אחרים

תופעות לוואי שכיחות וזאיהם ידועה:

• ביבלוב
• ערכים לא תקינים של טריגליצרידים בדם
• ערכים לא תקינים של כולסטרול בדם

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי החמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור “דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי” שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il/

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה!
תרופה זו זכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
גבי הארזיה, תארך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
יש לאחסן מתחת ל- 30°C.

אין לאחסן תרופות שונות באותה ארזיה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Magnesium stearate; silica, colloidal anhydrous; calcium hydrogen phosphate dihydrate; cellulose, microcrystalline; glyceryl palmitostearate; hypromellose; eudragit NE 30 D; iron oxide yellow, polysorbate 80; titanium dioxide; talc.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארזיה:

טבליה מצופה בצורת כמוסה, בצבע צהוב בהיר, קמורה ועם קו חציה עמוק בשני הצדדים.
הדפס CG/CG בצד אחד והדפס CDC/CDC בצד השני.

כלל ארזיה 14 טבליות.

בעל הירשום וכתובתו:
נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

שם היצרן וכתובתו:
נוברטיס סאגליק, גיטה ו טרים אורונלרי, סאן וי תקי איי. אס., תורכיה.
עבור נוברטיס פארמה אי ג'י., שוויץ.

נערך באפריל 2020

מס' רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
045 04 22324

לשם הפטנט ולהקלת הלקריאה, עלו זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.